



325, 330  
335  
42  
44

PANDITE



Swan No.

David Gibson M.D.

G. S. 33<sup>(\*)</sup>

R21159









S Y N O P S I S  
*NOSOLOGIÆ METHODICÆ,*  
EXHIBENS  
CLARISS. VIRORUM  
*SAUVAGESII, LINNÆI, VOGELII, SAGARI, ET*  
*MACBRIDII,*  
SYSTEMATA NOSOLOGICA.

EDIDIT  
SUUMQUE PROPRIUM SYSTEMA NOSOLOGICUM  
ADJECIT  
GULIELMUS CULLEN,

MED. D. ET IN ACAD. EDINB. MED. PRACT. PROF.  
MEDICUS REGIUS APUD SCOTOS PRIMARIUS,  
ET COLL. REG. MED. EDINB. SOCIUS;  
NEC NON SOCIETATUM REG. LOND. REG. EDINB.  
PHILOS. PHILADELPH. MED. REG. PARIS.  
MED. HAUNIENS. ET REG. MED. EDINB.  
SODALIS.

EDITIO QUARTA,  
EMENDATA ET PLURIMUM AUCTA,  
DUOBUS TOMIS.

T O M. I.

EDINBURGI:  
Prostant venales apud GULIELMUM CREECH.

M, DCC, LXXXV.

80829

# L E C T O R I

S.

**P**RUDIT jam quarta vice, multum, ni  
nos fallunt amici, expetita Synopsis  
haec nosologiae methodicae. Quam, ut  
expectationi eruditorum pro virili satisface-  
rem, plurimum auctam, ubique emenda-  
tam, et usibus, ut spero, medicorum ac-  
commodatiorem, exhibui.

Ut omnia fere, ad rem nosologicam  
spectantia jam edita, sub uno conspectu  
hic ponerem, ex systemate symptomatico  
Clar. MICH. SAGARI, Anno 1776 Viennae  
edito, quae ad genera morborum definienda  
pertinent excerpta, hic iterum dedi; et si-  
mul, quae ex scriptis egregii viri Davidis  
Macbride ad eandem finem conferre pos-  
sent, hic primum addidi,

Quæ

Quæ porro in re nosologica ipse conatus sum, emendatoria, et plurimum aucta, hic protuli; quae tamen de his ulterius hic dicenda essent, in Prolegomenis, initio tomus hujus operis alterius praefixis, inveniri possunt; atque illuc Lectorem ablegamus.

P A R S P R I M A.

G E N E R A

M O R B O R U M

D E F I N I T A

Ab Eruditissimo

FRANCISCO BOISSIER DE SAUVAGES.

Ex NOSOLOGIA METHODICA, 2 tom. 4to.

Amstel. 1768.



S E R I E S

CLASSIUM ET ORDINUM.

CLASSIS I. VITIA.

ORDO I. MACULÆ.

- O. II. EFFLORESCENTIÆ.
- O. III. PHYMATA.
- O. IV. EXCRESCENTIÆ.
- O. V. CYSTIDES.
- O. VI. ECTOPIÆ.
- O. VII. PLAGÆ.

CL. II. FEBRES.

- O. I. CONTINUÆ.
- O. II. REMITTENTES.
- O. III. INTERMITTENTES.

## CL. III. PHLEGMASIÆ.

- O. I. EXANTHEMATICÆ.
- O. II. MEMBRANACEÆ.
- O. III. PARENCHYMATOSÆ.

## CL. IV. SPASMI.

- O. I. TONICI PARTIALES.
- O. II. TONICI GENERALES.
- O. III. CLONICI PARTIALES.
- O. IV. CLONICI GENERALES.

## CL. V. ANHELATIONES.

- O. I. SPASMODICÆ.
- O. II. OPPRESSIVÆ.

## CL. VI. DEBILITATES.

- O. I. DYSÆSTHESIÆ.
- O. II. ANEPITHYMIÆ.
- O. III. DYSCINESIÆ.
- O. IV. LEIPOPSYCHIÆ.
- O. V. COMATA.

## CL. VII. D O L O R E S.

- O. I. VAGI.
- O. II. DOLORES CAPITIS.
- O. III. DOLORES PECTORIS.
- O. IV. DOLORES AEDOMINALES INTERNI.
- O. V. DOLORES EXTERNI ET ARTUUM.

## CL. VIII. V E S A N I Æ.

- O. I. HALLUCINATIONES.
- O. II. MOROSITATES.
- O. III. DELIRIA.
- O. IV. VESANIÆ ANOMALÆ.

## CL. IX. F L U X U S.

- O. I. SANGUIFLUXUS.
- O. II. ALVIFLUXUS.
  - 1. *Sanguinolenti.*
  - 2. *Non Sanguinolenti.*
- O. III. SERIFLUXUS.
- O. IV. AERIFLUXUS.

## CL. X. C A C H E X I Æ.

- O. I. MACIES.
- O. II. INTUMESCENTIÆ.
- O. III. HYDROPS PARTIALES.
- O. IV. TUBERA.
- O. V. IMPETIGINES.
- O. VI. ICTERITIÆ.
- O. VII. CACHEXIÆ ANOMALÆ.

G E N E R A  
M O R B O R U M  
C L A S S I S I. V I T I A.

C H A R A C T E R. Symptomata cutanea levidensia, vel mechanicis chirurgiae auxiliis curanda.

O R D O I. M A C U L E.

C o l o r i s n a t i v i m u t a t i o n e s .

G E N U S I. L E U C O M A.

I

M a c u l a o p a c a n s c o r n e a m .

G. II. V I T I L I G O.

2

M a c u l a c o r y m b o s a , s e u e x m i n o r i b u s m a c u l i s c o m p o l i t a , c u m d e p r e s s i o n e c u t i s .

G. III. E P H E L I S .

3

M a c u l a e a c q u i s i t a e , u m b r i n a e , g l a b r a c , c o r y m b o f a c , f a c i e m v e l t i b i a s , r a r i u s p a r t e s t e c t a s , a f f i c i e n t e s .

## 8 GENERA MORBORUM

### 4 G. IV. GUTTA ROSEA.

Maculae faciei rubrae, guttatae, parum prominentes, aut asperae, et diu permanentes.

### 5 G. V. NÆVUS.

Macula congenita, quæ vulgo tribuitur vehementi cupiditati, qua mater initio graviditatis exagitata fuit, quandoque cum partis eminentia.

### 6 G. VI. ECCHYMO<sup>M</sup>OMA.

Macula nigricans, vel atro-rubra, aut livescens, successu temporis slavecens, non congenita, nec aspera, sed plana, aut parum prominens, et subsolitaria.

## O. II. EFFLORESCENTIÆ.

Tumores humorales exigui gregales, vel cutis elevatio per pustulas, papulas, phlyctenænas, varos, similesve asperitates.

*a.* Pustula. Phyma parvulum apice ruptum.

*b.* Papula. Phyma parvulum desquamari solitum.

# S A U V A G E S, 9

c. Phlyctaena. Vesicula fluido serofoso plena.

d. Varus. Tuberculum durum constans.

## G. VII. HERPES.

7

Efflorescentia ex tumoribus exiguis, rubris, aggregatis, pruriginosis, in squamas surfuraceas, raro crustaceas, abeuntibus.

## G. VIII. EPINYCTIS.

8

Phlyctaenae atro-rubrae, aggregatae, trium vel quatuor linearum in diametro, tibias ut plurimum affidentes, et noctu potissimum acriter pungentes.

## G. IX. PSYDRACIA.

9

Phymata erysipelatosa.

## G. X. HIDROA.

10

Exanthemata miliaria phlyctaenoidea.

# O. III. PHYMATA.

Tumores humorales, notabiles, solitarii.

## G. XI. ERYTHEMA.

11

Tumor sine febre, superficiarius, solitarius, diffusus, rubro roseus, pressione evanescens.

10 GENERA MORBORUM

12 G. XII.      OEDEMA.

Tumor diffusus, frigidus, pallidus, laxus,  
doloris expers.

13 G. XIII.      EMPHYSEMA.

Tumor diffusus, elasticus, pressione crepi-  
tans, cuti concolor.

14 G. XIV.      SCIRRHUS.

Phyma durum, indolens, cuti concolor.

15 G. XV.      PHLEGMONE.

Tumor spheroideus, rubore, calore, tensio-  
ne, dolore pulsatili insignis, sponte in sup-  
purationem vergens.

16 G. XVI.      BUBO.

Tumor partim scirrhosus, partim inflam-  
matorius, glandulae unius aut alterius in-  
guinalis.

17 G. XVII.      PAROTIS.

Tumor scirrho-so-phlegmonodeus glandulae  
parotidis dictae in suppuratum lentissime  
vergens.

18 G. XVIII.      FURUNCULUS.

Tumor inflammatorius, cutaneus, promi-  
nens, durus, et atro-ruber, cuius centrum,

S A U V A G E S. II

cum suppuratus est, occupant fibrae cras-  
sae, quae in pus non colliqueſcunt.

G. XIX. ANTHRAX. 19

Phyma apice gangraenosum, ambitu inflam-  
matum.

G. XX. CANCER. 20

Tumor durus, tuberosus, lacinans, perti-  
nacissimus.

G. XXI. PARONYCHIA. 21

Phlegmone extremiti digiti cum dolore per-  
terebrante.

G. XXII. PHIMOSIS. 22

Phlegmone praeputii, cum hujus adducen-  
di vel reducendi difficultate.

O. IV. EXCRESCENTIÆ.

Tumores a solidis adauctis, indolentes, lente  
crescentes, in suppurationem sponte non  
abeuntes.

G. XXIII. SARCOMA. 23

Excreſcentia carnis consistentiam circiter  
obtinens.

12 GENERA MORBORUM

24 G. XXIV. CONDYLOMA,

Excrecentia firma carnibus durior, ossibus  
mollior.

25 G. XXV. VERRUCA.

Excrecentia cutanea prominens, condylo-  
mate minor, sensu destituta, indolens.

26 G. XXVI. PTERYGIUM.

Excrecentia carne, vel membranaceo-vas-  
culosae ad oculi canthum exorta, alam ex-  
pansam referens, et versus corneam se ex-  
tendens.

27 G. XXVII. HORDEOLUM.

Tumor durus vix sensu gaudens, cuti con-  
color, raro rubens, in palpebrarum limbo  
enascens, sphaericus, piso ut plurimum  
minor.

28 G. XXVIII. BRONCHOCELE.

Excrecentia vel tumor scirrhosus anticae  
partis colli.

29 G. XXIX. EXOSTOSIS.

Tumor ossis vel totalis vel partialis.

30 G. XXX. GIBBOSITAS.

Ossium pectoris indecora prominentia a tu-

more, luxatione, distortione, aut alio principio oriunda.

G. XXXI. L O R D O S I S. 31

Ostium distortio, unde hinc protuberant, inde vero excavantur artus, ac incurvantur ossa, vel a situ deflectunt.

O. V. C Y S T I D E S.

Protuberantiae factae a fluidis intra membranas proprias vel alienas maxime dilatatas contentis, vel receptacula quaevis distendentibus.

G. XXXII. A N E U R I S M A. 32

Cystis arteriosa.

G. XXXIII. V A R I X. 33

Cystis venosa.

G. XXXIV. H Y D A T I S. 34

Cystis lymphaeductuum.

G. XXXV. M A R I S C A. 35

Tumores in ani margine enati, rubri, saepe dolentes, et cruentem saepe fundentes, sponte dein recedere soliti.

14 GENERA MORBORUM

36 G. XXXVI. STAPHYLOMA.

Cystis aquosa a corneae proptosi, et dilatatione, vel ab uveae hernia trans foramen corneae elapsa.

37 G. XXXVII. LUPIA.

Cystis vel folliculus meteriem pultaceam non purulentam continens.

38 G. XXXVIII. HYDARTHROUS.

Cystis articuli aquosa.

39 G. XXXIX. APOSTEMA.

Cystis purulenta.

40 G. XL. EXOMPHALUS.

Cystis umbilicalis saepius aquosa.

41 G. XLI. OSCHEOCELE.

Cystis in scroto.

O. VI. ECTOPIÆ.

Ptoses, Celes, Pararthremata, *Graec.*

Prolapsus, Herniac, Aberrationes, Luxationes, *Lat.*

Partium solidarum e sua sedc dimotio sensibus obvia.

## G. XLII. EXOPHTHALMIA. 42

Magnitudo nimia, Prolapsus, Expressio oculi, *Lat.*

Hygrophthalmia, Elephantiasis oculi, *Boerh. de Morb.*

Ocul. pars II. cap. 5.

Exophthalmia, Hydrophthalmia, Buphthalmus seu Buphthalmia, Ophthalmoptosis, Ecpiesmus *Gracorum.*  
*Mauchart*, diff. de Hydrophthalmia, et oculi Paracentesi inter *Haller.* disput. Chir. tom. I.

Grosseur contre Nature, Hydropisie, Cancer, Chute de l'oeil. *Maitre-Jan*, part II. chap. 6.; *Saint Yves*, Part. II. chap. I.

Bulbi oculi procidentia, aucta, vel non mutata sensibiliter nativa ipsius magnitudine.

G. XLIII. BLEPHAROPTOSIS *Mauchartii.* 43

Blepharoptosis, Lagophthalmus, Ectropium, Entropium, *Gr.*

Palpebrae superioris casus, Retractio, Palpebrarum introversio, extroversio, *Lat.*

Chute, relaxation de la paupiere superieure, erailement des paupieres, trichiaise avec introversion des tarses.

Vide *Platner.* Instit. Chirurg. § 577. § 584.; *Maitre-Jan*, part. III. chap. 18. 19. 20. 21.; *Saint Yves*, part. I. chap. 8. 9. 10.; *Dionis*, Dem. 6.; *Boerh. de Morb.* ocul. part. I. cap. 5.; *Heijster.* Chir. tom. I. part. II. § 2. cap. 45. 46. 48.; *Garter.* Chir. repurg. lib. 5. cap. 10.

## 16 GENERA MORBORUM

Palpebrae utriusque vel alterutrius elongatae, retractae, introversae, vel extroversae ectopia.

### 44 G. XLIV. HYPOSTAPHYLE.

Staphyle, Kion, Imantium, Craspedon, Columella bicornis, Aretaei, Acut. lib. I. cap. 8. de asperibus columellae.

Uvulae prolapsus, *Nenter.* tab. 25. cap. 8.

Uvula nimium producta, *Heister,* Chir. tom. 2. p. 659.

Uvulae inflammatio, catarrhus, paralysis, casus, *Gorter,* Praxis Med. Syst. pag. 165.

Relachement de la luette, *Dionis,* Dem. V.

Gurgulionis seu uvulae laxatae, inflammatae, ulceratae, incrassatae, attenuatae, bicornis, procidentia.

### 45 G. XLV. PARAGLOSSAE.

Linguae extumescientia, magnitudo, inflatio, *Galen.* Method. med. libr. XIV. *Valesci de Taranta Philen.* lib. 2. cap. 59.; *Marc. Donat. Med. Histor. Mirab.* lib. 3. cap. 4.

Linguae retractio, exertio, *Gorteri.*

Glossocle Gaubii Pathol. § 242.; Linguae extrusio, Idem, § 254.

Renversement de la langue dans le gosier, *Petit. Mem.* de l'Acad. des Sc. 1742.

Linguae motu deglutitorio in fauces revo-

luteae vel ore extrusae, exundantis, exer-  
tae ectopia.

G. XLVI. PROPTOMA. 46

Partis externae, etiam ante lapsum conspi-  
cuae, et a palpebris, bulbo oculi, lingua,  
ac gurgulione diversae procidentia.

G. XLVII. EXANIA. 47

Proctocele *Pathol. Meth.* edit. 3.

Morbus poenalis Gerhamensium, lib. Regum I. cap. 5.  
Prolapsus ani *Auctorum*, ut *Plateri*, Prax. lib. II. cap. 2.  
*Nenteri*, tab. 126. &c.

Chute du fondement *Dionis*, Dem. IV. p. 392.; *Arnaud*  
des Hernies, tom. 1. chap. 28.; *Levret* obs. sur les  
polypes, sect. 3. pag. 165.

Sphincteris ani, et intestini recti inversi, pro-  
cidentia.

G. XLVIII. EXOCYSTE. 48

Prolapsus, inversio vesicae urinariae *Auctorum*; *Salz-*  
*manni* diff. de Hern. vesicae inter *Halleri Disp.* Sel.  
tom. III.; *Solingen* de mulierum et infant. morb. chir.  
pag. 741.

Renversement de la vessie urinaire. *Noel*. obs.; Recher-  
ches sur la Hernie de la vessie par *Verdier*; Mem. de  
l'Acad. R. de Chir. tom. 2.

Membranae tum vesicae corpus, tum ipsius

## 18 GENERA MORBORUM

collum, interne obvestientis procidentia per meatum urinarium facta.

### 49 G. XLIX. HYSTEROPTOSIS.

Hysterocles nudae *Pathol. Method.* edit. 3.

Relaxatio, prolapsus, procidentia, inversio uteri vel vaginae *Auctorum*, ut *Heisleri Inst. Chir.* tom. 2.; *Gunzii de Herniis*, &c.

Relachement, chute, descente, renversement de la matrice ou du vagin. *Arnaud*, tom. 1. chap. 24. &c.; *Puzos* sur les maladies de la matrice; *Sabatier*, Mem. de l'Acad. R. de Chir. tom. 3.

Uteri vel vaginae procidentia.

### 50 G. L. ENTEROCELE.

Hernia intestini.

### 51 G. LI. EPIPLOCELE.

Hernia Omenti.

### 52 G. LII. GASTROCELE. *Ign. la Chausse.*

Hernia ventriculi, *Fabr. Hildani* resp. ad Doring. pag. 915.; *Blegney Zod. med. Gall. ann. I. Febr. Obs.* 2. pag. 44.; *Gunzii libell. de hern.* cap. 20. *Ign. la Chausse* Diff. de hernia ventrali, et *Kirschbaum* Diff. de hern. ventriculi in disp. *Chir. Haller.* tom. 3. Diff. 68. 69.

Herniae de l'estomac, *La Faye sur Dionis*, pag. 121.; *Arnaud Tr. des hernies*, preface, p. 81.; *Sharp Rech.*

Crit. chap. I.; *Garengeot*, Mem. de l'Acad. R. de Chir. tom. I. p. 703.

Ventriculi trans laxatos, diductos, regionis epigastricae parietes, imo et per umbilici annulum elapsi ectopia herniosa.

G. LIII. HEPATOCELE, *Gunzii* Li- 53  
bell. de hern. p. 4.

Hernia hepatis, E. N. C. Dec. I. Ann. II. et Dec. II.  
Ann. VII.; *Bohnii* Chir. rational. pag. 230.

Hernie du foye, *Arnaud des hern.* tom. I.

Hepatis trans laxatos, diductos in umbilici vicinia abdominis parietes, vel per ipsum umbilicum ectopia herniosa.

G. LIV. SPLENOCELE, *Gunzii* Li- 54  
bell. de hern. p. 4.

Hernia lienis, *Fabr. Hildani*, Epist. LV. pag. 999.; *Spi-gelii* de corp. hum. fabric. lib. 8. cap. 14.; *Ruysehii* Advers. Anat. Dec. II. pag. 23.

Hernie de la Rate, *Arnaud des hern.* tom. I. pag. 29.

Lienis trans laxatos, diductos abdominis in latere sinistro parietes, vel per inguinalem ejusdem lateris annulum elapsi ectopia herniosa.

## 20 GENERA MORBORUM

### 55 G. LV. HYSTEROCELE.

Hernia uteri *Sennert.* Lib. 4. Med. Pract. part II. sect. II. cap. 17.; *Doringii* Epist. ad G. Fabr. Hildanum de hernia uterina, p. 893.; *Graaf.* de mulier. organ. cap. 8.; *Ruyssch.* Adv. Dec. II. pag. 23.

Hernie de la Matrice, *Arnaud* des hernies, tom. 1. pag. 29.; *Sabatier* Mem. de l'Acad. R. de Chir. tom. 3.

Uteri trans annulos inguinales, aut laxatos, diductos inferne abdominis medietatis parietes elapsi ectopia herniosa.

### 56 G. LVI. CYSTOCELE, *Platner.* Inst. Chir. *Ign.* la Chausse de hern. ventrali.

Hernia cystica quorundam.

Hernia vesicæ urinariae *Salzmanni* Diff. inter *Halleri* Disp. Chir. tom. 3. Diff. 72.; *Gunzii* Libell. de hern. &c.

Hernie de la vessie urinaire *Mery.* Mem. de l'Acad. R. des Sc. 1713.; *Garengeot* Oper. de Chir.; *Levret* Obs. sur les Polypes; *Sharp* Rech. Crit.; *Verdier* Mem. de l'Acad. R. de Chir. tom. 2.

Vesicæ urinarie trans annulos inguinales, sub arcubus cruralibus, et per laxatos, diductos perinaei, hypogastrii, necnon vaginae parietes elapsæ ectopia herniosa.

G. LVII. ENCEPHALOCELE, *Corvini* 57

Diss. de hern. Cerebri inter *Halleri* Disp.

Chir. tom. 2. Diff. XLVI.

Hernia cerebri, *Reiselii* Eph. N. C. Dec. II. Ann. II.

Obs. 115.; *Lechelii* ibid. Obs. 158.; *Treu* Comm.

Litt. 1738, Hebd. 52. n. 3.; *Taconi* Diff. de humano  
monstro Bononiae nato; *Corvini*, ibidem.

Hernie du Cerveau, *Le Dran* Obs. de Chir. Obs. 1.

Cerebri, cerebelli, aut utriusque, verbo En-  
cephali, per ossium craniī non penitus  
osſificatorum hiatum prorumpentis, ecto-  
pia herniosa.

## G. LVIII. HYSTEROLOXIA. 58

Obliquitas uteri *Roedereri*, Elem. art. Obstetric. § 449.

—507.; *Levret* Observ. sur les Accouch.

Inclinatio, reclinatio, obliquitas uteri *Deventer*, cap. 46.

47. 48.; *Ruyshii*, Observ. XCVIII.

Inclinaſon, obliquité de la matrice, *Sabatier*, Mem. de  
l'Acad. de Chir. tom. 3. &c.

Uteri, saepius grāvidi, et contra quam in  
hysterocèle fit, abdominis clauſtris con-  
tenti ſitus in obliquum errans.

## G. LIX. PARORCHIDIUM. 59

Testiculorum ſerior deſcensus, vel retractio, *Felic. Pla-*  
*teri Mantifſt.* Observ.; *Ambr. Paraei* lib. vii.; *Thom.*

## 22 GENERA MORBORUM

*Bartholini Hist. Anat.*; *Morgagni. Advers. IV.*; *Dionis Oper. de Chir. Dem. IV.*; *Quelmalzii inter Halleri Disput. Anatom. tom. 5. Dissert. 1.*; *Verdier sur la Hernie de la Vessie, Mem. de l'Acad. R. de Chir. tom. 2.*

sticuli unius, vel utriusque, cuius post nativitatem sedes naturalior scrotum est, situs in alienum aberrans.

### LX. EXARTHREMA, Graec.

*Exarthrosis, Parathrema eorund.*

*o, subluxatio, distortio, Heister. Inst. Chir. tom. 1.; Darrh. Aph. Comment. tom. 1.; Gorter. Chir. repurgat. cap. 6. Platner. Instit. Chir. § 1090.—1213.*

*Luxation, entorse, Petit Malad. des Os, tom. 2.; Coll de Villars Chir. tom. 5.; de la Faye Princ. de Chir.; Duverney Malad. des Os, tom. 2.*

*Separatio contigi in ossium articulis diarthrosice, non vero immobiliter combinatis.*

### 61 G. LXI. DIASTASIS, Graecorum.

*Ossium recessus, Latin.; Petit. tom. 2. chap. 8. et 13.; La Faye Princ. de Chir. pag. 474.; Duverney tom. 2. ch. 1. et 5.*

*Ossium, cartilaginum, immobiliter combinatorum, separatio, seu recessus ab invicem partialis vel totalis.*

## G. LXII. LOXARTHROUS. 62

Perversio capitis ossium ac muscularum appensorum,

*Duverney*, tom. 2. cap. 2.

Artis vari *Duverney*, tom. 2. cap. 2.

Gibbositas scapularis *Auctorum*.

Ossium cum motu sensibili articulatorum fitus relativus in alienum constanter mutatus, aut obliquitas respectiva persistens citra exarthrema et spasmodum.

## O. VII. PLAGÆ.

Solutiones continui.

## G. LXIII. VULNUS. 63

Solutio mechanica continui in carnibus cum labiorum hiatu, initio cruenta, dein ad inflammationem suppurationemque tendens.

## G. LXIV. PUNCTURA. 64

Continui solutio intus tantum extensa.

## G. LXV. EXCORIATIO. 65

Cuticulae vel cutis a carnibus subjectis separatio.

24 GENERA MORBORUM

66 G. LXVI. CONTUSIO.

Textus carnosus, potissimum infra cutem,  
ruptio per minima puncta et vasorum  
contritio, ecchymoma saepius inferens.

67 G. LXVII. FRACTURA.

Separatio violenta et mechanica ossis in frag-  
menta invicem non cohaerentia.

68 G. LXVIII. FISSURA.

Separatio ossis in duas partes rima tantum  
dissitas, et alterutro saltem extremo co-  
haerentes.

69 G. LXIX. RUPTURA.

Tendinum vel ligamentorum aut cartilagi-  
num, solutio, vel vchemens distractio,  
cum vel sine exarthremate.

70 G. LXX. AMPUTATURA, *Ill. Lin.*  
*G. 241.*

Solutio continui in partibus tum mollibus,  
tum offeis, cum artus, articuli, vel parti  
totali separatione a residuo truncu.

71 G. LXXI. ULCUS.

Partium mollium erosio purulenta, cute  
profundior, cum pure ichorofo vel ut-  
cumque vitioso.

S A U V A G E S. 25

- G. LXXII. EXULCERATIO. 72  
Excoriatio ulcerosa suppurans.
- G. LXXIII. SINUS. 73  
Cavitas ulcerosa, cuius fundus amplus, saepe multiplex definit in angustum orificium.
- G. LXXIV. FISTULA. 74  
Cavitas ulcerosa, sinuosa, cuius parietes callosi sunt ut plurimum, aut fundus ad os cariosum, arthrocace corruptum, pertingit.
- G. LXXV. RHAGAS. 75  
Solutio continui sicca in partium marginibus.
- G. LXXVI. ESCHARA. 76  
Crusta sicca, mortua, fluidis solidisque corporis humani coagimentata.
- G. LXXVII. CARIES. 77  
Ossis suo periosteo denudati decoloratio, asperitas, exfoliatio et subsequens fragilitas ac erosio.
- G. LXXVIII. ARTHROCACE. 78  
Ulcus medullae ossium, saepius in epiphysibus, cum carie, exostosi, et dolore.

: D

## CL. II. FEBRES.

Pulsus magnitudo et frequentia cum frigore in insultu, fervore in decursu, madore in declinatione, et semper virium prostratione majori quam a virium vitalium gradu foret exspectandum.

## ORDO I. CONTINUÆ.

Impetus febrilis a frigore saepius exordiens sine exacerbatione partiali, et sine accessu, non pluries quam semel vel bis in mense revertens, ad usque finem aegritudinis perseverat.

## 79 G. I. EPHEMERA.

Decursus aegritudinis intra dimidiam septimanam absolvitur. Vigor morbi subito accedit.

## 80 G. II. SYNOCHA.

Decursus intra septimanam, incrementum successivum.

G. III. SYNOCHUS, *Galeni.* 81

Decursus ad duas tresve septimanás, cum pulsus robore sanum, in morbi statu saltem, notabiliter superante.

G. IV. TYPHUS, *Hippocratis* 1. et 2. de 82  
intern. affect. Foesii 553.

Decursus ultra duas septimanas, saepius tres, cum calore et urina sanorum similibus, pulsuque quoad frequentiam sano fere simili, et quoad robur non majori, artibus interea maxime prostratis.

G. V. HECTICA, *Galeni et ejus Sequa-* 83  
*cium;* *Sydenhami,* p. 524.

Decursus ultra mensem, debilitas parva, pyrexia exigua, cum pulsu post pastum frequentiori.

## O. II. REMITTENTES.

Pyrexia pluries in decursu morbi crescit et decrescit, non omnino recedit, typus saepe confusus.

## 28 GENERA MORBORUM

### 84 G. VI. AMPHIMERINA.

Remissio quotidianae typum servat. Exacerbationes cum horrore.

### 85 G. VII. TRITÆOPHYA.

Remissionis typus tertianarius, frigus fere nullum.

### 86 G. VIII. TETARTOPHYA.

Remissio quartanae typum servans.

## O. III. INTERMITTENTES.

Pyrexia plures in decursu aegritudinis defert et recurrit, cum intervallis lucidis.

### 87 G. IX. QUOTIDIANA.

Accessus similes quolibet die accidentur.

### 88 G. X. TERTIANA.

Accessus similes alternis diebus revertuntur.

### 89 G. XI. QUARTANA.

Accessus similes duobus interpositis diebus redeunt.

### 90 G. XII. ERRATICA.

Accessus similes distantes ab invicem pluribus quam quatuor diebus, aut typi omnino incerti.

CL. III. PHLEGMASIÆ, *Galen.*

Pyrexia continua vel remittens cum interna  
inflammatione, vel cum exanthematis.

O. I. EXANTHEMATICÆ.

Eruptiones cutaneae cum pyrexia saepius  
maligna, quandoque lenta.

G. I. PESTIS. 91

Eruptio bubonum, anthracum, pyrexia ty-  
phodes.

G. II. VARIOLA, *Haly Abbatis, Jou- 92  
berti, et antiquorum.*

Eruptio pustularum phlegmonodearum in  
suppurationem tendentium.

G. III. PEMPHIGUS. 93

Eruptio phlyctaenarum avellanae circiter  
magnitudine sero dilute flavo turgidarum.

G. IV. RUBEOLA, sic primitus no- 94  
minata a traductoribus *Haly Abbatis Practi-  
cae, lib. 3. cap. 1. de Variolæ et Rubeolac  
Medela.*

30 GENERA MORBORUM

Eruptio papularum in squamulas furfuraceas abeuntium. Praecedunt tussis sicca, sternutatio, lachrymatio, et febris catarrhalis.

95 G. V. M I L I A R I S.

Eruptio phlyctaenarum milii semini non majorum.

96 G. VI. P U R P U R A.

Eruptio maculosa purpurea, livida, vel atra, indolens, cum typho vel remittente febre.

97 G. VII. E R Y S I P E L A S.

Eruptio erythematis cum synocha febre.

98 G. VIII. S C A R L A T I N A.

Eruptio maculosa, rubra, pruriens, papulosa, lata, parum uniformis, in squamulas furfuraceas abiens, sed sine praeludio catarrhalis, et saepe ad secundam tertiamve vicem se prodens ac recondens vicissim.

99 G. IX. E S S E R A.

Eruptio ut plurimum apyreta, suberysipelatosa, subito accedens per vices et recedens.

## G. X. APHTHÀ. 100

Eruptio pustulosa, phlyctænodes, et ulcerosa; in ore aut pudendis.

## O. II. MEMBRANACEÆ.

Pyrexia magna typo synochæ vel synochicum dolore visceris cuiusdam.

## G. XI. PHRENITIS. 101

Dolor capitis, delirium audax, vis artuum, pulsusque major, pyrexia acuta.

## G. XII. PARAPHRENESIS. 102

Symptomata phrenitidis et peripneumoniae.

## G. XIII. PLEURITIS. 103

Dolor lateris, respiratio et pulsus frequens, tussis.

## G. XIV. GASTRITIS. 104

Dolor epigastrii, nausea, vomituritio, febris typhodes, vel remittens maligna.

## G. XV. ENTERITIS. 105

Dolor circa umbilicum vehemens, cum me-

teorismo, pyrexia acuta, ileo, vel dysenteria.

**106 G. XVI. EPIPLOITIS.**

Dolor circa hypogastrium, et umbilicum  
juxta epiplois extensionem.

**107 G. XVII. METRITIS.**

Dolor et tumor in regione et extensione ute-  
ri ac lumbis et inguinibus cum febre.

**108 G. XVIII. CYSTITIS.**

Dolor, tumor, tensio hypogastrii, cum dy-  
furia vel ischuria.

**O. III. PARENCHYMATOSÆ.**

Dolor obtusus, calor et tumor in visceribus  
farctis, non sacciformibus, cum pyrexia  
acuta, suppurationis apparatu.

**109 G. XIX. CEPHALITIS.**

Febris acuta cum delirio somnolento, et car-  
phologia.

**110 G. XX. CYNANCHE.**

Dolor gutturis cum dyspnoea strangulante,  
dysphagia, et pyrexia acuta.

## G. XXI. CARDITIS. III

Dolor sub sterno, pulsus inaequalis, frequens, palpitatio, et cardialgia, cordis anxietas.

## G. XXII. PERIPNEUMONIA. II2

Pyrexia acuta, dyspnoea gravis, gravativus pectoris dolor, tussis cruenta, pulsus mollius.

G. XXIII. HEPATITIS, *Galeni I. Epid.* II3

Comm. 3.

Dolor, tensio, calor in regione hepatis, cum pondere, tussi sicca, respiratione difficili.

## G. XXIV. SPLENITIS. II4

Dolor, tumor in regione lienis, tactum vix tolerans, cum febre ut plurimum remittente.

## G. XXV. NEPHRITIS. II5

Dolor acutus in regione renum juxta ureteres in vesicam directus, cum febre acuta, dysuria, ischuria ve, &c.

CL. IV. SPASMI.

Contractio invita, constans vel interpolata,  
musculorum organis locomotivis, non  
vitalibus inservientium.

O. I. TONICI PARTIALES.

Rigiditas et immobilitas artus vel organi  
determinati.

116 G. I. STRABISMUS.

Oculi spasmodus axium opticorum divergen-  
tiam inferens.

117 G. II. TRISMUS.

Maxillae inferioris spasmodus tonicus, vel clo-  
nicus.

118 G. III. OBSTIPITAS.

Colli spasmodus tonicus, capitis nativam mo-  
bilitatem et directionem mutans.

119 G. IV. CONTRACTURA.

Artus cujusdam, ut brachii, vel cruris, con-  
stans, diurna, rigiditas sensim exorta.

G. V.	C R A M P U S.	120
Subitanea, fugax, dolorifica musculi rigiditas.		
G. VI.	P R I A P I S M U S.	121
Penis injucunda rigiditas.		

## O. II. TONICI GENERALES.

Rigiditas totius fere corporis.

G. VII.	T E T A N U S.	122
Spasmus generalis subito ortus cum dyspnœa.		
G. VIII.	C A T O C H U S.	123
Spasmus generalis sensim factus sine dyspnœa.		

## O. III. CLONICI PARTIALES.

Agitatio invita et coacta cujusdam organi, vel artus, cuius motivum non percipitur.

G. IX.	N Y S T A G M U S.	124
Spasmus clonicus oculi, palpebraeve.		
G. X.	C A R P H O L O G I A.	125
Motus velut convulsivus manuum, quo ae-		

## 36 GENERA MORBORUM

gri floccos e vestibus evellere, paleas colligere, muscas venari, &c. videntur.

### 126 G. XI. PANDICULATIO.

Distensio semivoluntaria plurium vel omnium successive membrorum, ut plurimum cum oscitatione.

### 127 G. XII. APOMYTTOSIS.

Succusso cutis et capitis tremula, violenta, cum expiratione sonora, quasi stertorosa.

### 128 G. XIII. CONVULSIO.

Agitatio invita artus vel musculi brevis et superstite in paroxysmis animae functionum exercitio.

### 129 G. XIV. TREMOR.

Artus alterna per itus et reditus frequentes motitatio cum movendi facultate concurrens.

### 130 G. XV. PALPITATIO.

Pulsatio in regione cordis pulsui arteriarum numero, minime vero intensitate, respondens.

## G. XVI. CLAUDICATIO.

131

Inter gradiendum cruris motus, quo centrum gravitatis trunci sensibiliter, dextrorum vel sinistrorum transfertur.

## O. IV. CLONICI GENERALES.

Spasmi clonici vel totius corporis, vel ad plures partes extensi.

## G. XVII. RIGOR.

132

Totius cutis succussio frigorifera.

## G. XVIII. ECLAMPSIA.

133

Artuum vel muscularum plurimorum spasmus clonicus acutus, cum sensuum obscuratione.

## G. XIX. EPILEPSIA.

134

Spasmus clonicus, periodicus, chronicus artuum, cum sensuum obscuratione.

## G. XX. HYSTERIA.

135

Artuum, organorumque etiam internorum spasmodus clonicus, tonicusve, paroxysmis fugacibus leviter variantibus, cum mortis formidine intensissima.

38 GENERA MORBORUM

136 G. XXI. S C E L O T Y R B E.

Motus semivoluntarius vel unius lateris, vel totius corporis, inter gradiendum, gestulationem, aut ridiculam histrionis festinationem referens.

137 G. XXII. B E R I B E R I A.

Motus gradientium genu retrahens cum tremore, formicationis sensu, vocis raucedine, Indis familiaris.

## CL. V. ANHELATIONES.

Agitatio invita, defatigans, muscilorum pectoris, unde respiratio difficilis, frequens, sine febre acuta.

## O. I. SPASMODICÆ.

Insultus fugaces, sed saepius iterati spasmodicorum motuum pectoris cum exspiratione sonora.

G. I. E P H I A L T E S. 138

Anhelatio difficilis, querula, cum insomnio terrifico.

G. II. S T E R N U T A T I O. 139

Concussio violenta pectoris, cum exspiratione veloci narium interiora everrente et sonora.

G. III. O S C E D O. 140

Diutina lenta profunda inspiratio, ore hianti, saepius cum pandiculatione.

G. IV. S I N G U L T U S. 141

Concussio diaphragmatis cum inspiratione subito interrupta, sonora.

## 40 GENERA MORBORUM

### 142 G. V. T U S S I S.

Concussio sonora, violenta pectoris cum exspiratione ad pulmonem a quodam obice liberandum.

### O. II. OPPRESSIVÆ.

Non fugaces, sed constantes respirandi difficultates, cum pectoris non raro oppressione, frequenti anhelitu, difficultate illius suspendendi, sine metu suffocationis.

### 143 G. VI. S T E R T O R.

Respiratio inter inspirandum, sonum gravem, tremulum, in gutture edens, saepe cum alterno sibili.

### 144 G. VII. D Y S P N Æ A.

Difficultas respirandi chronica, non intermittens, sive signis hydrothoracis vel empyematis.

### 145 G. VIII. A S T H M A.

Difficultas respirandi periodice recurrens, chronica.

### 146 G. IX. O R T H O P N Æ A.

Præceps ut plurimum et acuta respirandi difficultas.

## G. X.      A N G I N A.

147

Difficultas respirandi, cum sensu obicis in gutture, et saepe deglutitione difficulti, sine phlegmasia.

## G. XI.    P L E U R O D Y N E.

148

Pectoris, laterisve dolor pungitivus cum respirandi difficultate citra phlegmasiam acutam.

## G. XII.     R H E U M A.

149

Difficultas respirandi cum sensu gravitatis in pectore, quam comitantur vel praecedunt coryza, sternutatio, rauccdo, &c.

## G. XIII.    H Y D R O T H O R A X.

150

Difficultas respirandi decubitu horizontali aucta, cum faciei pallore, manuum et pedum oedemate, symptomatis ephialticis, alterutrius brachii stupore et aegritudine chronica non remittente.

## G. XIV.    E M P Y E M A.

151

Symptomata hydrothoracis, praegressa pulmonis inflammatione suppurata et comitante febre hectica.

## CL. VI. DEBILITATES.

Impotentia clare et distin<sup>c</sup>te sentiendi, appetendi, consueta vi artus organave movendi, necnon imaginandi, vigilandi, &c.

## O. I. DYSÆSTHESIÆ.

Impotentia clare ac distin<sup>c</sup>te sentiendi sine sopore.

## 152 G. I. CATARACTA.

Vifus debilitas ob maculam opacam pone pupilam.

## 153 G. II. CALIGO.

Vifus debilitas obicibus opacis citra pupilam positis.

## 154 G. III. AMBLYPIA.

Vifus debilitas respective ad citum, gradum lucis, distantiam objecti, oculis pellucidis.

## 155 G. IV. AMAUROSIS.

Vifus debilitas absoluta sine ulla organorum opacitate inassueta.

G. V. ANOSMIA. 156

Odoratus debilitas aut olfaciendi impotentia.

G. VI. AGHEUSTIA. 157

Gustus debilitas aut gustandi impotentia.

G. VII. DYSECAEA. 158

Auditus debilitas obicibus extra labyrinthum positis.

G. VIII. PARACUSIS. 159

Voces articulatas distincte audiendi difficultas vel impotentia.

G. IX. COPHOSIS. 160

Sonos etiam simplices percipiendi vel audiendi difficultas vel impotentia, obice intra vel ultra labyrinthum posito.

G. X. ANÆSTHESIA. 161

Tactus in toto corpore debilitas vel obscuritas sine stupore et sopore.

O. II. ANEPITHYMIÆ.

Appetituum sensitivorum debilitas notabilis, vel suppressio insolita sine sopore.

44 GENERA MORBORUM

162 G. XI. ANOREXIA.

Appetitus esculentorum suppressio seu famis feratio.

163 G. XII. ADIPSIA.

Appetitus potulentorum suppressio seu sitis feratio.

164 G. XIII. ANAPIRODISIA.

Appetitus venereorum, seu libidinis suppressio.

O. III. DYSCINESIAE.

Impotentia motus ac saepe sensus in organis libertati subditis, ut lingua, larynge, artibus.

165 G. XIV. MUTITAS.

Voces articulatas edendi impotentia.

166 G. XV. APHONIA.

Plenaria vocis suppressio, citra stuporem et syncopem.

167 G. XVI. PSELLISMUS.

Quasdam syllabas literesve pronunciandi impotentia.

G. XVII.	PARAPHONIA.	168
Vocem solitam edendi impotentia.		
G. XVIII.	PARALYSIS.	169
Motus aut tactus, vel utriusque in uno tan- tum artu debilitas.		
G. XIX.	HEMIPLEGIA.	170
Debilitas motus aut tactus vel utriusque in alterutro corporis latere.		
G. XX.	PARAPLEXIA.	171
Debilitas sensus et motus in dimidio corpo- ris transversim sumpti.		

## O. IV. LEIPOPSYCHIÆ.

Motuum, viriumque vitalium debilitas.		
G. XXI.	ASTHENIA.	172
Totius corporis gradaria seu successiva de- bilitas, sensibus integris.		
G. XXII.	LEIPOTHYMYIA.	173
Virium muscularium totius corporis subita- nea imminutio, pulsu superfite,		

## 46 GENERA MORBORUM

### 174 G. XXIII. SYNCOPE.

Motuum vitalium subitanea debilitas cum frigore, pallore, sensuumque obscuratione.

### 175 G. XXIV. ASPHYXIA.

Omnium motuum et sensuum apparetens cefatio mortem fere referens.

## O. V. COMATA.

Sensus omnis, appetitus, motus liberi, phantasiae, memoriacque feriationes.

### 176 G. XXV. CATALEPSIS.

Status soporosus cum artuum flexilitate et ad quosvis novos situs retinendos aptitudine.

### 177 G. XXVI. ECSTASIS.

Status soporosus a gravi pathemate subito ortus, aegrum in eodem situ quoprehensus est retinens, sine aptitudine cataleptica.

### 178 G. XXVII. TYPHOMANIA.

Apparens sopor cum pervigilio reali, vel sopor levis e quo aegri facile excitantur cum delirio comitante.

- G. XXVIII. LETHARGUS. 179  
Status soporosus facile excitabilis cum summo imaginationis et memoriae torpore ac febre.
- G. XXIX. C A T A P H O R A. 180  
Status somnolentus facile excitabilis sine febre, delirio, et oblivione.
- G. XXX. C A R U S. 181  
Sopor profundus sine stertore.
- G. XXXI. A P O P L E X I A. 182  
Sopor profundissimus cum stertore vel sonora respiratione.

## CL. VII. DOLORES.

Cujusvis experientia cognoscendi, nulla definitione distincte explicabiles sunt.

## O. I. VAGI.

Dolores et molestiae vagae saepius universales aut cutanæ ad phlegmasias non referendæ.

## 183 G. I. ARTHRITIS.

Articulorum dolor spontaneus periodicus.

184 G. II. OSTOCOPUS, *Gorraci* definit.

Offsum dolor non erraticus et internus in artubus.

## 185 G. III. RHEUMATISMUS.

Dolor diutinus in parte carnosa artuum.

## 186 G. IV. CATARRHUS.

Collo vicinarum partium dolor a frigore suscepito, cum tussi, coryza, &c.

G. V.	A N X I E T A S.	187
	Molestia quae ad continuam loci mutatio-	
	nem cogit.	
G. VI.	L A S S I T U D O.	188
	Molestia cum debilitate quae ad quietem	
	invitat.	
G. VII.	S T U P O R.	189
	Molestia quae sensum tactus obscurat.	
G. VIII.	P R U R I T U S.	190
	Molestia quae ad scalpendum nos cogit.	
G. IX.	A L G O R.	191
	Molestia qualis a summo aëris frigore ex-	
	citatur.	
G. X.	A R D O R.	192
	Molestia qualis a summo aëris calore pro-	
	ducitur.	
 O. II. DOLORES CAPITIS.		
	Scilicet vel capillitii vel faciei.	
G. XI.	C E P H A L A L G I A.	193
	Gravativus capitis dolor.	

50 GENERA MORBORUM

194 G. XII. CEPHALÆA.

Periodicus, diuturnus tensivus capitis dolor.

195 G. XIII. HEMICRANIA.

Dolor alterutrius lateris frontis.

196 G. XIV. OPHTHALMIA.

Dolor oculi cum rubore, lucis intolerantia  
et lachrymatione.

197 G. XV. OTALGIA.

Dolor aurium.

198 G. XVI. ODONTALGIA.

Dolor maxillarum dentiumve.

O. III. DOLORES PECTORIS.

Dolores cordis et oesophagi, anhelationis  
expertes.

199 G. XVII. DYSPHAGIA.

Molestia deglutitionem impediens sine no-  
tabili respirationis laesione.

200 G. XVIII. PYROSIS.

Sensus ardoris in ventriculo et oesophago  
sine febre acuta.

G. XIX. CARDI OGMUS. 201

Gravis pertinaxque molestia in praecordiis,  
cum sensu ponderis et magnae molis pul-  
santis a minimo motu increscens.

O. IV. DOLORES Abdominales  
Interni.

G. XX. CARDIALGIA. 202

Molestia in stomacho syncopem minitans.

G. XXI. GASTRODYNIA. 203

Quicunque dolor notabilis et constans in  
regione stomachi, qui continua animi de-  
fectione non slipatur ut cardialgia, nec  
pyrexia ut gastritis.

G. XXII. C O L I C A. 204

Dolor intestinorum.

G. XXIII. HEPAT ALGIA. 205

Molesta sensatio, gravativa, tensiva, aut alia  
quaevis in regione hepatis, sine pyrexia  
acuta.

52 GENERA MORBORUM

206 G. XXIV. SPLENALGIA.

Dolor aut molestia in regione lienis sine pyrexia acuta.

207 G. XXV. NEPHRALGIA, *Zwingeri.*

Dolor lumbi alterutrius ureteris ductum sequens, cum nausea, testis retractione in viris, cruris stupore in foeminis, &c.

208 G. XXVI. DYSTOCIA.

Dolor uterinus in gravidis cum conatibus parturitionis.

209 G. XXVII. HYSTERALGIA, *Montalti.*

Dolor uteri sine nisu parturitionis.

O. V. DOLORES Externi et Artuum.

210 G. XXVIII. MASTODYNIA.

Dolor mammarum.

211 G. XXIX. RACHIALGIA, *Astrucii.*

Dolor abdominis et spinae dorsi in brachiorum paralysin aut convulsiones definens.

212 G. XXX. LUMBAGO.

Dolor lumborum corporis erectionem impediens.

G. XXXI.	ISCHIAS	213
Pelvis et coxendicis dolor claudicationem faepius inducens.		
G. XXXII.	PROCTALGIA.	214
Dolor podicis citra tenesmum.		
G. XXXIII.	PUDENDAGRA.	215
Dolor genitalium citra dysuriam.		

## CL. VIII. VESANIAE.

Error in imaginatione, appetitu, vel judicio.

## O. I. HALLUCINATIONS.

Errores imaginationis salvo intellectu ab organorum externorum vitio.

## 216 G. I. VERTIGO.

Objecta licet quiescentia e loco moveri vel in gyrum versari nobis videntur. Ipse aeger sibi quandoque nutare videtur.

## 217 G. II. SUFFUSIO.

Objectorum, quae non sunt, imaginaria visio.

## 218 G. III. DIPLOPIA.

Objectum duplicatum vel multiplicatum apparet.

## 219 G. IV. SYRIGMOS.

Auditio imaginaria soni, cuius nullum est extra aures principium.

## 220 G. V. HYPOCHONDRIASIS.

Morbus diuturnus quo affectus se in mortis

periculo versari ex ructu, palpitatione, aliisque levidensibus malis, imaginatur.

G. VI. SOMNAMBULISMUS. 221

Somniantes e lecto surgunt, vigilantium munia exsequuntur, et se saepe diversis periculis exponunt.

O. II. MOROSITATES.

Cupiditates aut aversationes depravatae.

G. VII. PICA. 222

Alimentorum consuetorum aversatio, cum inassuetorum, satisque infalubrium, appetitu.

G. VIII. BULIMIA. 223

Appetitus esculentorum copiae majoris quam quae digeri possit.

G. IX. POLYDIPSIA. 224

Appetitus majoris solito copiae potulentorum.

G. X. ANTIPATHIA. 225

Quorundam objectorum tanta aversatio ut

## 56 GENERA MORBORUM

ex eorum visu, vel olfactu, aeger gravia  
symptomata patiatur.

### 226 G. XI. NOSTALGIA.

Parentum patriaeve tanta cupiditas, ut hac  
non expleta aeger gravi morbo decum-  
bat.

### 227 G. XII. PANOPHOBIA.

Summus pavor inter dormiendum sine cau-  
fa evidenti.

### 228 G. XIII. SATYRIASIS.

Effraenis, impudensque veneris cupiditas  
cum libidinosa penis tentigine.

### 229 G. XIV. NYMPHOMANIA.

In foeminis effraenee veneris desiderium.

### 230 G. XV. TARANTISMUS.

Effraenis choreas agendi, vel saltandi cupi-  
ditas.

### 231 G. XVI. HYDROPHOBIA.

Effraenis potulentorum aversatio, saepius a  
morsu animalis rabidi.

## O. III. DELIRIA.

Errores mentis judicantis.

G. XVII. PARAPHROSYNE. 232

Delirium fugax, a veneno, aut altero morbo dependens.

G. XVIII. AMENTIA. 233

Delirium universale mite, sine furore et audacia, cum morbo diuturno.

G. XIX. MELANCHOLIA. 234

Delirium particulare mite, cum moerore, ac morbo diuturno.

G. XX. MANIA. 235

Delirium universale cum furore, vel audacia et morbo diuturno.

G. XXI. DÆMONOMANIA. 236

Delirium melancholicum, quod vulgo diaconi potentiae tribuitur.

## O. IV. VESANIÆ ANOMALÆ.

Morbi prioribus affines.

G. XXII. AMNESIA. 237

Omnis memoriae feriatio.

G. XXIII. AGRYPNIA. 238

Pervigilium continuum immodicumve.

## CL. IX. FLUXUS.

Ejectio fluidorum aut contentorum, quae  
quantitate, qualitate, desuetudine nota-  
bilis est.

## O. I. SANGUIFLUXUS.

Sanguinis vel sanguinolentae materiae ejec-  
tio sine alvi fluxu.

## 239 G. I. HÆMORRHAGIA.

Fluxus sanguinis e naribus.

## 240 G. II. HÆMOPTYSIS.

Sanguinis expectoratio cum tussi sine py-  
rexia acuta.

## 241 G. III. STOMACACE.

Fluxus sanguinis e gingivis saepius foetidis,  
putridisve.

## 242 G. IV. HÆMATEMESIS.

Sanguinis rejectio ex oesophago cum vo-  
mitorio conatu.

## G. V. HÆMaturia. 243

Sanguinis fluidive rubri per vias urinarias  
emissio.

## G. VI. MENORRHAGIA. 244

Sanguinis per uterus aut vaginam fluxus  
vitiosus.

## G. VII. ABORTUS. 245

Foetus immaturi, saepius cum menorrhagia  
ex utero exclusio.

## O. II. ALVIFLUXUS.

Materierum in primis viis contentarum vi-  
tiosa per os aut anum reje<sup>c</sup>tio.

I. *Alvifluxus sanguinolenti.*

## G. VIII. HEPATIRRHEA. 246

Alvifluxus per inferiora serofuso-cruentus nec  
ater nec torminosus.

## G. IX. HÆMORRHOIS. 247

Fluxus cruentus, ex podice, vel recto ma-  
rificis ruptis obfito.

## 60 GENERA MORBORUM

### 248 G. X. DYSENTERIA.

Frequens torminosa, saepe tenesmodes, focum cruentarum per inferiora dejectio.

### 249 G. XI. MELÆNA.

Fluidi atri per superiora, vel inferiora frequens rejectio.

II. *Alvifluxus non sanguinolenti.*

### 250 G. XII. NAUSEA.

Inanis vomendi conatus, et flatus tantum per os emissio; affinis est aëri fluxibus.

### 251 G. XIII. VOMITUS.

Palpabilium materierum, non cruentarum, facta per os, oesophagumque rejectio frequens.

### 252 G. XIV. ILEUS.

Atrox circa epigastrium dolor, seu gastrdynia, alvi constipatio, et foeculentæ demum materiae vomitio.

### 253 G. XV. CHOLERA.

Vomitio biliosa aut acris assidua et diarrhoea violenta cum dolore abdominis, virium prostratione et non raro surarum crampis.

- G. XVI. DIARRHŒA. 254  
Excrementitiorum humorum frequens, vel  
intempestiva dejectio.
- G. XVII. CŒLIACA. 255  
Albescentium, aut chilacearum materierum  
dejectio.
- G. XVIII. LIENTERIA. 256  
Celeris statim a pastu facta ingestorum, vix  
mutatorum dejectio.
- G. XIX. TENESMUS. 257  
Muci pauci frequens dejectio cum intensa  
dejiciendi cupiditate, et assiduo conatu.

## O. III. SERIFLUXUS.

Fluxus quivis nec cruentus nec alvinus.

- G. XX. EPHIDROSIS, *Hippocratis.* 258  
Sudoris quantitate, qualitate, intempestivi-  
tate peccantis effluxus.

- G. XXI. EPIPHORA. 259  
Vitiosus ex oculis humoris lachrymalis, se-  
bacei, vel purulenti effluxus.

## 62 GENERA MORBORUM

- 260 G. XXII. CORYZA, *Hippocr. Gorraei.*  
Def. Med. ...  
Humoris serosi, mucosive e naribus effluxus  
sine ozaena, saepius cum gravedine.
- 261 G. XXIII. PTYALISMUS.  
Salivae vel muci sine expectoratione ac vo-  
litione ex ore effluxus, aut emissio.
- 262 G. XXIV. ANACATHARSIS, *Hippocr.*  
*Galen. in Aph. 8. lib. 5.*  
fauci, lymphae, vel cujuscumque humoris  
facta cum tussi expectoratio constans et  
notabilis.
- 263 G. XXV. DIABETES.  
Subito post pastum potulentorum cum mag-  
na siti per urinae vias, emissio.
- 264 G. XXVI. ENURESIS.  
Involuntaria, doloris et ardoris expers, mictio.
- 265 G. XXVII. DYSURIA.  
Difficilis et dolorifica, saepius ardens, urinae  
immissio.
- 266 G. XXVIII. PYURIA.  
Purulentae, albescens, aut viscidо-mucosae  
materie mictio.

G. XXIX. LEUCORRHŒA, *Cayell.* 267  
Lex. *Bonet.* Anat. Pr. Lib. 3.

Serofo-flavae, vel puriformis materiae ex  
utero delapsus.

G. XXX. GONORRHŒA. 268

Stillicidium fluidi seminalis ex urethra, aut  
ex vagina.

G. XXXI. DYSPERMATISMUS, *D. Cuffon.* 269

Seminis in actu venereo stillatitia, tarda,  
impedita, et ad generationem insufficiens  
emissio.

G. XXXII. GALACTIRRHŒA. 270

Stillicidium laclis ex mammis.

G. XXXIII. OTORRHŒA, *Linn.* gen. 271

Fluxus ex auris cavo, ambitu, aut parte  
postica.

#### O. IV. AERIFLUXUS.

Flatus, halitusve vitiosa emissio.

64 GENERA MORBORUM

272 G. XXXIV. FLATULENTIA.

Flatuum ex primis viis per superiora aut inferiora frequens rejectio borborygmis stipata.

273 G. XXXV. ÆDOPSOPHIA.

Flatuum per urethram, vaginam, vel uterum emissio.

274 G. XXXVI. DYSODIA.

Miasmatum foetidorum exhalatio.

## CL. X. CACHEXIÆ.

Colores, figurae, molis in corporis habitu  
depravatio.

## O. I. MACIES.

Corporis partium mollium extenuatio.

G. I. TABES. 275

Macies cum amphimerina lenta sine tussi.

G. II. PHTHISIS, *Graec.* 276

Corporis emaciatio cum amphimerina len-  
ta, tussi, dyspnoea, et utplurimum puris  
sputo.

G. III. ATROPHIA. 277

Macies sine febre.

G. IV. ARIDURA, *Etmulleri.* 278

Macies unius tantum partis.

## O. II. INTUMESCENTIÆ.

Deformitas a volumine adaucto.

## 66 GENERA MORBORUM

### 279 G. V. POLYSARCIA.

Intumescientia universalis ab adipe molesta  
et corporis agilitatem minuens.

### 280 G. VI. PNEUMATOSIS.

Elastica et flatulenta cutis intumescientia.

### 281 G. VII. ANASARCA.

Cutis totius intumescientia, mollis, pallida,  
non elastica.

### 282 G. VIII. PHLEGMATIA.

Artuum inferiorum turgescientia mollis, non  
elastica, cuti concolor, indolens.

### 283 G. IX. PHYSCONIA.

Intumescientia abdominis a partibus solidis  
sine gravitate et fluctuatione.

### 284 G. X. GRAVIDITAS.

Intumescientia abdominis ab hypogastrio in-  
cipiens, opus generationis subsequens et  
partu terminanda.

## O. III. HYDROPS PARTIALES.

Tumores majores sed non universales, a flui-

do intra cavum capitis, abdominis, uteri,  
vel vesicae contento.

G. XI. HYDROCEPHALUS. 285

Tumor capitis, facie saepius excepta, mollis  
aut elasticus, a fluidi intra ipsum con-  
gestione.

G. XII. PHYSOCEPHALUS. 286

Tumor totius capitis tensus elasticus sub di-  
gito crepitans.

G. XIII. HYDRORACHITIS, *Morgagni*. 287

Tumor cysticus fero turgidus ex hiatu ver-  
tebrarum lumbarium in recens natis pro-  
tuberans cum anaesthesia.

G. XIV. ASCITES. 288

Hydrops totius abdominis a fluido non cla-  
stico, seu gravis et fluctuosus.

G. XV. HYDROMETRA. 289

Hypogastrii in mulieribus successive crescens  
tumor, uteri figuram referens, pressioni  
cedens, fluctuansve, ab ischuria et gravi-  
ditate diversus.

## 68 GENERA MORBORUM

### 290 G. XVI. PHYSOMETRA.

Constans, permanensque tumor levis, elasticus, uteri figuram, et sedem referens in mulierum hypogastrio.

### 291 G. XVII. T Y M P A N I T E S.

Hydrops totius abdominis a flatu, seu elasticus et levis.

### 292 G. XVIII. M E T E O R I S M U S.

Inflatio flatulenta, vel epigastrii, vel in morbo acuto ipsius abdominis.

### 293 G. XIX. I S C H U R I A.

Tumor hypogastrii ex urinae retentione facilius intra vesicam.

Species sunt.

#### I. Ischuriae renales.

Ischuria (*Nephritica*) a renum inflammatione,  
S. sp. I. Schacht. Institut. med. pract. lib.  
VIII. cap. I. et VIII. Gort. Syst. prax. med.  
de Ischur. Fabric. Hildan. de Lithot. cap. IV.  
Leal a Fonte, Conf. 59. Benet. Sepulchr. lib.  
III. sect. XXIV. obs. IV. § 3. Schenck. lib.  
III. de Ischur. fals. cap. IV. et V. Etmuller  
Coll. pract. pag. 994.

Ischuria (*Nephrolithica*) a renum calculo, S. sp.

2. *Schacht.* lib. citat. cap. II. et VIII. *Gort* lib. citat. de morb. renum. *Car. Pison.* de morb. a colluv. serof. *Schenck.* de Ischur. *Bonet.* Sepulchr. de urin. suppress. et Medic. septentrional. de Ischur. *Edinb.* Eff. II. 31.

*Ischuria (Nephroplethora)* renalis a plethora, S. sp. 3. *River.* Gent. I. obs. 1. et 89. *Etmull.* *Schacht.* loco citat. *Gaub.* Pathol. de vit. mict. *Ludwig.* Institut. med. clin. *Seb. Nafii Specul.* method. med. pag. 167..

*Ischuria (Lunatica)* renalis lunatica, S. sp. 4. *Tulp.* obs. med. lib. II. cap. 49.

*Ischuria (Nephrospastica)* renalis spasmodica, S. sp. 5. *Schacht.* *Gort.* lib. citat. *Sydenb.* Differ. epist. tom. I. *Raulin* des malad. vapor. Mem. de l'Acad. R. des Sc, ann. 1715.

*Ischuria (Nephremintica)* renalis verminosa, S. sp. 6. *Gort.* lib. citat. *Gaub.* Pathol. de vit. mict.

*Ischuria (Nephrothromboides)* renalis a sanguine congrumato, S. sp. 7. *Mercat.* de morb. intern. cur. cap. 12. *Etmull.* de lacr. urin. secret. pag. 314. *Fernel.* Pathol. lib. VI. cap. 13. *Gort.* *Gaub.* loc. citat.

*Ischuria (Nephropyica)* a renum purulentia, S. sp. 8. *Schenck.* lib. III. de ren. tumorib. *Gort.* *Gaub.* loc. citat. *Bonet.* Sepulchr. de urin. suppress. *Sal.* *Divers.* de affect. particularib. cap. 14.

## 70 GENERA MORBORUM

Ischuria (*Nephroplegmatica*) renalis petuitosa  
seu mucosa, S. sp. 9. *Sal.* *Divers.* loc. citat.  
*Graſii* *Ephem.* natur. cur. ann. III. obs. 212.  
*Schacht.* *Gort.* *Gaub.* *Mercat.* loc. citat. *Va-*  
*rand.* de ren. affect. *Bonet.* *Sepulchr.* de Is-  
chur. obs. IV. V.

Ischuria (*Nephroplegica*) renalis paralytodea, S.  
sp. 10. *Sal.* *Divers.* *Mercat.* loc. citat. *Hörſt.*  
tom. II. lib. IV. obs. 49. *Marcel.* *Donat.* *Hif-*  
*tor.* med. mirab. lib. IV. cap. 28. *Barthol.*  
Cent. IV. epist. 18. 38. 39. *Horchſet.* Obs.  
Dec. V. cas. 20. *Claud.* *Chaptal.* praet. Mons-  
pel.

Ischuria (*Suppleta*) renalis ab alia evacuatione  
suppleta, S. sp. 11.

- a. A diarrhoea et sudore, *Marcell.* *Donat.*  
*Hif.* med. mirab. lib. IV. cap. 27. *Schenck.*  
lib. III. de diabete, obs. 9.
- b. Ab otorrhagia, *Sennert.* ex plat. praet. lib. III.  
part. VIII. sect. II. cap. 9.
- c. A perspiratione, *Vandermond.* *Journ.* de med.  
tom. IV.
- d. A sudore, *Vandermond.* *Journ.* de med.  
tom. X.

### 2. Ischuriac uretericac.

Ischuria (*Ureteritica*) ureteritica inflammatoria,  
S. sp. 12. *Sal.* *Divers.* loc. citat. *Ludwig.*

Instit. clin. Gaub. Pathol. de vit. mięt. Schacht.

Instit. práct. de Ischur. spur.

Ischuria (*Ureterolithica*). Ischuria ureterica calcuosa, S. sp. 13. Tulp. Obs. med. lib. II. cap. 45. Monro Essais d'Edinb. tom. VI. art. 68. Bonet. Sepulchr. lib. III. de urin. suppress. Schenck. lib. III. de ureterib. Sal. Divers. loc. citat.

Ischuria (*Uretero-thromboïdes*). Ischuria ureterica, a sanguinis grumo, S. sp. 14. Sal. Divers. Schacht. Gaub. loc. cit. Bonet. Sepulchr. de urin. suppress. obs. I.

Ischuria (*Uretero-phlegmatica*) ureterica a pituita, S. sp. 15. Gort. Prax. med. syst. Schacht. Sal. Divers. loc. citat. Bonet. Sepulchr. de urin. suppress. Sabat. Nas. Spec. meth. med. loc. citat. Epiphan. Ferdinand. hist. 97.

Ischuria (*Uretoropyica*) ureterica purulenta, S. sp. 16. Gort. lib. cit. de ureter. morb. Schacht. Sal. loc. cit.

Ischuria (*Ureterostomatica*) ab orificio ureterum inferioris clausura, Theod. Eller. Miscell. Berlin. tom. IV. pag. 381. Verdier ex noel. Mem. de l'Acad. de Chirurg. tom. II. obs. 17. Lieutaud. Mem. de l'Acad. R. des Sc. anni 1753. Franc. Sylv. Deleboe, Prax. med. lib. II. Saltzmann. obs. anat. pag. 62.

## 3. Ischuriae vesicalès.

Ischuria (*Cystitica*) a vesicae inflammatione, S. sp. 18. *Schacht.* Instit. practic. Mem. de l'Acad. R. des Sc. ann. 1704, 1753. *Boneti* Sepulchr. lib. III. de urin. suppress. *Forst.* lib. XXV. obs. 27. 28. *Zacuti Lusitanus ex Galeno*, Hist. med. princ. lib. II. Hist. 150.

Ischuria (*Cystolithica*) a vesicae calculo, S. sp. 19. *Tulpis* observ. med. lib. IV. cap. 37. *Essais d'Edinburg*, tom. IV. *Forstii* lib. XXV. obs. 23. *Fabric. Hildani*, Cent. III. observ. 67. *Car. Pisonis* de morb. a colluv. seros. *Boneti* Sepulchr. de urin. suppress. obs. X. &c.

Ischuria (*Cyllospastica*) a sphincteris vesicae spasmico, S. sp. 20. *Mercati* de morb. intern. cur. lib. IV. cap. 22. *Sebast. Nasi Specul.* method. med. part. II. pag. 267. *Nenteri* de Ischur. *Schachtii*, *Gorterii*, *Gaubii*, *Varendaei*, loc. citat.

Ischuria (*Cystoplegica*) a vesicae paralysi, S. sp. 21. *Lieutaud.* Compend. medic. de Ischur. *Zacut. Lusitanus ex Galeno* Hist. princ. hist. 140. *Mangeti* Biblioth. medic. pract. tom IV. *Serrane* Thes. pro Reg. Cathedr. *Hollerii* de morb. intern. cap. 47. *Amat. Lusitanus* Cent. IV. cur 10. *Pringle* Essais d'Edinburg, tom. I. artic. 32. *Lond. Med. Obs.* I. 10.

*Ischuria (Polyurica)* a vesica lotio diutius cohibito distenta, S. sp. 22. *Halleri Praelect.* in *Boerhaave*, tom. II. § 384. pag. 336. *Forest.* lib. XXV. observ. 14. *Nenter.* de *Ischuria Paraei* lib. XVI. cap. 48. *Sennert.* Pract. lib. III. part. VIII. sect. I. cap. 4. *Etmulleri, Riverii, Varandaei de Ischur.* &c.

*Ischuria (Cystopyica)* vesicalis purulenta, *Felic. Plateri Mantis.* obs. 29. *Camerar.* Ephem. natur. curios. tom. II. *Zacuti Lusitani ex Galeno,* Hist. medic. princip. hist. 148. *Hollerii de morb. intern.* cap. 47. *Sebast. Nasii Specul.* method. med. part. XI. pag. 167. *Andre des maladies de l'urethre,* obs. 16. *Vandermonde Journ. de med.* tom. IX.

*Ischuria (Cystothromboides)* vesicalis a sanguinis grumo, S. sp. 24. *Claudini consult.* 141. *Fabric.* *Hildani Cent.* III. obs. 66. *Foresti lib.* XXV. obs. 20. *Zacuti Lusitani ex Galeno* Hist. med. princip. hist. 145. et ejusdem *Prax.* med. admirab. lib. II. cap. 65. *Mercati de morb. intern.* cur. cap. 12.

*Ischuria (Cystophlegmatica)* vesicalis a muco, S. sp. 25. *Mercati loc. citat.* *Schacht.* Institut. medic. pract. lib. VIII. cap. 9. *Etmulleri de Ischur.* vesicat. *Amati Lusitani, Cent.* VI. cur. 12. *Zacuti Lusitani, Prax.* med. admirab. lib. II. observ. 64. *Boneti ex Thom. Bartholin.* de urin. suppress. obs. 17.

74 GENERA MORBORUM

Ischuria (*Ectopystica*) a vesicæ ectopia, S. sp. 26.

a. Herniosa, seu a cystocele, *Verdier Mem. de l'Acad. de Chirurg. tom. II. observ. 4. 6. 9.*

*i. 10; 14. Felic. Plater: obs. pag. 830.*

b. Protoica, seu ab exocyste, *Verdier ex Noel. lib. citat. obs. 17.*

Ischuria (*Cystoproctica*) vesicalis ab intestino recto, scybalis, calculo, flatibus, inflammatione, abscessu, haemorrhoidibus turgente. *Dodonei Observ. medic. cap. 47. Schenck. lib. III. de Ischur. observ. 6. Wepferi Dissert. de Apopl. pag. 391. Vandermonde Journ. de med. tom. IX. pag. 261. Boneti Sepulchret. de urin. suppress. observ. 18. § 4. Schacht. Gaubii, loc. citat.*

Ischuria (*Hysterocystica*) vesicalis ab utero, S. sp. 28.

a. Gravido, *Nordman. Dissert. de Ischur. gravidar. Mauriceau, lib. I. cap. XV. Roderici a castro, lib. II. cap. XV.*

b. Parturiente, *Boneti ex Riglani de urin. suppress. Vandermonde ex Daran. Journ. de med. tom. V.*

c. Hydropico, *Hippocrat. de morb. mulier. lib. 12. Semnerti Pract. lib. IV. part. I. sect. II. cap. XI. Schenck. lib. IV. de mol. fals. Schachtii, Gaubii, loc. citat.*

d. Tumoribus distento, *Gaubii, Schachtii, loc. citat. Semnerti ibidem, ac supra, cap. XIII. Knœffelii, E. N. C. ann. IV.*

c. Prociduo, *Nordmann.* Dissert. citata. *Sabatier.* Mem. de l'Acad. de Chirurg. tom. III. *Sennerfi* ibid. ac supra, cap. XVI.

*Ischuria (Atretarum) urethrocyistica a menstruis in vagina retentis*, S. sp. 29. *Amyand* Transact. philos. ann. 1732. No. 442. art. 8. pag. 45. *Schenck.* lib. IV. de part. genit. mulier. observ. 9. *Heister.* Chirurg. tom. II. pag. 951. *Astruc.* de morb. mulier. tom. I. lib. 1. cap. 5.

*Ischuria paradoxa*, S. sp. 30. *Morgagni* Epistol. *Le Clerc.* Journ. de med. Juill. 1755, p. 11.

#### 4. Ischuriae urethrales.

*Ischuria (Perinaealis) urethralis a perinaci tumore*, S. sp. 31. *Galen.* lib. de affect. loc. et ex co *Zacuti Lusitan.* Hist. 149. *Vandermonde* ex *Daran.* Journ. de med. tom. V. pag. 291. *Tulp.* Observ. med. lib. III. cap. X. *Forest* lib. XXVI. observ. 2.

*Ischuria (Urethrolithica) a calculo urethrae impaecto*, S. sp. 32. *Schmid.* Eph. nat. cur. decad. I. ann. VIII. obsf. 89. *Winckler.* ibid. tom. VI. obsf. 34. *Zacut. Lusitan.* Prax. med. admirab. lib. II. observ. 66. 67. 68. *Tulp.* Obser. med. lib. III. cap. VIII. *Bonet.* Sepulchr. de urin. suppress. obsf. 14. *Barthol.* cent. IV. epist. 5. *Heister.* Chirurg. tom. II. pag. 839.

## 76 GENERA MORBORUM

Ischuria (*Urethrophlegmatica*) a muco urethram infarciente, S. sp. 33. *Bonet.* Sepulchr. et medic. septent. *Manget.* Biblioth. med. pract. *Amat.* *Lusitan.* cent. V. observ. 71. *Forest.* libr. XXV. observ. 25. *Varand.* de Ischur. *Lud. Apin.* Eph. nat. cur. decad. III. ann. III. observ. 69.

Ischuria (*Urethrothromboides*) à sanguinis grumo urethram opplente, S. sp. 34. *Bonet.* Med. septentrion. de Ischur. et sepulchr. de urin. suppress. obs. XI. *Forest.* lib. 25. obs. 25.

Ischuria (*Urethropyica*) a pure urethram obstruente, S. sp. 35. *Bonet.* Med. septentr. de Ischur. *Forest.* Scholio modo citat. *Boerhaave Praefat.*

Ischuria (*Urethrohymenodes*) a membrana in urethram impacta, S. sp. 36. Hist. de l'Acad. R. des Sc. ann. 1714, hist. pag. 22.

Ischuria (*Urethrelmintica*) urethralis verminosa, S. sp. 37. *Joan. Petr. Albreicht.* Vid. *Bonet.* Medicinam septentrionalem de urin. cap. 31. et *Manget.* Biblioth. med. pract. tom. IV. de morb. urin. spectant. *Vandermonde Journ.* de med. Septembre 1758, pag. 245. *Joan. Rhodii Centur.* 3. observ. 36. Collect. Acad. tom. 3. pag. 497. observ. 77.

Ischuria (*Urethritica*) ab urethrae inflammatione, S. sp. 38. *Hildan.* Cent. IV. obs. 54. *Forest.* de incert. urin. judiciis, lib. III. cap. 3. ver-

fus finem. *Varand.* de affectib. ren. et vesic. cap. VII. *Bonet.* Medic. septentr. de Ischuria, cap. I. No. V. *Goulard.* de malad. de l'urethre. *Heijer.* Chirurg. tom. 2. pag. 838. Lond. Med. Obs. vi. 24.

Ischuria (*Carunculosa*) a morbis, ut vocant, urethrae, S. sp. 39. *Amat. Lusitan.* cent. IV. cur. 19. Cent. V. cur. 48. *Sharp Recherches critic.* cap. IV. *Goulard.* des Malad. de l'urethre. *Heijer.* Chirurg. tom. II. pag. 834. *Andre* des maladies de l'urethre, passim.

Ischuria (*Hydrocelodes*) ab urethrae ruptura in scrotum hiante, S. sp. 40. *Joan. Lud. Apin.* Miscell. nat. cur. decad. III. ann. III. obs. 68.

Ischuria (*Cryptopyica*) a penis intra corpus retraktione, S. sp. 41. *Fred. Hoffm.* Consult. de morb. abdom. cas. 105.

Ischuria (*Peridesmica*) a vinculo strictiori peni injecto, S. sp. 42. *Bonet.* med. septentr. de Ischuria, cap. I. No. VIII.

Ischuria (*Phimatica*) urethralis a phimosis, S. sp. 43. *Horst.* tom. II. lib. IV. pag. 274.; *Goulard.* de malad. de l'urethre, *Heijer.* Chirurg. tom. II. pag. 818. *Bonet.* Sepulchr. de Ischur. obs. XV.

Ischuria (*Aspadialis*) ab urethrae clausura, S. sp. 44. *Heijer.* Chirurg. tom. II. pag. 818. et 951. *Horst.* tom. II. obs. 55. *Joan. Wieri* obs. pag. 221. *Bonet.* Sepulchr. de urin. suppref. observ. XV. schol. et med. septentr. de Ischur. cap. 2. § 6.

## O. IV. T U B E R A.

Tumores partium solidarum, non hydropici.

## 294 G. XX. R A C H I T I S.

Deformitas ex articulorum tumore duro,  
carnium marcore, capitis mole, cum in-  
genio praeoccisi, in puerulis.

295 G. XXI. SCROPHULA, *J. Allen.* Sy-  
nopsis.

Tumor scirrhosus glandulorum colli, mesen-  
terique, cum labiis et nafo crassioribus.

## 296 G. XXII. C A R C I N O M A.

Ulcera cancrosa cum doloribus lancinganti-  
bus.

## 297 G. XXIII. L E O N T I A S I S.

Papillae setaceae vel corniculatae cutim ex-  
asperantes.

## 298 G. XXIV. M A L I S.

Tumores saepius purulenti, vel ulcera, cum  
infectis vermiforibus, passim enata.

## 299 G. XXV. F R A M B Æ S I A.

Excrecentia fungosae, mori instar granulo-  
sae saepius cum ulceribus, &c.

## O. V. IMPETIGINES.

Morbi chronicī saepius contagiosi qui cutis excrecentias, tumores gregales, exulcerationes, crustas, &c. inducunt.

## G. XXVI. SYPHILIS.

300

Post impurum concubitum ulceracula, porri, bubones, fici primo ut plurimum in genitalibus, praegressa non raro gonorrhoca, dein pustulae crustosae, dolores nocturni, exostoses, caries, &c. in caeteris partibus.

## G. XXVII. SCORBUTUS.

301

Stomiacace cum maculis lividis, flavis, purpuro-violaceis potissimum tibiarum.

## XXVIII. ELEPHANTIASIS.

302

Facies deformis tuberibus callosis, ozaena, raucedo, cutis elephantina crassa unctuosa, in extremis artubus anaesthesia.

## G. XXIX. LEPROZA.

303

Tubercula callosa, scabie majora, vel crustis et squamis diffusa, herpetica, per cutem dispersa, pruriginosa.

80 GENERA MORBORUM

304 G. XXX. SCABIES.

Pustulae crustosae, lentis magnitudine, pru-  
riginosae manus potissimum obsidentes.

305 G. XXXI. TINEA.

Crustae flavae vel griseac, ulcerofae, per ca-  
put dispersae.

O. VI. ICTERITIAE.

Totius cutis color inassuetus sine pyrexia  
acuta.

306 G. XXXII. AURIGO.

Oculorum et cutis flavedo ad auream vel  
aurantiam vergens.

307 G. XXXIII. MELASICTERUS.

Cutis color niger, vel atro-lividus, atro-fu-  
liginosus.

308 G. XXXIV. PHENIGMUS.

Rubor diffusus, vel maculosus sine pyrexia.

G. XXXV. CHLOROSIS, *Sennerti* qui 309  
falso nomen Hippocrati tribuit.

Pallor, vel fuscus color cutis, oculis minime  
flavis, saepius cum pica.

## O.VII.CACHEXIÆ ANOMALÆ.

Signa classeos et affinitas cum prioribus or-  
dinibus.

G. XXXVI. PHTHIRIASIS. 310

Exortus pediculorum vel insectorum pedicu-  
lis affinium ex diversis corporis partibus,  
quas porrigine, ulcusculisque defoedant,  
aut puncturis, pruritu diseruciant.

G. XXXVII. TRICHOMA, *Jachii.* 311

Capilli invicem complicati, agglutinati in  
globos inextricabiles, saepius cum phthi-  
riasi.

G. XXXVIII. ALOPECIA. 312

Capillorum lapsus cum cuticulae desqua-  
tione.

82 GENERA MORBORUM.

313 G. XXXIX. ELCOSIS.

Numerosa vel ampla ulcera chronica, cariofa, foctida cum pyrexia lenta.

314 G. XL. GANGRAENA.

Initio mors partis, dein ejus putrida disolutio.

315 G. XLI. NECROSIS.

Partis mors, sine tumore praevio, deinde vero exsiccatio, induratio, nigredo.

PARS SECUNDA,

G E N E R A

M O R B O R U M

D E F I N I T A,

Ab Illustri

CAROLO A. LINNE,

EQUITE AURATO, ARCHIATRO, &c. &c.

Upsaliae 1763.



# CLAVIS CLASSIUM.

## M O R B I.

Febriles (e sanguine in medullam.)

EXANTHEMATICI	I
CRITICI	II
PHLOGISTICI	III

Temperati

Nervini

Sensationis	DOLOROSI	IV
Judicii	MENTALES	V

Motus

QUIETALES	VI
MOTORII	VII

Fluidi secretionis

SUPPRESSORII	VIII
EVACUATORII	IX

Solidi

Interni	DEFORMES	X
Externi	VITIA	XI

36 GENERA MORBORUM

EXANTHEMATICI Febris cum efflorescentia cutis maculata.

CRITICI Febris cum Urinae hypostasi lateritia.

PHLOGISTICI Febris cum Pulsu duro, Dolore topico.

DOLOROSI Doloris sensatio.

MENTALES Judicii alienatio.

QUIETALES Motus abolitio.

MOTORII Motus involuntarius.

SUPPRESSORII Meatum impeditio.

EVACUATORII Fluidorum evacuatio.

DEFORMES Solidorum facies mutata.

VITIA Externa palpablia.

SYMPTOMATA se habent ad Morbum, ut Folia et Fulcra ad Plantam.

FEBRIS dignoscitur Pulsu citato.

# I. EXANTHEMATICI.

## I. C O N T A G I O S I.

### I. M O R T A.

*Phlyctenae* (273) aliquot in Abdomine si-  
ve Artibus, magnitudine avellanae.

*Febris Diaria* (11) malignissima, funestissima.

### II. P E S T I S.

*Anthraces* (272) seu *Bubones* (271) gran-  
graenosi (233).

*Febris Synocha* (12) acutissima, funestissima,  
Vertigo (74), Anxetas (89), Lipyria.

### III. V A R I O L A.

*Pustulae* (274) erysipelaceae, suppurantes,  
escharoticae (280), deciduae, cicatrisan-  
tes (317).

*Febris Synochus* (13), Cephalalgia (40),  
Lumbago (62).

### IV. R U B E O L A.

*Papulae* (275) uniformes, rubrae, evanescen-  
ti-furfuraceae.

## 88 GENERA MORBORUM

*Febris Synocha* (12), *Sternutatio* (154), *E-*  
*piphora* (172), *Tussis* (155) *sicca.*

### V. PETECHIA.

*Sudamina* (321) *livido-lurida*, *superficialia*,  
*insensibilia.*

*Febris exacerbans* (23) *Asthenia* (92), *A-*  
*grypnia* (130).

### VI. SYPHYLIS.

*Nodi* (262) *Ulcuscula*, *Myrmeciae* (279).

*Febris Lenta* (14) *nocturna*, *dolore ostoco-*  
*po* (61), *Marcore* (209), *Stranguria* (196),  
*Angina* (46).

## II. SPORADICI.

### VII. MILIARIA.

*Papulae* (275) *rotundae*, *immersae*, *diver-*  
*ficolores*, *confertae*, *intacta facie*, *pruri-*  
*ginosae.*

*Febris Synocha* (12), *Sudore* (207) *foetido*,  
*punctorio.*

### VIII. UREDO.

*Sudamina* (321) *inaequalia*, *ruberrima*, *dila-*

bilia, pruriginosa, fugacia, recidivantia, furfuraceo-evanescentia.

*Febris Hectica* (24) benigna brevis.

#### IX. A P H T A.

*Escharae* (280) albidae, rotundae, ductibus excretoriis internis innatae.

*Febris Lenta* (14) obscura, cum Somnolentia (96).

### III. SOLITARI.

#### X. E R Y S I P E L A S.

*Macula rubens, urens, pressione diffimulanda, tumidiuscula, superficialis, dilatabilis, desquamatione finienda.*

*Febris Synocha* (12), initio acuta, cum inquietudine.

Prototypus Exanthematicorum *Erysipelas* (10) est.

*Dysenteria* (191) ad Contagiosos referreretur, modo Scabies (263) interna in oculos caderebat.

*Malignitatis* symptomata imprimis sunt: *Lipothymia* (93), *Delirium* (65), *Vertigo* (74), *Oblivio* (107), *Anæsthesia* (118), *Lipyria*, *Carpologia* (135) *Anhelatio* (157), *Aphonia* (115), *Aglutitio* (164).

# GENERA MORBORUM

## II. CRITICI.

### I. CONTINENTES.

#### XI. DIARIA.

Febris terminanda intra sc̄ptimanam dimidiām.

#### XII. SYNOCHA.

Febris terminanda intra septimanam unicam.

#### XIII. SYNOCHUS.

Febris terminanda intra septimanas duas vel tres.

#### XIV. LENTA.

Febris protrahenda ultra septimanas tres.

### II. INTERMITTENTES.

#### XV. QUOTIDIANA.

Febris paroxysmi similes nycthemeris singulis.

# L I N N Æ I.

## XVI. T E R T I A N A.

Febris paroxysmi similes nycthemeris alternis.

## XVII. Q U A R T A N A.

Febris paroxysmi similes nycthemeris tertii.

## XVIII. D U P L I C A N A.

Febris paroxysmi similes alternati.

## XIX. E R R A N A.

Febris paroxysmi dissimiles omnes.

## III. EXACERBANTES.

### XX. A M P H E M E R I N A.

Febris continens (14) cum Quotidiana (15).

### XXI. T R I T Æ U S.

Febris continens (14) cum Tertiana (16).

### XXII. T E T A R T O P H I A.

Febris continens (14) cum Quartana (17).

92 GENERA MORBORUM

XXIII. HEMITRITÆA.

Febris Tritaeus (21) cum Amphemerina (20).

XXIV. HECTICA.

Febris Lenta (14) cum Duplicana (18).

*Protypus Criticorum Tertiana (16) sit, aut potius Rheumatismus (62).*

Apyria est deflagratio febris.

Phthisis (203) posset post Hecticam (24) collocari, si ordo naturalis admitteret et expectoratio.

Lethargus (98) cum Febricula his affinis est.

### III. PHLOGISTICI.

#### I. MEMBRANACEI.

##### XXV. PHRENITIS.

Inflammatio (231) *Meningum.*

*Febris Synocha* (12), *Cephalalgia* (40), *Furor* (68), *Anxetas* (89), *Syringmos* (72), *Ophthalmia* (43), *Carpologia* (135), *Oblivio* (107).

##### XXVI. PARAPHRENESIS.

Inflammatio (231) *Diaphragmatis.*

*Febr.* *Peripneumonia* (34), *Phrenitis* (25).

##### XXVII. PLEURITIS.

Inflammatio (231) *Pleurae.*

*Febr.* *Synocha* (12), *Dyspnoea* (160), *Tussis* (155), *Haemoptysis* (179), *Pleuritica* (53).

##### XXVIII. GASTRITIS.

Inflammatio (231) *Ventriculi.*

*Febr.* *Amphemerina* (20), *Lipyria*, *Anxetas* (89), *Vomitus* (183) *ingestorum*, *Cardialgia* (48).

## 94 GENERA MORBORUM

### XXIX. ENTERITIS.

Inflammatio (231) *Intestini*.

*Febr.* cum evacuatione abdominis, colica  
(50) atroci, tensiva, calente.

### XXX. PROCTITIS.

Inflammatio (231) *Ani*.

*Febr.* Proctica (59) cum Tenesmo (193).

### XXXI. CYSTITIS.

Inflammatio (231) *Vesicae*.

*Febr.* Dolor Hypogastrii cum tumore inflam-  
matorio, Dysuria (57), Tenesmo (193).

## II. PARENCHYMATICI.

### XXXII. SPHACELISMUS.

Inflammatio (231) *Encephali*.

*Febr.* Synochus (13), Delirium (65,) Carpo-  
logia (135), Asthenia (92), Immobilitas,  
Anaesthesia (118), Aphonia (115).

### XXXIII. CYNANCHE.

Inflammatio (231) *Faucis*.

*Febr.* Synocha (12), Tussis (155), Aglutitio

(164), Orthopnoea (162), Angina (46), Suffocatio (158), Linguae intumescentia.

#### XXXIV. PERIPNEUMONIA.

Inflammatio (231) *Pulmonis.*

*Febr.* Synocha (13), Tussis (155), Haemoptysis (179), Dyspnoea (160), Interscapulii dolor, Cubatus supinus.

#### XXXV. HEPATITIS.

Inflammatio (231) *Fecinoris.*

*Febr.* Amphemerina (20), Tussis (155) sicca, Asthma (161), Singultus (153), Hypochondrii dextri tensio calens.

#### XXXVI. SPLENITIS.

Inflammatio (231) *Lienis.*

*Febr.* Tetartophia (22), Respiratio intersecta (149), Hypochondrii sinistri tumor pulsatorius.

#### XXXVII. NEPHRITIS.

Inflammatio (231) *Renis.*

*Febr.* Synochus (13) irregularis, Nausea (182), Singultus (153), Ructus (181), Urinae varietas, Obstipatio (166), Lumbago (62) urens, Femoris stupor (105).

XXXVIII. HYSTERITIS.

Inflammatio (231) Uteri.

Febr. Delirium (65), Spasmus (121), Sardiasis (125), Dolor hypogastrii tumorque calens.

III. MUSCULOSI.

XXXIX. PHLEGMONE.

Inflammatio (231) Partis Externae.

Febris ex partis externae tumore pulsatorio,  
Rubore tensivo, calente.

Lipyria dum externa frigent, interna fervent.

Prototypus Phlogisticorum Phlegmone (39) est.

Delirium (65) quasi primus gradus Phrenitidis est.

## IV. DOLOROSI.

### I. INTRINSECI.

#### XL. CEPHALALGIA.

*Capitis* totius aut portionis dolor gravatus.

#### XLI. HEMICRANIA.

*Capitis* lateralis dolor tensivus.

#### XLII. GRAVEDO.

*Frontis* dolor pressorius.

#### XLIII. OPHTHALMIA.

*Oculi* dolor.

#### XLIV. OTALGIA.

*Auris* dolor.

#### XLV. ODONTALGIA.

*Dentis* dolor maxillaris.

#### XLVI. ANGINA.

*Faucis* dolor cum suffocatione (158).

98 GENERA MORBORUM

XLVII. S O D A.

*Oesophagi* dolor rancido dcurens Ru<sup>c</sup>tibus  
(181) calidis.

XLVIII. C A R D I A L G I A.

*Cardiae* dolor scrobiculi subsyncopalis (94).

XLIX. G A S T R I C A.

*Ventriculi* dolor epigastrii.

L. C O L I C A.

*Intestini* dolor umbilicalis cum torminibus  
(123).

LI. H E P A T I C A.

*Fecinoris* dolor hypochondrii dextri.

LII. S P L E N I C A.

*Lienis* dolor hypochondrii sinistri, suspiria  
(150).

LIII. P L E U R I T I C A.

*Thoracis* dolor lateralis punc<sup>r</sup>torius.

LIV. P N E U M O N I C A.

*Pulmonis* dolor cum Orthopnoea (162), Tussi  
(155), Haemoptysi (179).

## LV. HYS T E R A L G I A.

*Uteri dolor.*

## LVI. N E P H R I T I C A.

*Renis dolor.*

## LVII. D Y S U R I A.

*Vesicae dolor.*

## LVIII. P U D E N D A G R A.

*Genitalis dolor.*

## LIX. P R O C T I C A.

*Ani dolor.*

## II. E X T R I N S E C I.

## LX. A R T H R I T I S.

*Geniculorum dolor periodicus;*

*a Synovia corrupta.*

## LXI. O S T O C O P U S.

*Articulorum dolor internus fixus;*

*a Periostio infecto.*

## LXII. R H E U M A T I S M U S.

*Musculorum dolor ad motum;*

*a Tunica cellulosa infecta.*

100 GENERA MORBORUM

LXIII. VOLATICA.

*Vasorum dolor migrans.*

LXIV. PRURITUS.

*Cutis titillatio occulta, Scalpendi necessitatem induens.*

Raphania (145) dolore intensio his affinis: Ob Spasmos vero et Convulsiones sequentibus.

## V. MENTALES.

## I. IDEALES.

## LXV. DELIRIUM.

Insania acuta, transitoria, symptomatica cum febre.

## LXVI. PARAPHROSYNE.

Insania acuta, periodica, sine febre.

## LXVII. AMENTIA.

Insania chronica, universalis, innocua.

## LXVIII. MANIA.

Insania chronica, universalis, furibunda.

## LXIX. DÆMONIA.

Insania chronica, partialis, furibunda, meticuloſa, de Daemonibus.

## LXX. VESANIA.

Insania chronica, partialis, tranquilla.

## LXXI. MELANCHOLIA.

Insania chronica, partialis, moesta, meditabunda,

## II. IMAGINARII.

## LXXII. SYRINGMOS.

Perceptio *Soni tinnitantis* falsi.

## LXXIII. PHANTASMA.

Perceptio *Visibilis objecti* falsi.

## LXXIV. VERTIGO.

Perceptio circumgyrationis falsae.

## LXXV. PANOPHOBIA.

Imaginatio *mali* falsi in solitudine.

## LXXVI. HYPOCHONDRIASIS.

Imaginatio *fati lethalis* e levi malo, Berbor-  
iygmi (123), Ructus (181) acidi, Palpi-  
tationes (132), Praecordia tremula, Per-  
suasio.

## LXXVII. SOMNAMBULISMUS.

Imaginatio *sommiantis* fortior, qua motus vo-  
lunтарии excitantur.

## III. PATHETICI.

## LXXVIII. CITTÀ.

Desiderium *non Esculenti* ingerendi.

## LXXIX. BULIMIA.

Desiderium *Cibi inexplebile.*

## LXXX. POLYDIPSIA.

Desiderium *Potus continuum.*

## LXXXI. SATYRIASIS.

Desiderium *Veneris enorme.*

## LXXXII. EROTOMANIA.

Desiderium *Amantium pudicum.*

## LXXXIII. NOSTALGIA.

Desiderium *Patriae Affiniumve.*

## LXXXIV. TARANTISMUS.

Desiderium *Choreae (saepe a morsura insecti).*

## LXXXV. RABIES.

Desiderium *Mordendi lacerandique innocuos (saepe a Morsura Mammalis).*

## LXXXVI. HYDROPHOBIA.

Aversatio *Potulentorum cum Rigore (141) et Sardiahi (125); (sapientis praecedenti maritata).*

104 GENERA MORBORUM

LXXXVII. CACOSITIA.

Aversatio *Cibi* cum horrore.

LXXXVIII. ANTIPATHIA.

Aversatio *objecti* particularis.

LXXXIX. ANXIETAS.

Aversatio *mundanarum rerum*.

(*Cordis dolor*).

## VI. QUIETALES.

## I. DEFECTIVI.

## XC. LASSITUDO.

Debilitas constans musculorum ponderosa,  
quiètem inducens.

## XCI. LANGUOR.

Debilitas successiva virium vitalium, non re-  
paranda quiete et cibatione.

## XCII. ASTHENIA.

Debilitas successiva virium omnium.

## XCIII. LIPOTHYMYIA.

Defectio motus sensusque subita ; superstite  
Pulsu Menteque.

## XCIV. SYNCOPÆ.

Lapsus virium vitalium subitaneus ; abolitis  
Pulsu, Respiratione, Sensu, Calore.

## XCV. ASPHIXIA.

Lapsus virium animalium vitaliumque per-  
sistens.

1c6 GENERA MORBORUM

II. S O P O R O S I.

XCVI. SOMNOLEN TIA.

Sopor vigiliis protractior.

XCVII. TYPHOMANIA.

Sopor apparens cum Agrypnia (130).

XCVIII. LETHARGUS.

Somnolentia constans, levis, febrilis, Delirio  
(65) oblivioso.

XCIX. CATAPHORA.

Sopor constans allocutione evigilans.

C. C A R U S.

Sopor constans cum insensibilitate, respira-  
tioneque tacita.

CI. APOPLEXIA.

Sopor constans cum insensibilitate, Respira-  
tioneque stertorosa (156).

CII. PARAPLEGIA.

Sopor constans partium sub thorace.

CIII. HEMIPLEGIA.

Sopor constans lateris alterius.

## CIV. PARALYSIS.

Sopor constans partis alicujus.

## CV. STUPOR.

Sopor transitorius partis alicujus cum sensu formicationis.

## III. PRIVATIVI.

## CVI. MOROSIS.

*Imaginationis* defectus.

## CVII. OBLIVIO.

*Memoriae* defectus.

## CVIII. AMBLYOPIA.

*Visus* obscuritas sine vitio sensibili.

## CIX. CATARACTA.

*Visus* privatio cum vitio observabili.

## CX. AMAUROSIS.

*Visus* privatio sine vitio sensibili, pupilla dilata.

## CXI. SCOTOMIA.

*Visus* Lypothymia (93) momentanea.

## CXII. COPHOSIS.

*Auditus* defectus.

108 GENERA MORBORUM

CXIII. ANOSMIA.

*Olfactus* defectus.

CXIV. AGEUSTIA.

*Gustus* defectus.

CXV. APHONIA.

*Loquelae* privatio.

CXVI. ANOREXIA.

*Famis* defectus.

CXVII. ADIPSIA.

*Sitis* defectus.

CXVIII. ANÆSTHESIA.

*Tactus* sensationis defectus.

CXIX. ATENIA.

*Libidinis* defectus.

CXX. ATONIA.

*Fibrarum Muscularium contractionis defec-  
tus.*

## VII. MOTORII.

## I. SPASTICI.

## CXXI. SPASMUS.

*Artus distentio violenta, subitanea, fugax.*

## CXXII. PRIAPISMUS.

*Penis spastica intumescientia.*

## CXXIII. BORBORYGMUS.

*Intestinorum contractio boans.*

## CXXIV. TRISMOS.

*Mandibularum clausura arcta.*

## CXXV. SARDIASIS.

*Oris retractio risum mentiens, fugax.*

## CXXVI. HYSTERIA.

*Praecordiorum pressio sub pectore, cum flatulentia (165), Suffocatione (158), Anxieta (89), Palpitatione (132), verticis pressione.*

110. GENERA MORBORUM

CXXVII. TETANUS.

*Corporis rigiditas cum sensibilitate.*

CXXVIII. CATOCHUS.

*Corporis rigiditas cum insensibilitate.*

CXXIX. CATALEPSIS.

*Corporis totius recepta forma, constans, flexilis, cum insensibilitate.*

CXXX. AGRYPNIA.

*Sensorii rigiditas spastica, continua (*Pervigilium*).*

II. AGITATORII.

CXXXI. TREMOR.

*Partium agitatio continua, chronica, absque frigoris sensu.*

CXXXII. PALPITATIO.

*Cordis Viscerisve motus subsultorius.*

CXXXIII. ORGASMUS.

*Arteriarum subsultus.*

CXXXIV. SUBSULTUS.

*Tendinum subsultoria elevatio.*

## CXXXV. CARPOLOGIA.

*Digitorum tremula contractio inscia.*

## CXXXVI. STRIDOR.

*Manducatio sonora, vacua.*

## CXXXVII. HIPPOS.

*Palpebrarum nictitatio frequentissima.*

## CXXXVIII. PSELLISMUS.

*Loquelae titubatio in quibusdam literis.*

## CXXXIX. CHOREA.

*Lateris agitatio tremula, continua, inordinata.*

## CXL. BERIBERI.

*Partium tremor (131), Genuum contractura (299), Stupor (105), Raucedo (146).*

## CXLI. RIGOR.

*Partium vibratio periodica, cum frigoris intercutanei sensu.*

## CXLII. CONVULSIO.

*Partium agitatio violenta, periodica, cum sensibilitate.*

## CXLIII. EPILEPSIA.

*Corporis agitatio periodica, chronica, cum insensibilitate.*

CXLIV. HIERANOSOS.

*Corporis agitatio continua, indolens, convulsiva, cum sensibilitate.*

CXLV. RAPHANIA.

*Articulorum contractio spastica, cum Agitatione convulsiva, Dolore violentissimo, periodico.*

## VIII. SUPPRESSORII.

## I. SUFFOCATORII.

## CXLVI. RAUCEDO.

*Vocis* sibilans elocutio ab arescentia pneumatica.

## CXLVII. VOCIFERATIO.

*Vocis* dolorosa exaltataque exclamatio.

*Ad corpus indurandum.*

## CXLVIII. RISSUS.

*Exspiratio* profunda, agitatoria, cum Sardiasi (125).

*Ad Sanguinem e Cordé expellendum.*

## CXLIX. FLETUS.

*Inspiratio* intersecta, singultuosa, cito, suspiriosa, cum moestitia, gemitu, lacrymis (172).

*Ad sanguinem intra pulmones inglutendum.*

## CL. SUSPIRIUM.

*Inspiratio* profunda, agitatoria, lenta.

*Ad sanguinem e pulmonibus expellendum.*

## CLI. OSCITATIO.

*Inspiratio* tarda, adaucta, hians, spasmatica.

114 GENERA MORBORUM

*Ad sanguinem propellendum per pectus.*

CLII. PANDICULATIO.

*Inspiratio profunda, pressoria cum extensione corporis artuumque.*

*Ad sanguinem per vasorum anastomoses propellendum.*

CLIII. SINGULTUS.

*Inspiratio celer, convulsiva, momentanea, iterata, sonora.*

*Ad Cardiam evacuandam.*

CLIV. STERNUTATIO.

*Exspiratio sonora, convulsiva, celer, inspirationi lentae succedens.*

*Ad sinum Frontis evacuanum.*

CLV. TUSSIS.

*Exspiratio sonora, convulsiva, periodica.*

*Ad Trachaeam evacuandam.*

CLVI. STERTOR.

*Respiratio sonora, rauca, narium agitatione.*

*Ad mucum faucium subigendum.*

CLVII. ANHELATIO.

*Respiratio citatissima, profunda, laevis, fugax.*

*Ad sanguinem per pulmones accelerandum.*

## CLVIII. SUFFOCATIO.

*Respiratio angustatione faucium continua,  
sine febre.*

*A Tracheae angustatione.*

## CLIX. EMPYEMA.

*Respiratio gravis cum fluctuatione in cavo  
thoracis, post febrim.*

*A pure in cavum Thoracis effuso.*

## CLX. DYSPNÆA.

*Respiratio anhelosa (157), laboriosa, sine  
sensu angustationis faucium.*

*A pulmonum substantia oppilata.*

## CLXI. ASTHMA.

*Respiratio sterterosa (156), laboriosa, diffi-  
cili, chronica.*

*A Bronchiis oppilatis.*

## CLXII. ORTHOPNÆA.

*Respiratio suspiriosa (150), suffocatoria (158),  
acuta, subitanea.*

*A sanguinis per pulmones difficili transitu.*

## CLXIII. EPHIALTES.

*Respiratio profunda, suffocans (158), dor-  
mientis in dorso cum Somnio laborioso.*

*Ab Intestinorum inflatione premente.*

## II. CONSTRICTORII.

## CLXIV. A GLUTATIO.

*Deglutitio impedita.*

## CLXV. FLATULENTIA.

*Ructus (181) Crepitusque (194) impeditus,  
cum abdominis intumescentia.*

## CLXVI. OBSTIPATIO.

*Foecum exoneratio impedita.*

## CLXVII. ISCHURIA.

*Mictus impeditus.*

## CLXVIII. DYSMENORRHœA.

*Menstrua suppressa s. dolorifica.*

## CLXIX. DYSLOCHIA.

*Lochiorum suppressio.*

## CLXX. A GLACTATIO.

*Lactis defectus.*

## CLXXI. STERILITAS.

*Genituræ suppressio.*

## IX. EVACUATORII.

### I. C A P I T I S.

#### CLXXII. O T O R R H Œ A.

*Auris* purulentus fluxus.

#### CLXXIII. E P I P H O R A.

*Oculi* lacrymalis fluxus continuus.

#### CLXXIV. HÆMORRHAGIA.

*Naris* sanguineus fluxus.

#### CLXXV. C O R Y Z A.

*Naris* mucosus fluxus, copiosus, continuus.

#### CLXXVI. STOMACACE.

*Oris* sanguinea e gingivis cruentatio.

#### CLXXVII. PTYALISMUS.

*Oris* salivalis c glandulis copiosissimus effluxus,

II. THORACIS.

CLXXVIII. SCREATUS.

*Faucis muci sonora evacuatio.*

CLXXIX. EXPECTORATIO.

*Pulmonis serosa e Trachea evacuatio.*

CLXXX. HÆMOPTYSIS.

*Pulmonis sanguinea cum Tussi evacuatio.*

CLXXXI. VOMICA.

*Pulmonis purulenta, copiosa, improvisa eva-  
cuatio.*

III. ABDOMINIS.

CLXXXII. RUCTUS.

*Rejectio Flatuum frequens.*

CLXXXIII. NAUSEA.

*Rejectionis Cibi Flatuumque conatus inanis.*

CLXXXIV. VOMITUS.

*Rejectio ingestorum convulsiva.*

CLXXXV. HÆMATEMESIS.

*Vomitus (184) sanguinis.*

## CLXXXVI. ILIACA.

*Vomitus* (184) cum Obstipatione (166) fixa  
et Colica (50).

## CLXXXVII. CHOLER A.

*Vomitus* (184) cum Diarrhoea (188), Colica  
(50).

## CLXXXVIII. DIARRHŒA.

Dejectio Foecum liquidarum frequens.

## CLXXXIX. LIENTERIA.

*Diarrhoea* (188) Cibi immutati.

## CXC. COELIACA.

*Diarrhoea* (188) Chymi.

## CXCI. CHOLIRICA.

*Diarrhoea* (188) rubella, absque Colica.

## CXII. DYSENTERIA.

*Diarrhoea* (188) cruenta, cum Colica (50),  
Tenesmo (194).

## CXIII. HÆMORRHOIS.

Dejectio Sanguinis cum Proctica (59), abs-  
que Colica.

## CXCIV. TENESMUS.

Dejectio Muci frequens, parca, cum desiderio.

120 GENERA MORBORUM

CXCV. C R E P I T U S.

*Dejectio Flatuum copiosa, crebra.*

IV. G E N I T A L I U M.

CXCVI. E N U R E S I S.

*Urinae stillicidium involuntarium, indolens.*

CXCVII. S T R A N G U R I A.

*Urinae parca, guttata, frequens, dolorosa  
micturitio.*

CXCVIII. D I A B E T E S.

*Urinae copiosissimae frequens micturitio.*

CXCIX. H Æ M A T U R I A.

*Urinae cruentae micturitio.*

CC. G L U S.

*Urinae viscosae micturitio.*

CCI. G O N O R R H Æ A.

*Geniturae stillicidium.*

CCII. L E U C O R R H Æ A.

*Mucie sinu muliebri effluxus.*

CCIII. M E N O R R H A G I A.

*Menstruatio copiosa, inordinata.*

## CCIV. PARTURITIO.

*Foetus* maturi enixus laboriosissimus.

## CCV. ABORTUS.

*Foetus* praematura ejactio.

## CCVI. MOLA.

*Massae* carneae, intus cysticofae, ex utero  
ejactio.

## V. CORPORIS EXTERNI.

## CCVII. GALACTIA.

*Lactis* effluxus.

## CCVIII. SUDOR.

*Seri* per poros copiosa, frequens sudatio.

Q

## X. DEFORMES.

## I. EMACIANTES.

## CCIX. PHTHISIS.

Marcor cum Hectica (24), Tussi (155),  
 Dyspnoea (160), Expectoratione (178)  
 purulenta, copiosa.

## CCX. TABES.

Marcor cum Hectica (24), *absque Expectoratione.*

## CCXI. ATROPHIA.

Marcor cum Atonia (120), *absque Expectoratione et Hectica.*

## CCXII. MARASMUS.

Marcor cum Aridura (226), *absque Atonia, Expectoratione, Hectica.*

## CCXIII. RACHITIS.

Marcor carnium tumentibus artuum Geniculis Capiteque; ossibusque saepe flexilibus.

## H. T U M I D O S I.

## CCXIV. POLYSARCI A.

*Corporis pinguedinosa intumescentia.*

## CCXV. LEUCOPHLEGMATIA.

*Corporis emphysematosā (229) intumescē-  
tia.*

## CCXVI. ANASARCA:

*Corporis oedematosā (230) intumescentia.*

## CCXVII. HYDROCEPHALUS.

*Capitis oedematosā (230) intumescentia, hi-  
antibus futuris cranii:*

## CCXVIII. ASCITES:

*Abdominis oedematosā (230) intumescentia.*

## CCXIX. HYPOSARCA.

*Abdominis nodosā intumescentia.*

## CCXX. TYMΠANITES:

*Abdominis flatulē (165) intumescentia,  
constans, sonora.*

## CCXXI. GRAVIDITAS.

*Abdominis a foetu intumescentia nimia.*

## III. DE COLORRES.

## CCXXII. CACHEXIA.

*Pallor corporis oedematosus* (230), cum debilitate, moerore.

## CCXXIII. CHLOROSIS.

*Viridi-cinereus color faciei foemineae cum Citta* (78).

## CCXXIV. SCORBUTUS.

*Opacitas faciei cum Anorexia* (116), Lassitudine (90) matutina, Stomacace (175), Labario (309.)

## CCXXV. ICTERUS.

*Flavedo corporis cum urina luteo-tinctoria, foecibus albidis (Obstipatio Bilis).*

## CCXXVI. PLETHORA.

*Rubedo corporis a distentis vasis sanguineis, cum Dyspnoea* (160).

*HYDROPIST* nomine veniunt *Anasarca* (216), *Aescites* (218), *Hypasarca* (219), *Hydrocephalus* (217), *Oedema* (230), et *Tympanites* (220).

## XI. VITIA.

## I. HUMORALIA.

## CCXXVII. ARIDURA.

Pars exsucce, emarcida, exantlatis humoribus, indolens.

## CCXXVIII. DIGITIUM.

*Articuli* exsiccatio friabili occulta.

Digiti marcor Dolore periodico intensissimo.

## CCXXIX. EMPHYSEMA.

*Flatus* intra tunicam cellulofam Partis.

Tumor elasticus, concolor, subdiaphanus, indolens.

## CCXXX. OEDEMA.

*Lympha* stagnans intra tunicam cellulofam Partis.

Tumor digito premente foveolam admittens, concolor, vespertinus, indolens, Partis.

## CCXXXI. SUGILLATIO.

*Cruor* effusus in tunicam cellulofam.

Tumor obsoletus, latus, iuridus.

## 126 GENERA MORBORUM

### CCXXXII. INFLAMMATIO.

*Sanguis obstructus in vasis.*

Tumor tensus, calidus, ruber, pulsans, dolens;

### CCXXXIII. ABSCESSUS.

Inflammatio suppurata, in *Pus* collecta.

Tumor mollis, aequalis, pruriens.

### CCXXXIV. GANGRAENA.

Inflammatio s. Suppuratio suffocata, *morta*  
*serpens* in tunica cellulosa.

Cutis livens, molliuscula, putris cum vesiculis  
sub epidermide, serpente vitio, margine  
subinflammato, subardente.

### CCXXXV. SPHACELUS.

*Gangraena* (234) omnium solidorum partis.  
*Mortificatio* putrida ad ossa penetrans, indolens, properans.

## II. DIALYTICA.

(*Solutiones Continui*):

### CCXXXVI. FRACTURA.

*Ossis* solutio citra substantiae dissolutionem,

**C CXXXVII. LUXATURA.**

*Geniculi solutio citra substantiae dissolutio-*  
*nem.*

**C CXXXVIII. RUPTURA.**

*Tendinis solutio citra substantiae dissolutio-*  
*nem.*

**C CXXXIX. CONTUSURA.**

*Fibrarum solutio citra substantiae dissolutio-*  
*nem.*

**C CXL. PROFUSIO.**

*Sanguinis effluxus copiosus e substantiae dis-*  
*solutione.*

**C CXLI. VULNUS.**

*Substantiae dissolutio partis mollis, hians,*  
*cruenta.*

**C CXLII. AMPUTATURA.**

*Vulnus detruncatione partis totalis factum.*

**C CXLIII. LACERATURA.**

*Vulnus Fibrarum Cutisque laceratione fac-*  
*tum.*

**C CXLIV. PUNCTURA.**

*Vulnus Tendinis punctione factum.*

## CCXLV. MORSURA.

Vulnus punctum armis animalium *venenatis*.

## CCXLVI. COMBUSTURA.

Vulnus igne factum, inducta Eschara (281).

## CCXLVII. EXCORIATURA.

*Cutis* remota a Carnibus vivis.

## CCXLVIII. INTERTRIGO.

*Cuticulae* erosio madens dolensque.

## CCXLIX. RHAGAS.

*Fissura* Cutis arida.

## III. EXULCERATIONES.

(*Suppurationes apertae.*)

## CCL. ULCUS.

Vulnus Suppuratum parti carnosac.

## CCLI. CACOETHES.

Ulcus superficiale serpens, manans, perenne.

## CCLII. NOMA.

Ulcus Carnes integumentaque depascens, cicatricem inducens.

## CCLIII. CARCINOMA.

*Ulcus Schirri* (284) suppurati.

*Ulcus putridum, serpens, vasis tumidis radicatum, periodice dolens.*

## CCLIV. OZENA.

*Ulcus intra antrum Highmori.*

*Ulc. occultum e Naribus foetens.*

## CCLV. FISTULA.

*Ulcus cortice calloso vaginatum.*

*Ulc. sinuoso penetrans, intus cortice obtecum, ore angustatum.*

## CCLVI. CARIES.

*Ulcus Ossis separato periostio.*

*Ulc. connivens, cum rariss punctionibus indolens, sanie passim nigra se prodens.*

## CCLVII. ARTHROCACE.

*Ulcus Medullae cum ossis Carie (256).*

*Ulc. malignum, tumens, dolore ostocopo (61)*

## CCLVIII. COCTYA.

*Animalculum venenatum intra partem receptum.*

*Partis stigma dolore furioso.*

130 GENERA MORBORUM

CCLIX. PARONYCHIA.

Serum corruptum sub *tendinibus* periostroque.

*Partis* rubor dolentissimus, os destruens.

CCLX. PERNIO.

*Partis* ustio *Gelū* facta.

*Pars* albo caerulescens, tempestatibus recrudescens, saepe exulcerans.

CCLXI. PRESSURA.

Digitus inflamatio (232) a frigore, in casum unguis tendens.

*Inflam.* Digitus circum unguis in suppurationem vergens.

CCLXII. ARCTURA.

Unguis curvatura lateralis cutem secans.

*Inflamm.* digitus cum ulceratione laterali unguis.

IV. S C A B I E S.

\* *Multiplicativa.*

CCLXIII. LEPROA.

*Pustulae* (275), Eschara (281) sicca colorata, cum Nodis immersis mobilibus indolentibus fuscis Rhagadibusque (249).

## CCLXIV. TINEA.

*Pustulae* (275) *Capillitii* siccae, eschara (281)  
albo-flavescente, *Pilisque* abbreviatis erec-  
tis bulbosa-radicatis.

## CCLXV. ACHOR.

*Pustulae* (275) exulcerantes, manantes com-  
muni pinguedinoso.

## CCLXVI. PSORA.

*Pustulae* (275) ichorosae, escharoticae (281),  
noctu imprimis pruriginosae (64).

## CCLXVII. LIPPITUDO.

*Pustulæ* (275) excoriantes *Palpebrarum*  
margines.

## CCLXVIII. SERPIO.

*Pustulae* (275) siccae, obsoletæ, serpentes,  
subfarinaceo-desquamantes.

## CCLXIX. HERPES.

*Pustulae* (275) escharoticae (281), basi com-  
muni erysipelacea (10).

## CCLXX. VARUS.

*Pustulae* (275) *Glandularum sebacearum* ru-  
brae dispersæ, chronicæ.

## CCLXXI. BACCHIA.

*Vari* (270) *faciei* cum nodis maculisque coloratis chronicis.

\*\* *Simplex.*

## CCLXXII. BUBO.

*Glandula conglomerata* inflammata, in suppurationem tendens.

## CCLXXIII. ANTHRAX.

*Glandula subcutanea* inflammata, in suppurationem malignam vergens.

*Tumor* rotundus, erisipelaceus (10), immersus, dolentissimus, suppurandus apice acuto, pustula purifera.

## CCLXXIV. PHYCTENA.

*Vesicula* serosa, distenta, pellucida, basi inflammata, rupta dolens.

## CCLXXV. PUSTULA.

*Vesicula* purulenta, turgens, dehiscens pure.

## CCLXXVI. PAPULA.

*Tuberculum* farctum, coloratum, inflammatum, vix suppurandum.

## CCLXXVII. HORDEOLUM.

*Tuberculum* cysticorum, ovatum, in limbo palpebrarum, suppurans saepius apice.

## CCLXXVIII. VERRUCA.

*Papilla* nervea intumescens, indurata.

*Papula* durior, scabra, sicca, indolens.

## CCLXXIX. CLAVUS.

*Verruca* (278) callosa, in Tendinibus radicata, basi sensibilis.

## CCLXXX. MYRMECIUM.

*Verruca* (278) madida, mollis, denudata.

## CCLXXXI. ESCHARA.

*Crusta* mortua, ab humoribus extravasatis coagmentata, decidua.

## V. TUMORES Protuberantes.

## CCLXXXII. ANEURISMA.

*Arteriae* dilatatio.

Tumor mollis, pulsans, concolor, rotundatus.

## CCLXXXIII. VARIX.

*Venae* dilatatio.

Tumor mollis, quiescens, concolor, rotundatus.

## CCLXXXIV. SCIRRHUS.

*Glandula indurata.*

Nodus durus, asper, concolor, indolens, rotundatus, pressione insensibilis.

## CCLXXXV. STRUMA.

*Glandula infarcta.*

Nodus indolens, solidiusculus, pressione obtuse sentiens.

## CCLXXXVI. AATHEROMA.

Tumor tunicatus, rotundatus, mobilis, molliusculus, indolens, absque cystide.

## CCLXXXVII. ANCHYLOSIS.

Tumor *Geniculorum*, ligamenti capsulaeque tensione expressa Synovia.

Tumor ad genicula, mollis, pulposus concolor.

## CCLXXXVIII. GANGLION.

Tumor *Tendinibus innatus*, ovatus, mobilis, pulposus indolens.

## CCLXXXIX. NATTA.

Tumor tunicatus, musculis irradicatus, eminens, pulposus, indolens.

## CCXC. SPINOLA.

Tumor supra *vertebras lumborum* mollis,  
exiguus, Vertebrarum processibus dehis-  
centibus.

## CCXCI. EXOSTOSIS.

Tumor durus ex *osse* prominente enatus.

## VI. PROCIDENTIAE.

## CCXII. HERNIA.

*Intestini* obtecti ultra propriam sedem pro-  
trusio.

## CCXIII. PROLAPSUS.

*Viscus* nudum relaxatum, elongato propen-  
dens ultra proprium locum.

## CCXIV. CONDYLOMA.

*Tunica interior* relaxata gibba.

## CCXCV. SARCOMA.

*Caro nuda* enata e vivo vulnera.

## CCXCVI. PTERYGium.

*Cuticula* excrescens e cantho oculi, superfi-  
ciem ejus obtegens.

136 GENERA MORBORUM

CCXCVII. E C T R O P I U M.

*Palpebra inferior resupinato-inversa.*

CCXCVIII. P H I M O S I S.

*Praeputii intumescentia inflammata, glandem denudans incarceransve.*

CCXCIX. C L I T O R I S M U S.

*Clitoridis intumescentia extra sinum pudoris.*

VII. DEFORMATIONES.

CCC. C O N T R A C T U R A.

*Geniculorum fixatio rigida.*

CCCI. G I B B E R.

*Thoracis dilatatio prominens.*

CCCII. L O R D O S I S.

*Ossium incurvatio.*

CCCIII. D I S T O R T I O.

*Ossium ad latus non naturale flexio.*

CCCIV. T O R T U R A.

*Oris ad latus flexio.*

CCCV. S T R A B I S M U S.

*Oculi distorti et inaequaliter moti.*

## CCCVI. LAGOPHTHALMIA.

*Oculi* sursum visio palpebra superiore abbreviata.

## CCCVII. NYCTALOPIA.

*Oculi* visus nocturnus.

## CCCVIII. PRESBYTIA.

*Oculi* visus remotus.

## CCCIX. MYOPIA.

*Oculi* visus approximatus.

## CCCX. LABARIUM.

*Dentes* vacillantes in suis alveolis.

## CCCXI. LAGOSTOMA.

*Labium* superius oris fissum.

## CCCXII. APPELLA.

*Praeputii* abbreviatio absque inflammatione.

## CCCXIII. ATRETA.

*Meatus corporis* imperforatus.

## CCCXIV. PLICA.

*Capillorum* contortuplicatio indissolubilis.

## CCCXV. HIRSUTIES.

*Pili* copiosiores longioresque.

## CCCXVI. ALOPECIA.

*Pilorum defluvium.*

## CCCXVII. TRICHIASIS.

*Ciliorum distortio.*

## VIII. MACULÆ.

## CCCXVIII. CICATRIX.

*Callus replens ulcerationes consolidatas.*

## CCCXIX. NÆVUS.

*Macula quaecunque congenita.*

## CCCXX. MORPHÆA.

*Macula alba, depressa, lata.*

## CCCXXI. VIBEX.

*Lineae sanguinicolores subcuticula.*

## CCCXXII. SUDAMEN.

*Maculæ rubrae, pulicares, glabrae, pungentes, evanescentes.*

## CCCXXIII. MELASMA.

*Macula caeruleofuscens in parte tecta.*

## CCCXXIV. HEPATIZON.

Macula *grisea*, subaspera, pruriens.

## CCCXXV. LENTIGO:

Maculae *griseae*, confluentes, insensiles.

## CCCXXVI. EPHELIS.

Color *fusca* partis insolatae:

*Heu mibi! ut mortes Homini, quot membra, malisque  
Tot sumus infecti, Mors ut Medicina putetur:*

## THEORIA.

1. CORPUS vivum constat *Medullari* cerebroso, et *Corticali* solido fluidoque.
2. VITA sentiens movensque residet in medullari primordiali, continuato, multiplicativo.
3. MEDULLARE arcte custoditum, nervis expansis tentaculatum, fabricat suum corticale solidum e fluidis vegetabilium, et fluida haec vicissim per solida praeparat:
4. Medullare hoc nutritur tenuissimo spirituoso liquido corticali, sed flagrat electrico pulmonibus hausto.
5. Medullare sentiens se pandit ad *gratum* salutare, et movens se retrahit ad *ingratum* noxiun.
6. Fluidum corticale, e quo solida, solvitur destruiturque *Acidis* aut *Putridis*, utrisque multiplicativis. Sic vitiatur Sanguis putrido, Serum acido.

7. His dum resistit sentiens movens, oriuntur FEBRES: *Criticae* ab acescente, *Phlogisticae* a putrefacente, at *Exanthematicae* a vivo? peregrino multiplicabili.
8. FLUIDORUM nociya ingrata eliminare studet vita per vias naturales et artificiales, et quo haec periculosiora, eo citius, per datam sic portam simul ejicit quaevis impura; sed duas portas simul apertas non facile admittit, ne exhauriatur \*.
9. Quidquid praecipue adversum sentit, praecipue curat vel minora majoribus adsociat †, ut tota se his opponat.
10. CORTICALE solidum deteritur viatiaturque quotidie, adeoque quotidie reparandum; reparatur autem *Diaeta* eaque multiplici; ab appropriata bene, ab erronea perverse, unde defectus, *Morbi* dicti.
11. MORBI tolluntur contraria caussa ‡; hanc ut citius natura obtineat, Toxicam misceantur ingerendis, *Medicamenta* diēta.

\* Evacuationes duae simul et semel possunt vix stare.

† Dolor dolorem trahit.

‡ Morbi morbis curantur.

12. CONTRARIA haec ex sapidis in fluida Solidaque et ex *Olidis* in medullare agentibus dignoscenda sunt; E contrariis itaque saporibus et odoribus primaria medicamenta eruenda; in his itaque *Clavis Materiae Medicæ.*

# QUALITATES

## MEDICAMENTORUM.

### I. SAPIDA.

Agunt in *Corticalae Vitale*:


in *Fluidis.*      in *Solidis.*

1 AQUOSA.	Mundificantia, Absorbentia,	Humequantia. Exfificantia	SICCA.	1
2 ACIDA.	Refrigerantia, Balsamica,	Attenuantia. Tonica	AMARA.	2
3 DULCIA.	Edulcorantia, Incidentia,	Impinguantia. Corrodentia	ACRIA.	3
4 VISCOSEA.	Inviscantia, Penetrantia,	Lubricantia. Abstergentia	SALSA	4
5 PINGUIA.	Obtundentia, Inspissantia,	Emollientia. Adstringentia	STIPTICA	5

### II. OLIDA.

Agunt in *Medullare Animatum.*

Sensum	Excitant	AROMATICA,	Spiquant	VIROSA.
Motum	Spasticant	ORGASTICA,	Relaxant	NAUSEOSA.
Judicium	Ajuant	SPIRITUOSA,	Confundant	TETRA.
Libidinem	Provocant	AMBROSIACA,	Sufficiant	HIRCINA.



P A R S   T E R T I A.

DEFINITIONES

G E N E R U M

M O R B O R U M

A Clarissimo

RUDOLPHO AUGUSTO VOGEL,

PHILOS. et MEDIC. D. HUJUSQ. PROFESS. &c. &c.

Gottingae 1764

T



# T A B U L A C L A S S I U M

## M O R B O R U M.

- I. FEBRES. Innati caloris augmentum praeternaturale, cum oris siccitate et gravitate corporis.
- II. PROFLUVIA. Humorum evacuatio, ab ordine, quantitate, aut qualitate naturali abhorrens.
- III. EPISCHESSES. Excernendorum suppressiones.
- IV. DOLORES. Sensationes molestae, corporis et animi tranquillitatem turban tes.
- V. SPASMI. Solidorum mobilium contractiones, vel agitationes.
- VI. ADYNA MIÆ. Sensationum, motuum, naturaliumve functionum defec tus, aut imminutiones.
- VII. HYPERÆSTHESSES. Sensationes auctiae, vel perversae.

VIII. C A C H E X I Æ. Male colorata  
corporis constitutio, cum debilitate.

IX. PARANOIÆ. Mentis aberrationes.

X. VITIA. Mutationes in superficie cor-  
poris conspicuae.

XI. D E F O R M I T A T E S. Aberra-  
tiones solidorum ab ordine, positura, ha-  
bitu, figura, numero, aliisque qualitati-  
bus.

## I. F E B R E S.

## I. INTERMITTENTES.

Æstus ad summum 18 horas perdurat, dein aliquamdiu cessat, posteaque revertitur praevio frigore.

## I. SIMPLICES.

## I. QUOTIDIANA.

Quolibet die aut nocte recurrit.

## II. TERTIANA.

Uno die vel nocte una invadit, sequente intermittit, tertio repetit.

## III. QUARTANA.

Uno die vel una nocte invadit, deinde biduum intermittit, quarto iterum redit.

## IV. QUINTANA.

Singulo quinto die redit.

## V. SEXTANA.

Singulo sexto die repetit.

150 GENERA MORBORUM

VI. SEPTANA.

Singulo septimo die revertitur.

VII. OCTANA.

Quolibet octavo die reddit.

VIII. NONANA.

Quovis nono die recurrit.

IX. DECIMANA.

Quovis decimo die recurrit.

X. VAGA.

Alio post decimum diem, sed haud fixo, recurrit.

XI. MENSTRU A.

Viris circa fluxum haemorrhoidalem, vel etiam citra illum, foeminis circa catamenia accidit.

II. DUPPLICATÆ.

XII. TERTIANA duplex.

Quotidie accedit, interdum quoque bis undie vacuo, accessionis vero tempora alternis diebus respondent.

XIII. QUARTANA duplex.

Inter quatuor dies tertium tantum a febre

vacuum habet, et accessionis tempora alternatim praecedenti insultui respondent.

### III. TRIPPLICATÆ.

#### XIV. QUARTANA triplex.

Quotidiana, paroxysmis quarto quovis die conspirantibus.

## II. CONTINUÆ.

Nec interdiu, nec noctu intermittunt, sed remissiones saltem inferunt cum exacerbationibus, quae vel quotidie, aut tertio die, aut quarto, aliove accedunt.

### I. SIMPLICES.

#### XV. QUOTIDIANA continua.

Quotidie cum frigore accedit, calor vero per totum reliquum tempus durat.

#### XVI. SYNOCHUS.

Facie rubra, cute humida, pulsu magno et frequenti, crisi perfecta terminantur intra 21 dies. Species ejus *Ephemera* est.

#### XVII. AMATORIA.

Febris paucarum horarum a magno frigore

incipiens, ex vehementi concubitus expectatione.

### XVIII. PHRENITIS.

Febris acuta, dolor capitis, delirium constans et vehemens.

### XIX. EPIALA.

In qua frigoris sensus perpetuus cum rigore contingit.

### XX. CAUSOS.

Febris ardentissima, tertio quoque die acerbior, cum immensa siti, et siccissima atque nigra lingua.

### XXI. ELODES.

Febris cum profusissimo ac perpetuo sudore inde a primo die, et magno virium lapsu. *Typhodes* et *Sudor Anglicanus* ejus species sunt.

### XXII. LETHARGUS.

Febris in qua sopor et ab expergefactione delirium, mox opprimente iterum sopore.

### XXIII. TYPHOMANIA.

Febris ex phrenitide et lethargo mixta.

## XXIV.      L E I P Y R I A.

Febris in qua extrema algent, interna uruntur, pulsus parvus et obscurus.

## XXV.      P H R I C O D E S.

Febris cuius decursum crebri horrores rigoresve interpellant.

## XXVI.      L Y N G O D E S.

Febris in qua aeger a principio usque ad crisin singultit.

## XXVII.      A S S O D E S.

Febris in qua aeger fere irrequietus est, et implacide molesteque habet, vel fastidio agitatur.

## XXVIII.      C H O L E R I C A.

Febris cum vomitu frequenti atque torminosa alvi dejectione.

## XXIX.      S Y N C O P A L I S.

Febris cui frequens lipothymia se intermiscat.

## XXX.      H Y D R O P H O B I A.

Febris cum aversatione liquidorum, singultu, convulsione, et delirio.

## XXXI.      O S C I T A N S.

Febris cum perpetua oscitatione.

## XXXII. ICTERICODES.

Auriginosa febris, quae cutem colore flavo inquinat, citra hepatis inflammationem.

## XXXIII. PESTILENTIALIS.

Febris pandemia, contagiosa, acutissima, in qua bubones aut certe carbunculi, aut vesiculae oriuntur cum leipyria, ingenti siti, spiritu, sudore, et dejectionibus foetidis, delirio, nausea, vomitu, pulsuque parvo ac obscuro.

## XXXIV. SIRIASIS.

Febris infantibus propria, in qua cutis sicca, pallida, inappetentia, oculi concavi, fontanellae subsidentia.

## II. COMPOSITÆ.

## I. Exanthematicæ.

## XXXV. VARIOLOSA.

Synochus contagiosa, a vomitu, cephalalgia, et lumbagine incipiens, in qua tertio die maculae erumpunt, sensim in pustulas purulentas, escharoticas, deciduas, abeentes.

## XXXVI. MORBILLOSA.

Synochus contagiosa, cum tussi sicca et madore oculorum, in qua maculae rubellae, latescentes, paullum elevatae erumpunt, quae deinceps in tenuissimas squamulas solvuntur.

## XXXVII. MILIARIS.

Phricodes, dolor rheumaticus in aliqua corporis parte, aut sensus punctorius in dorso, crure, ac intestinis, aut stupor in digitis, pustulae pruriens milii seminis magnitudine, rubrae vel albae, sero primum limpido, deinceps subalbo perlatum colore non dissimili, plenae, facie intacta, sudor multus foetidus.

## XXXVIII. PETECHIALIS.

Febris maligna, exanthemata morsibus publicum fere similia, flavescentia, rubra, vel livida.

## XXXIX. SCARLATINA.

Synochos, maculae coccineae crebriores ac latiores, quam morbilli, nodulis subflavis, ad instar capitum aciculorum, ornatae, fugaces, in squamulas dichiscentes.

## 156 GENERA MORBORUM

### XL. URTICATA.

Synochos quotidiana continua mitior, tuberculata puncturis urticarum similia, rubra, prominentia, fugacia.

### XLI. BULLOSA.

Maligna, vesiculac sero sublimpido repletac, magnitudine nucis avellanae et majores, in variis corporis partibus, facie non excepta, citra cutis inflammationem erumpentes.

### XLII. VARICELLÀ \*.

Variolae spuriae; ephemera, pustulæ variolæ simillimæ, pruriætes, primo die erumpentes et suppurantes, tertio resiccatae, et in squamulas deciduae, toto morbo intra septem dies ad summum terminato.

### XLIII. PEMPHINGODES.

Fbris, quæ pustulas in ore, phlyctides dictas, generat.

\* Hacc *Varicella* facillime illudere Medicis sub specie variolæ potest, nisi ad decursum accuratissime attendant; unde dein bis vel ter laborare homines variolæ existimantur.

## XLIV. APHTHOSA.

Maligna cum ulcusculis in ore superficialibus,  
fungosis, mucosis, quas aphthas vocant.

## II. INFLAMMATRIÆ.

## XLV. PHRENISMUS.

Vera inflammatio cerebri aut membranarum ejus; quam ex dolore capitis et vehementi delirio febrili vulgo definiunt, quae signa vero adnodus ambigua.

## XLVI. CHEMOSIS.

Vehemens adnatae oculorum inflammatio, ut super corneam feratur, acerbus dolor, perversio palpebrarum, cephalalgia, agrypnia.

## XLVII. OPHTHALMITES.

Inflammatio interiorum oculi membranarum, et praecipue choroideac; dolor in oculo fere intolerabilis cum febre, cephalalgia, agrypnia, delirio. Vulgo *phlegmone* dicuntur.

## XLVIII. OTITES.

Inflammatio auris internæ; dolor immanis

in aure, febris, cephalalgia, agrypnia, delirium.

#### XLIX. ANGINA.

Faucium inflammatio; febris continua, respirandi ac deglutiendi difficultas, praefocationis metus.

#### L. PLEURITIS.

Pleurae inflammatio; febris continua, dolor in latere thoracis pungens, tussis sicca, dyspnoea.

#### LI. PERIPNEUMONIA.

Pulmonum inflammatio; febris continua, dolor thoracis obtusus, gravatus, tussis humida aliquando cruenta, difficultas anhelitus angustiave.

#### LII. MEDIASTINA.

Mediastini inflammatio; febris continua, incendium in thorace, offendiculum quodam ad sternum in inspiratione, respiratione frequens, tussis cum sputis coloratis, orthopnoea; an semper?

#### LIII. PERICARDITIS.

Pericardii inflammatio; omnia ut in mediastina, urgente morbo syncope.

## LIV. CARDITIS.

Cordis inflammatio, symptomata fere ut in peripneumonia, sed graviora, dolor vehementis in regione cordis, palpitatio, pulsus frequens ac inaequalis, hydrophobia; an semper?

## LV. PARAPHRENITIS.

Diaphragmatis inflammatio; febris continua, dyspnoea, dolor e regione ventriculi cinguli instar ventrem supra lumbos ambiens, delirium.

## LVI. GASTRITIS.

Ventriculi inflammatio; febris, leipyria, dolor et ardor in epigastrio, sitis, vomitus ingestorum, singultus.

## LVII. ENTERITIS.

Intestini inflammatio; febris assodes, phricodes, cruciatus ventris intolerabilis, flatuum et stercoris retentio, aut dysenteria.

## LVIII. HEPATITIS.

Jecinoris inflammatio; febris continua hypochondrii dextri dolor tensivus, tussis sicca, icterus, interdum vomitio bilis et per alvum dejectio.

## LIX. SPLENITIS.

Lienis inflammatio; febris continua, hypochondrii sinistri distentio atque tumor, dolor pulsans, molestus dexter decubitus.

## LX. MESENTERITIS.

Mesenterii inflammatio; febris varia occulta et lenta phricodes aut quotidiana continua, dolor colicae similis, egestiones chylosae et ichorosae, nullo doloris sensu defluentes.

## LXI. OMENTITIS.

Omenti inflammatio; febris continua cum dolore et tumore in regione epigastrica et hypogastrica.

## LXII. PERITONITIS.

Peritonaei inflammatio; febris assidua, tumor ventris, et dolor pectorius.

## LXIII. MYOCOLITIS.

Musculorum abdominalium inflammatio; symptomata ut in peritonite.

## LXIV. PANCREATICA.

Pancreatis inflammatio. Notae deficiunt.

## LXV. NEPHRITIS.

Renis inflammatio; febris acuta, dolor ardens in regione renis, urina pauca, flamma, vel nulla, stupor cruris vicini, dolor testis vicini, ructus, vomitio.

## LXVI. CYSTITIS.

Vesicae urinariae inflammatio; febris levior, hypogastrii dolor ardens, pressorius, frequens mciendi stimulus, isthuria, tenesmus.

## LXVII. HYSTERITIS.

Uteri inflammatio; febris continua, delirium, tumor hypogastrii inflammatiorius, dolor in lumbis et inguine.

## LXVIII. ERYSIPELACEA.

Ephemera, erysipelatis expulsionem efficiens.

## LXIX. PODAGRICA.

Continua, synochos, cum dolentissimo rubore in pede.

## LXX. PANARITIA.

Continua, panaritii gravioris comes.

## LXXI. CYSSOTIS.

Ani inflammatio, dolor, tenesmus.

## III. SYMPTOMATICÆ.

## LXXII. APOPLECTICA.

Continua apoplexiae superveniens.

## LXXIII. CATARRHALIS.

Vespertina, catarrhis socia.

## LXXIV. RHEUMATICA.

Quotidiana continua rheumatismo juncta,  
multus sudor, interdum pustulae puru-  
lentae;

## LXXV. HÆMORRHOIDALIS.

Ephemera, dolor spinae, haemorrhoides, aut  
saltem varices dolentes circa quartum di-  
em erumpentes, quo febris finitur.

## LXXVI. LACTEA.

Ephemera, aliquot diebus a partu incidens.

## LXXVII. VULNERARIA.

Graviori vulneri superveniens.

## LXXVIII. SUPPURATORIA.

Partium internarum inflammationibus, dum

in suppurationes transeunt, superveniens,  
continua.

LXXIX.      L E N T A .

Febricula quotidiana in morbo longo.

LXXX.      H E C T I C A .

Quotidiana continua vehementior in morbo  
longo, cum sudore colliquativa et phthisi.

## II. PROFUVIA.

## I. HÆMORRHAGIÆ.

LXXXI. HÆMORRHAGIA.

Sanguinis e vulnerc profusio.

LXXXII. EPISTAXIS.

Sanguinis e naribus profusio.

LXXXIII. HÆMOPTOE.

Sanguinis ex ore et faucibus eruptio.

LXXXIV. HÆMOPTYSIS.

Sanguinis e pulmonibus aut trachea rejectio  
per tussim.

LXXXV. STOMACACE.

Gingivarum cruentatio.

LXXXVI. ODONTIRRHOEA.

Sanguinis ex alveolo dentis evulsi eruptio.

LXXXVII. OTORRHOEA.

Sanguinis ex aure effluxus.

LXXXVIII. OPHTHALMORRHAGIA.

Sanguinis ex oculo ejusve cantho aut pal-  
pebris eruptio.

## LXXXIX. HÆMATEMESIS.

Vomitus cruentus; sanguinis e ventriculo  
per vomitum rejectio.

## XC. HEPATIRRHOEA.

Fluxus hepaticus; diarrhoa aquosa rubella  
instar loturae carnium recentium.

## XCI. CATARRHEXIS.

Sanguinis puri ex alvo profusio.

## XCII. HÆMATURIA.

Mictio e renibus cruenta, quae sanguine urinac  
exquisite permixto perfunditur, ut ea  
quasi dilutus et tenuis sit sanguis.

## XCIII. CYSTIRRHAGIA.

Mictio cruenta e vesica dolorifica, qua san-  
guis urinam non aequaliter perfundit ac  
in imo subsidens in grumos concrevit;  
ejus quoque portio aut grumus interdum  
citra urinam excidit. *Haemorrhoides ve-  
sicae* appellant.

## XCIV. STYMATOSIS.

Haemorrhagia penis sive urina, nulloque  
voluntatis arbitrio.

## XCV. HÆMATOPEDESIS.

Sudor sanguineus; sanguinis tenuis e poris  
cutis eruptio.

## XCVI. MENORRHAGIA.

Sanguinis inordinata et larga ex vulva pro-  
fusio.

## XCVII. ABORTIO.

Sanguinis ex utero gravidæ profluvium, cum  
foetu immaturo aut mola subsecente.

## II. APOCENOSIS.

## XCVIII. CATARRHUS.

Tusis frequens, acris, cum raucitate.

## XCIX. EPIPHORA.

Lachrymae involuntarium profluvium.

## C. CORYZA.

Catarrhus narium cum seri tenuioris destil-  
latione.

## CI. OTOPUOSIS.

Puris ex auro effluxus; catarrhus auris for-  
didus.

## CII. OTOPLATOS.

Humiditatis olidae retro aurem excretio.

## CIII. PTYALISMUS.

Copiosa salivae profusio.

## CIV. VOMIC A.

Subitanea, copiosa puris aut sanguinis nigri  
e pulmonibus reiectio per tussim.

## CV. DIARRHOEA.

Copiosum sincerorum humorum ex alvo  
profluvium, sine vehementi sensu doloris.

## CVI. PUORRHOEA.

Puris sinceri ex alvo excretio.

## CVII. DYSENTERIA.

Frequens, pauca, torminosa ac tenesmodes  
alvi dejectio.

## CVIII. LIENTERIA.

Laevitas intestinorum qua, quae per alvum  
descendunt, alimentis assumptis substantia  
et colore finitima.

## CIX. COELIACA.

Laevium aequalium et quasi chyli aut cre-  
moris specie dejectio.

## CX. CHOLERA.

Vomitus biliosi multi alvique dejectiones,  
cum periadynia,

## CXI. PITUITARIA.

Mera petuitae, loco steroris, excretio diuturna, cum contabescientia.

## CXII. LEUCORRHOIS.

Pituitae sincerac et cruentae ex alvo excretionis tenesmodes, periodica.

## CXIII. ENEURESIS.

S. incontinentia urinae; mictio urinae involuntaria constans, sine acrimoniae et doloris sensu.

## CXIV. DIURESIS.

Immodica urinae prorsus aqueae excretio, in morbo spastico, periodica.

## CXV. DIABETES.

Immodicum urinae profluvium diuturnum, sub quo corpus contabescit.

## CXVI. PUOTURIA.

Mictio purulenta.

## CXVII. CHYLARIA.

Urinae mucosae, albae, paucae, et quasi vermifosae, excretio. *Glus Linn.*

## CXVIII. GONORRHOEA.

Invita feminis, liquoris, prostatarum, ichoris,

citra venerem, citra libidinis insomnia,  
citraque colis tentiginem, profusio.

### CXIX. LEUCORRHOEA.

Fluor albus; nimia muci aut ichoris ex vul-  
va profusio.

### CXX. EXONEIROYSIS.

Pollutio; involuntaria, at jucunda feminis  
ex rigido cole profusio.

### CXXI. HYDROPEDESIS.

Sudor immodicus.

### CXXII. GALACTIA.

Lactis ex mammis stillicidium.

### CXXIII. HYPERCATHARSIS.

Immodica purgatio ex operatione violentio-  
ris medicamenti colliquantis, urentis, sti-  
mulantis.

### CXXIV. E.C.P.H.Y.S.E.

Flatuum ex urethra aut uteri vagina eruptio.

### CXXV. DYSDIA.

Exhalatio foetida ex toto corpore aut ejus  
parte.

## III. EPISCHESSES.

## CXXVI. GRAVEDO.

Catarrhus narium impeditus cum carebaria,  
voce haud bene sonora, spiritu nonnihil  
difficili, qui nec nisi hiante ori duci potest,

## CXXVII. FLATULENTIA.

Flatum impedita supra infraque expulsio,  
cum intumescentia ventris.

## CXXVIII. OBSTIPATIO.

Stercoris excretio impedita.

## CXXIX. ISCHURIA.

Urinae suppressio.

## CXXX. AMENORRHoeA.

Menstrui sanguinis ex utero fluxus, ex toto  
vel ex parte cohibitus.

## CXXXI. DYSLOCHIA.

Lochiorum suppressio aut imminutio.

## CXXXII. DEUTERIA.

Secundinarum retentio.

## CXXXIII. AGALAXIS.

Lactis defectus.

## IV, DOLORES.

## CXXXIV. ANXIETAS.

Molesta sensatio circa praecordia, quae praefentem rerum statum fastidit.

## CXXXV. BLESTRISMUS.

Incontinens corporis jactatio et inquietudo.

## CXXXVI. PRURITUS.

Dolorifica voluptas in cute, hominem ad scalpendum excitans.

## CXXXVII. CATAPSYXIS.

Sensus frigoris dolorificus in parte musculosa aut cutanea.

## CXXXVIII. RHEUMATISMUS.

Cutis et muscularum dolor. *Lumbago, ischias, glossagra, et pleurodyne Sauvag.* sunt species.

## CXXXIX. ARTHRITIS.

Articulorum dolor; cuius species *chiragra et gonagra.*

## CXL. CEPHALALGIA.

Capitis dolor brevis;

## CXLI. CEPHALÆA.

Capitis dolor longus.

## CXLII. CLAVUS.

Capitis dolor in vertice cum sensu frigoris.

## CXLIII. HEMICRANIA.

Capitis dolor tensivus alterutrum ejus latus  
occupans.

## CXLIV. CAREBARIA.

Molestia capitis velut gravitas quacdam.

## CXLV. ODONTALGIA.

Dolor dentium.

## CXLVI. HÆMODIA.

Dentium stupor cum dolore.

## CXLVII. ODAXISMUS.

Gingivarum dolor infantilis in dentitione.

## CXLVIII. OTALGIA.

Dolor auris internae et externae.

## CXLIX. ACATOPOSIS.

Deglutitio difficultis.

## CL. CIONIS.

Dolorifica uvulae crassities.

CLI. HIMANTOSIS.

Ejusdem solito major longitudo et gracilis.

CLII. CARDIOGMUS.

Anxetas cordis dolorifica, cum sensu pondéris et pulsatione.

CLIII. MASTODYNIA.

Mammarum dolor.

CLIV. SODA.

Dolor urens calidus e ventriculo in fauces affurgens.

CLV. PERIADYNIA.

Ventriculi dolor.

CLVI. PNEUMATOSIS.

Dolorifica ventriculi a flatibus distentio.

CLVII. CARDIALGIA.

Ventriculi dolor vehemens spasticus, cum nausea saepeque vomitu.

CLVIII. ENCAUSIS.

Ardor in stomacho cum inextinguibili siti.

CLIX. NAUSEA.

Inani vomendi desiderium,

## CLX. C O L I C A.

Dolor spasticus intestinorum cum obstipatione, nausea, et vomitu.

## CLXI. E I L E M A.

Dolor in intestino fixus velut clavi muro impacti.

## CLXII. I L E U S.

Colica acuta cum vomitu demum excretorum.

## CLXIII. S T R A N G U R I A.

Urinae densae rubrae mictio parca, frequens, ardore in urethra excepta.

## CLXIV. D Y S U R I A.

Urinae stillicidium dolorificum citra ardorem in urethra.

## CLXV. L I T H I A S I S.

Difficilis mictio a calculo in organis uropoeticis, cum arenulis in urina subsidentibus.

## CLXVI. T E N E S M U S.

Impetuosa, dolorifica desidendi cupiditas, qua nihil praeter pauca mucosa et cruenta egeritur.

## CLXVII. CLUNESIA.

Dolor in podice. *Proctica Sauvages.* et *Linn.*

## CLXVIII. CEDMA.

Dolor in partibus genitalibus. *Pudendagra*  
*Linn.*

## CLXIX. HYSTERALGIA.

Dolor ventris parturientium similis.

## CLXX. DYSMENORRHOEA.

Profluviū sanguinis uterini menstruum dolorificum.

## CLXXI. DYSTOCTIA.

Partus laboriosus, difficilis.

## CLXXII. ATTOCTIA.

Partus difficillimus, qui sine arte prorsus absolvi non potest.

## CLXXIII. PRIAPISMUS.

Colis erectio dolorifica permanens, citra libidinis stimulum.

## CLXXIV. PSORIASIS.

Durities scroti cum intensa prurigine, et interdum quoque exulceratione.

176 GENERA MORBORUM

CLXXV. PODAGRA.

Dolor rheumatico-arthriticus in pede acutus.

CLXXVI. OSTEOCOPUS.

Dolor in osse fixus.

CLXXVII. PSOPHOS.

Strepitus ossium.

CLXXVIII. VOLATICA.

Dolor per traclum majorum cutis vasorum  
oberrans.

CLXXIX. EPIPHLOGISMA.

Ardor alicujus partis velut a pruna obortus.

In aure dicitur *Pyrosis*.

## V. S P A S M I.

## CLXXX. TETANUS.

Totius corporis aut solius cervicis distentio  
rigida, dolorifica, acuta, qua fleui haud  
possit.

## CLXXXI. OPISTHOTONUS.

Eadem distentio, sed qua corpus in posteriore  
ora curvatur.

## CLXXXII. EPISTHOTONUS.

Eadem, sed qua corpus in anteriora curvatur.

## CLXXXIII. CATHOCUS.

Tetanus cum privatione sensuum.

## CLXXXIV. TREMOR.

Levior totius corporis aut membra singularis  
concussio, sine frigoris sensu.

## CLXXXV. FRIGUS.

Cum extremae partes membrorum inalges-  
cent.

## CLXXXVI. HORROR.

Totius corporis algor cum tremore.

## CLXXXVII. RIGOR.

Idem et violentior cum trismo et sensu frigoris in interioribus partibus.

## CLXXXVIII. EPILEPSIA.

Agitatio convulsiva universalis, chronica, periodica, cum oppressione sensoriorum, exituque spumae ex ore.

## CLXXXIX. ECLAMPSIA.

Epilepsia acuta.

## CXC. HIERANOSOS.

Agitatio corporis vel artuum convulsiva, continua, chronica, cum integritate sensuum.

## CXI. CONVULSIO.

Agitatio corporis vel artuum violenta, periodica, cum integritate sensuum.

CXCII. RAPHANIA, *Linn.*

Convulsio cum spastica articulorum contractione et dolere immani, periodica.

## CXCIII. CHOREA.

Convulsio saltatoria aut procursiva. *Tarantulus est species.*

CXCV. C R A M P U S.

Digitorum manuum pedumque, aut crurum extensio vel contractio violenta, dolorifica, brevis.

CXCV. S C E L O T Y R B E.

Immanis continuaque crurum contractio et obrigescentia.

CXCVI. A N G O N E.

Faucium praefocatio acuta, sine inflammatione. *Angina convulsiva et Suffocatio hysterica* ejus sunt species.

CXCVII. G L O S S O C E L E.

Linguac violenta, acuta, extrusio.

CXCVIII. G L O S S O C O M A.

Linguae violenta, acuta, revulsio.

CXCIX. H I P P O S.

Oculorum constans agitatio; malum ab ortu contractum.

CC. I L L O S I S.

Oculorum perversio acuta.

CC. C I N C L E S I S.

Palpebrarum nictitatio perpetua.

## CCIL. CATACLASIS.

Alterutrius oculi occlusio spastica, acuta.

## CCIII. CILLOSSIS.

Cilii superioris perpetuus tremor.

## CCIV. STERNUTATIO.

Membranae narium agitatio convulsiva, impetuosam aëris inspirationem, similemque mox expulsionem per nares cum strepitu inducens.

## CCV. TUSSIS.

Convulsiva et sonora aëris c pulmonibus expulsio.

## CCVI. CLAMOR.

Vocis anxia exaltatio.

## CCVII. TRISMUS.

Stridor dentium inter se collisorum.

CCVIII. CAPISTRUM, *s. Spasmus Maxillae inferioris.*

Immobilitas ejus, qua ós arcte clauditur.

CCIX. SARDIASIS, *s. Spasmus Cynicus.*

Spasmus muscularum faciei et oris, quo in obliquum torquentur.

CCX. GELASMUS, *s. Risus Sardonius.*

Involuntarius risus, sub quo animus non gaudio, sed dolore atque iracundia plerumque effertur.

## CCXI. INCUBUS.

Suffocatio in insomnio terrifico, respiratio-  
nem offendens, vocemque intercipiens.

## CCXII. SINGULTUS.

Inspiratio convulsiva subitanea velocissima,  
sonora recurrens.

## CCXIII. PALPITATIO.

Cordis, visceris, musculi, tendinis, arteriac-  
ve, temporaria agitatio.

## CCXIV. VOMITUS.

Violenta contentorum in ventriculo per os  
rejectio.

## CCXV. RUCTUS.

Violenta flatus ventriculi inclusi per os ex-  
plosio.

## CCXVI. RUMINATIO.

Cum cibus e ventriculo in os vicissim masli-

182 GENERA MORBORUM

candus iterumque deglutiendus, citra voluntatem, impellitur.

CCXVII. OESOPHAGISMUS, *s. Spasmus Oesophagi.*

Ciborum deglutitorum in oesophago subsistentium remora dolorifica.

CCXVIII. HYPOCHONDRIASIS.

Anxietas praccordialis, cum spasmis ventriculi ac intestinorum, variisque congestiobibus conjuncta, chronica.

CCXIX. HYSTERIA.

Eadem in mulieribus.

CCXX. PHLOGOSIS, *s. Aestus volatilis.*

Subitus fugaxque aestus cum rubore faciei.

CCXXI. DIGITIUM.

Primae phalangis digitorum invita et constans incurvatio.

## VI. ADYNA MIÆ.

### CCXXII. LASSITUDO.

Ingrata et gravativa sensatio impotentiae ad motum.

### CCXXIII. ASTHENIA.

Languor aut debilitas corporis.

### CCXXIV. TORPOR.

Sensus motusque imminutus in parte carnea.

### CCXXV. ADYNA MIA.

Impotentia, qua se aegri nullo modo movere aut in lecto erigere possunt.

### CCXXVI. PARALYSIS.

Sensus motusve aut utriusque defectus in singulari parte externa.

### CCXXVII. PARAPLEGIA.

Omnium partium sub collo, aut faltem medii corporis artuumque inferiorum paralysia.

## CCXXVIII. HEMIPLEGIA.

Paralysis alterutrius lateris.

## CCXXIX. APOPLEXIA.

Subita functionum animalium cessatio, cum stertore et magno pulsu.

CCXXX. CATALEPSIS, *f. Catoche.*

Subita functionum animalium cessatio, in qua correptus vigilantis formam figuramque retinet, articulique cum situm, qui ipsis datur.

## CCXXXI. CARUS.

Veternus sopor, liberam respirationem sine stertore conservans, ex quo aegri vix excitantur.

CCXXXII. COMA, *f. Cataphora.*

Sopor in quo aegri vellicati evigilant, et mons in ipsum relabuntur.

## CCXXXIII. SOMNOLENIA.

Inclinatio in somnum justo major.

## CCXXXIV. HYPOPHASIS.

Albi oculorum inter dormiendum subapparitio.

## CCXXXV. P T O S I S.

Impotentia attollendi palpebram superiorem.

## CCXXXVI. A M B L Y O P I A.

Visus imbecillitas integro oculo.

## CCXXXVII. M Y D R I A S I S.

Pupillae dilatatio, quae visioni nocet.

## CCXXXVIII. A M A U R O S I S.

Coecitas sine sensibili oculorum labe, praeter mydriasis.

## CCXXXIX. C A T A R A C T A.

Coecitas cum obscurata lente, retro pupil-  
lam conspicua.

## CCXL. S Y N I Z E S I S.

Coecitas cum pupillae coalitione.

## CCXLI. G L A U C O M A.

Coecitas turbatis humoribus et oculo flaccido.

## CCXLII. A C H L Y S.

Corneae obscuritas, visum imminuens aut tollens.

## CCXLIII. N Y C T A L O P I A.

Visus noctu falso contingens.

## CCXLIV. HEMERALOPIA.

Visus noctu abolitus.

## CCXLV. HEMALOPIA.

Visus dimidiatus.

## CCXLVI. DYSICOIA.

Imbecillitas auditus.

## CCXLVII. SURDITAS.

Auditus abolitus.

## CCXLVIII. ANOSMIA.

Odoratus abolitus.

## CCXLIX. APOGEUSIS.

Gustus abolitus.

## CCL. ASAPHIA.

Vocis obscuritas.

## CCLI. CLANGOR.

Vox acuta cum stridore.

## CCLII. RAUCITAS.

Vox aspera et obscura, quae vix nisi a prope adstantibus exaudiri potest.

## CCLIII. APHONIA.

Vocis privatio.

## CCLIV. LEPTOPHONIA.

Vitium vocis nimium gracilis.

## CCLV. OXYPHONIA.

Vox acuta, qualis edi solet cum ejulatu et  
planctu.

## CCLVI. RHENOPHONIA.

Vox nasalis, quae ex naribus haud simul  
editur.

## CCLVII. MUTITAS.

Loquelae privatio.

CCLVIII. TRAULOTIS, *Blaefitas.*

Vitiosa literarum f et r pronunciatio.

CCLIX. PSELLOTIS, *Balbuties.*

Cum inter pronunciandum aut litera aut  
syllaba aufertur et eliditur.

## CCLX. ISCHNOPHONIA.

Vitium pronunciationis, quo syllaba syllabae  
cito copulari non potest.

## CCLXI. BATTARISMUS.

Vitium pronunciationis, quo sermo praeci-  
pitatur, unaque syllaba aliquoties cuin  
celeritate repetitur.

## CCLXII. SUSPIRIUM.

Inspiratio lenta, profunda, gemibunda.

## CCLXIII. OSCITATIO.

Inspiratio tarda, profunda, aperto ore.

## CCLXIV. PANDICULATIO.

Oscitatio cum artuum extensione.

## CCLXV. APNOEA.

Respiratio adeo rara et parva, ut plane spiritus periisse videatur.

## CCLXVI. MACROPNOEA.

Respiratio per longa intervalla contingens.

## CCLXVII. DYSPNOEA.

Respirandi difficultas continua, levior.

## CCLXVIII. ASTHMA.

Respiratio difficilis periodica, chronica, cum sensu angustiae in faucibus.

## CCLXIX. ORTHOPNOEA.

Respiratio suffocatoria acuta, non nisi erecto cervice perageta.

CCLXX. PNINGMA, *Catarrhus suffocativus.*

Difficillima respiratio, cum subitanea sensu-

um motusque interceptione, stertore, pulsuque intermittente.

CCLXXI. RENCHUS, f. *Stertor.*

Sonus ex naribus editus.

CCLXXII. RHOCHEMOS, f. *Ronchus.*

Sonus stertorosus intra fauces.

## CCLXXIII. LIPOTHYMA.

Subita sensus motusque interceptio, cum sudore frigido, tinnitus aurium, pulsu ac respiratione debili.

## CCLXXIV. SYNCOPA.

Eadem gravior, nullo pulsu, nulla respiratione perceptibili, abolitoque omni sensu, et extincto calore.

## CCLXXV. ASPHYXIA.

Abolitio pulsus.

## CCLXXVI. APEPSIA.

Concoctionis ciborum in ventriculo privatio.

## CCLXXVII. DYSPEPSIA.

Tarda difficultaque concoctio.

CCLXXVIII. DIAPHTHORA.

Ciborum corruptio in ventriculo.

CCLXXIX. ANOREXIA.

Inappetentia sine fastidio ciborum.

CCLXXX. ANATROPE.

Inappetentia nauseabunda.

CCLXXXI. ADIPSIA.

Sitis defectus.

CCLXXXII. ACYYSIS.

Sterilitas muliebris ; conceptionis defectus.

CCLXXXIII. AGENESIA.

Rei venereae impotentia in viro ; libidinis defectus.

CCLXXXIV. ANODYNIA.

Doloris defectus.

## VII. HYPERÆSTHISES.

### CCLXXXV. ANTIPATHIA.

Certarum rerum visu, olfactu, aut gustu percipiendarum, talis aversatio, ut ex eaurundem perceptione gravia symptomata inducantur.

### CCLXXXVI. A G R Y P N I A.

Somni defectus.

### CCLXXXVII. PHANTASMA.

Perceptio corporum ante oculos obversantium, quae non adsunt.

### CCLXXXVIII. C A L I G O.

Qua subito visui omnia nigra se repraesentant.

### CCLXXXIX. HÆMALOPIA.

Qua omnia rubra apparent.

### CCXC. M A R M A R Y G E.

Fulgor ante oculos corruscans.

192 GENERA MORBORUM

CCXCI. DYSOPIA.

Visus duplicatus.

CCXCII. SUSURRUS.

Soni non existentis perceptio.

CCXCIII. VERTIGO.

Imaginatio, qua omnia homini cum semet-  
ipso circumagi videntur.

CCXCIV. APOGEUSIA.

Sapor in ore depravatus.

CCXCV. POLYDIPSIA.

Continuum potus desiderium.

CCXCVI. BULIMUS.

Vehemens fames, cum lipothymia.

CCXCVII. ADDEPHAGIA.

Voracitas.

CCXCVIII. CYNOREXIA.

Fames canina; addephagia cum vomitu  
subsequente.

CCXCIX. ALLOTRIOPHAGIA.

Rerum non esculentarum devoratio arbi-  
traria.

CCC.            M A L A C I A.

Earundem anxia appetentia.

CCCI.            P I C A.

Certi cibi assumendi, aut rei olfaciendae ve-  
hemens desiderium.

CCCII.          B O M B U S.

Murmur ex flatibus, quod auribus percipi-  
tur.

CCCIII.         C E L S A.

Sensus flatus, vaporis, aut formicarum ober-  
rantium subter cute.

B . b

**VIII. CACHEXIAE.****CCCIV. CACHEXIA.**

Corpus grave atque iners, colore pallido squalidum.

**CCCV. CHLOROSIS.**

Cachexia in virginibus, colore ex pallido virgescere:

**CCCVI. ICTERUS.**

Cachexia cum flavo cutis colore, urina obscure rubra, tingente immissa linteamina colore croceo.

**CCCVII. MELANCHLORUS.**

Cachexia cum subnigro cutis colore, urina de nativo statu haud decadente.

**CCCVIII. ATROPHIA.**

Extenuatio corporis, aut partis ejus, sine febre lenta et heclica.

**CCCIX. TABES.**

Extenuatio corporis cum febre lenta vel heclica, at sine dyspnœa et tussi.

## CCCX. PHTHISIS.

Extenatio corporis cum febre lenta vel hec̄tica, dyspnoea, et tussi \*.

## CCCXI. HYDROTHORAX.

Cachexia cum dyspnoea et effusione aquae intra pectus, strepitum concussione intus facientis.

## CCCXII. RACHITIS.

Atrophia infantum cum epiphysium protuberantia.

## CCCXIII. ANASARCA.

Totius corporis intumescentia, aquosa, mollis, digitii impressi vestimentum aliquamdiu retinens, cum pallore cutis.

## CCCXIV. ASCITES.

Tumor abdominis, scroti, et crurum aquosus, cum atrophia superiorum partium.

Abdomen impulsu sonum collectae permotaeque intus aquae praebet.

\* In *atrophia* sola pinguedo absuntur, nec aequa restituitur; in *tabe* et *ptbisi* caro simul minuitur.

## CCCXV. HYDROCYSTIS.

Hydrops saccatus pleurae, peritonaei, aut visceris abdominalis.

## CCCXVI. T Y M P A N I T E S.

Tumor abdominis renitens, pulsatione sonitum edens, cum obfipatione et atrophia.

## CCCXVII. HYSTEROPHYSE.

Tumor hypogastrii ab utero flatu distento.

## CCCXVIII. SCORBUTUS.

Cachexia cum laffitudine, maculis artuum lividis, stomachace, ulceribus.

## CCCXIX. S I P H Y L I S.

Cachexia contagiosa ex contagio venereo, cum tumoribus ossium et ulceribus fauci- um partiumque obfoenarum, praegressis plerumque bubonibus aut gonorrhœa.

CCCXX. L E P R A, *Gracorum, s. Psora.*

Pertinacissima scabies totius corporis vel parti, secca, dura, aspera, serpentibus pustulis furfuracea.

CCCXXI. ELEPHANTIASIS, s. *la-*  
*pra Arabum.*

Mutatio cutis in tumores lividos, adhuc fa-  
niem foetidam crustosam evocantes.

CCCXXII. ELEPHANTIA *Arabum.*

Eadem duntaxat in pede valde tumido et  
duro.

CCCXXIII. P L I C A, s. *Rhopalosis.*

Vitium capillorum capitis aut pubis, quo ab  
humore glutinofo ita in cirrhos contor-  
quentur, ut explicari nullo modo possint.

CCCXXIV. PHTHIRIASIS.

Morbus pedicularis, quo pediculi variis in  
corporis partibus copiose emergunt.

CCCXXV. PHYSCONIA.

Intumescentia abdominis longa, a magnitu-  
dine habituue visceris mutato.

CCCXXVI. PARACYYSIS.

Graviditas a natura abhorrens retardatione  
aut alieno non noctus extra uterum.

198 GENERA MORBORUM

CCCXXVII. GANGRÆNA.

Inflammatae partis livor et mortificatio foetida, cum pustulis ichorofis; sensus doloris hebes.

CCCXXVIII. SPHACELUS.

Perfecta mortificatio, qua pars sensum motum et innatum calorem tota amisit, fitque prorsus nigra, mollis, putris, et cadaverosa.

## IX. PARANOIÆ.

## CCCXXIX. ATHYMIA.

Animi abjectio, consternatio, tristitia, despectus, ratio.

CCCXXX. DELIRIUM, *Paraphrosyne*.

Mentis alienatio in febre haud constans, nec furibunda. *Carpologia* ejus est species.

## CCCXXXI. MANIA.

Insania longa, ridicula aut furibunda. *Furorem uterinum* et *satyriasis* pro speciebus habeo.

## CCCXXXII. MELANCHOLIA.

Insania longa cum moestitia ac timore. *Nostalgia* ejus species est.

## CCCXXXIII. ECSTASIS.

Insania, quae brevi tempore durat.

## CCCXXXIV. ECPLEXIS.

Excessus mentis, qui ex repentina aliqua perturbatione ab externa causa affertur.

## CCCXXXV. ENTHUSIASMUS.

Est veluti cum quidam in sacris faciendis

mente capiuntur, si qua viderint audirentve.

CCCXXXVI. STUPIDITAS, *Morosis,*  
*Fatuitas.*

Mentis imminuta et infirmata functio, seu  
quaedam ignavia, citra delirium et soporem.

CCCXXXVII. AMENTIA, *Anoia.*

Imaginationis vel mentis occasus atque privatio, qua jam ab ipso ortu affecti vix  
mentis inopia loqui discunt.

CCCXXXVIII. OBLIVIO.

Memoriae privatio.

CCCXXXIX. SOMNIUM.

Visum, quod in somno occurrit, tanquam  
verum sit existimatum. *Favor* ejus est  
species.

CCCXL. HYPNOBATASTIS.

Somnium in quo homo asurgent, ambulat, et  
diversa vigilantium opera exercet.

## X. VITIA.

### I. INFAMMATIONES.

CCCXLI.      OPHTHALMIA.

Inflammatio albi oculorum.

CCCXLII.      BLEPHAROTIS.

Inflammatio palpebrarum.

CCCXLIII.      ERYSIPELAS.

Inflammatio lata cutis, quae splendet et leviter ac aequaliter tumet.

CCCXLIV.      HIEROPYR.

Erysipelas cum eminentibus ardentibus pustulis. *Zoster* dicitur, si abdominis cutem occupat.

CCCXLV.      PARONYCHIA.

Inflammatio dolorifica in summitate digitorum.

CCCXLVI.      ONYCHIA.

Inflammatio digitii lateralis ab ungue profundius in cutem demerso.

202 GENERA MORBORUM

CCCXLVII. ENCAUSIS.

Inflammatio cutis ab ustione.

CCCXLVIII. PHIMOSIS.

Inflammatio, aut oedematodes tumor praeciputii, quo glans nudari non potest.

CCCXLIX. PARAPHIMOSIS.

Inflammatio praeputii, retro glandem adducti, ut eam tegere non possit.

CCCL. PERNIO.

Cutis rubor ardens, pruriens, a frigore ; in exulcerationem tendens.

H. TUMORES.

CCCLI. PHLEGMONE.

Tumor dolens renitens inflammatorius cum rubore, ovi saltem gallinacei magnitudine.

CCCLII. FURUNCULUS.

Tuberculum acutum apostematodes, ovum columbinum magnitudine non excedens.

CCCLIII. ANTHRAX.

Quasi malignus furunculus, qui partem mox

adurit, pustulas circum se ardentissimas ciet, tandem crusta nigra vel cinerea obducitur, et corruptae carnis lobum excutit, qua excidente ulcus cavum sordidumque manet.

## CCCLIV.    ABSCESSUS.

Collectae in inflammato loco materiae in pus aut in alienam substantiam conversio.

## CCCLV.    ONYX.

Abscessus inter corneae laminas.

## CCCLVI.    HIPPOPYON.

Abscessus intra oculum.

## CCCLVII.    PHYGETHION.

Phlegmone in glandulis emergens.

## CCCLVIII.    EMPYEMA.

Abscessus in thorace, latus aut partem ejus in tumorem attollens, cum febre hectica, praegressa pleuritide vel peripneumonia.

## CCCLIX.    PHYMA.

Tumor glandularum, simplici phlegmone atque phygethlo minor, planior, minusque rubens ac dolens.

## CCCLX. ECTHYMATA.

Tubercula ex cute subito erumpentia, modo  
colorem cutis non excedentia, modo ru-  
bra fugacissima.

## CCCLXI. URTICARIA.

Tubercula puncturis urticarum similia, ru-  
bra, prurientia, fugacia, acuta.

## CCCLXII. PARULIS.

Tuberculum dolens inflatum in gingivis.

## CCCLXIII. EPULIS.

Tuberculum in gingivis sine inflammatione.

## CCCLXIV. ANCHYLOPS.

Tumor durus inflammatorius apostematodes  
in cantho oculi interno.

## CCCLXV. PARAGLOSSA.

Lingua tumida.

## CCCLXVI. CHILON.

Labium tumidum et inflatum.

## CCCLXVII. SCROFULA.

Tumor glandularum colli et mesenterii in-  
dolens obduratus.

CCCLXVIII.    B U B O N.

Tumor glandulae inguinalis.

CCCLXIX.    BRONCHOCELE.

Tumor glandulae thyreoideae.

CCCLXX.    P A R O T I S.

Tumor glandulae ejusdem nominis.

CCCLXXI.    G O N G R O N A.

Collum tumidum.

CCCLXXII.    SPARGANOSIS.

Tumor mammarum in lactantibus a lactis copia.

CCCLXXIII.    C O I L I M A.

Intumescentia abdominis subita, flatulenta.

CCCLXXIV.    SCIRRHUS.

Tumor durus, indolens, concolor, renitens.

CCCLXXV.    C A N C E R.

Tumor durus, dolore lancinante gravis, inaequalis, livescens aut nigricans.

CCCLXXVI.    S A R C O M A.

Carnis incrementum tuberculi tumorifve specie.

## CCCLXXVII. POLYPUS.

Sarcoma intra nares, praelongum, pluribus appendicibus adhaerens.

## CCCLXXVIII. CONDYLOMA.

Tuberculum durum, pene indolens in ani margine. Ejus species *Ficus* et *Thymus* a figura ita dictae.

## CCCLXXIX. GANGLION.

Tumor durus, concolor, indolens tendini infidens.

CCCLXXX. RANULA, *Batrachus*.

Tumor ad frenulum linguae folliculosus, materiam spissam aut tofaceam complexus.

## CCCLXXXI. TERMINTHUS.

Tuberculum rotundum, nigrum, praesertim in tibiis enascens, humorum glutinosum et subruber exulceratione emittens.

## CCCLXXXII. OEDEMA.

Tumor frigidus, laxus, mollis, indolens, circumscriptus aut diffusus, presso digito cedens.

## CCCLXXXIII. ENCEPHALOCELE.

Cerebrum per hiatum calvae extrorsum emineſs.

## CCCLXXXIV. HYDROCEPHALUM.

Capitis monſtrosus tumor a collecta aqua in  
cute aut ſubter calvaria.

## CCCLXXXV. HYDROPHTHALMIA.

Totius oculi tumor cum aliquo dolore, adeo  
ut is palpebris operiri non poſſit.

## CCCLXXXVI. S P I N A bifida.

Tumor aquosus exiguus, in nucha aut infe-  
riore spinae loco, posterioribus vertebrarum  
dehifcentibus processibus emergens,

## CCCLXXXVII. HYDROMPHALUS.

Tumor umbilici ab humore in eodem con-  
ſistente.

## CCCLXXXVIII. H Y D R O C E L E .

Tumor tunicarum, quibus testis compre-  
henditur, aquosus.

## CCCLXXXIX. H Y D R O P S , Scroti.

Tumor tunicae scroti cellulofae aquosus,

## CCCXC. STEATITES.

Abdominis intumescens pinguedinosa, gravitatem mentiens.

## CCCXCI. PNEUMATOSIS.

Totius corporis intumescens a flatu.

## CCCXCII. EMPHYSEMA.

Tumor mollis, frigidus, in singulari parte ab aere cellulofam cutis habitum ingresso formatus.

## CCCXCIII. HYSTEROPTOSIS.

Uteri vel vaginae procidentia, protuberantiam intra aut extra vaginam faciens.

## CCCXCIV. CYSTOPTOSIS.

Membranae vesicae urinariae interioris protuberantia extra urethram.

## CCCXCV. ARCHOPTOMA.

Intestini recti procidentia.

## CCCXCVI. BUBONOCELE.

Tumor in inguine ex annulo musculi obliqui ab ingresso intestino omentove, vel utroque conjunctim.

## CCCXCVII. OSCHEOCELE.

Idem in scroto tumor.

## CCCXCVIII. OMPHALOCELE.

Idem ex umbilico.

## CCCXCIX. MEROCLE.

Tumor ab intestino infra ligamentum Pou-  
partii elapso.

CCCC. ENTEROCELE, *Ovularis*.

Hernia intestinalis foraminis ovalis, in su-  
periori et interna femoris parte prope pe-  
rinacum.

## CCCCI. ISCHIATOCELE.

Tumor ab intestino per hiatum intra liga-  
menta sacro-ischiatica elapso.

## CCCCII. ELYTROCELE.

Hernia in vagina uteri eminens.

## CCCCIII. HYPOGASTROCELE.

Hernia intestini ventralis.

## CCCCIV. CYSTOCELE.

Prominentia vesicae per musculi obliqui an-  
nulum, sub qua urina non nisi presso ex-  
teriorum tumore redditur.

210 GENERA MORBORUM

CCCCV. CYRTOMA.

Tumor particularis abdominis a flatibus.

CCCCVI. HYDRENTEROCELE.

Tumor ex hernioso et hydropico compositus.

CCCCVII. VARIX.

Tumor venae mollis, lividus, aut niger.

CCCCVIII. ANEURISMA.

Tumor arteriae mollis et pulsans.

CCCCIX. CIRSOCELE.

Tumor arteriarum venarumque spermatica-  
rum inaequalis, renitens.

CCCCX. GASTROCELE.

Hernia ventriculi; tumor inter cartilaginem  
xiphoiden et umbilicum inque ipso illo,  
post pastum auctus, dolore stomachi, vo-  
mitionibusque stipatus.

CCCCXI. HEPATOCELE.

Hernia ab hepate facta ventralis, vel umbi-  
licalis congenita.

CCCCXII. SPLENOCELE.

Hernia a liene, ventralis aut inguinalis.

## CCCCXIII. HYSTEROCELE.

Hernia uteri ventralis vel inguinalis.

## CCCCXIV. HYGROCIRSOCELE.

Aquosus et varicosus tumor vasorum testis.

## CCCCXV. SARCOCELE.

Testis farcoma aut scirrhous.

## CCCCXVI. PHYSOCOCELE.

Tumor a flatu herniam mentiens.

## CCCCXVII. EXOSTOSIS.

Tumor in osse circumscripitus.

## CCCCXVIII. HYPEROSTOSIS.

Tumor totius ossis.

## CCCCXIX. PÆDARTHROCACE.

Tumor ossis, dolore gravis, in exulcerationem tendens.

## CCCCXX. ENCYSTIS.

Tumor frigidus, indolens, membrana inclusus, et materiam spissam complexus. *Atheroma, Steatoma, Testudo, Talpa, Meliceris* ejus species.

212 GENERA MORBORUM

CCCCXXI. STAPHYLOMA.

Precuberantia corneae obscuratae.

CCCCXXII. STAPHYLOSIS.

Procedentia uvae ex cornea disrupta.

CCCCXXIII. FUNGUS.

Tumor ad articulam mollis, oedematodes.

CCCCXXIV. TOFUS.

Tuberculum ad articulum, tofaceam materiam complexum, in morbo articulari.

CCCCXXV. FLEMEN.

Tumor pedis circa talos.

III. EXTUBERANTIE\*.

CCCCXXVI. VERRUCA.

Tuberculum supra cutim durum, asperum, sessile vel penile. Unde species *Acroboron*, *Acrothymium*, *Myrmaecium*.

CCCCXXVII. PORRUS.

Verruca in obscenis mollis, madida, tactu dolens.

\* Extuberantiae supra cutim eminent; tumores intra aut subter eam existunt.

## CCCCXXVIII. CLAVUS.

Tuberculum album, rotundum, callosum,  
in digitis plantisque pedum.

CCCCXXIX. CALLUS, *s. Tyloma.*

1. Obdurata summa cutis ex labore in palmis  
aut pedum plantis. 2. Tunica pallida, du-  
ra, quae sine sensu est, in ulcere.

## CCCCXXX. ENCAANTHIS.

Intumescentia carunculae lacrymalis.

## CCCCXXXI. PLADAROTIS.

Tuberculum fungosum, molle in interiori  
palpebra.

## CCCCXXII. PINNULA.

Ex crescentia corneae tunicae in hac crescentia.

## CCCCXXXIII. PTERYGIUM.

Ex crescentia, membranulae forma, rubra  
supra album oculi.

CCCCXXXIV. HORDEOLUM, *Crithe.*

Tuberculum calidum in abscessum fere des-  
nens, quod e palpebræ margine atque e  
cilio prorumpit.

## CCCCXXXV. GRANDO.

Tuberculum durum, palpebrae fere superiore innascens.

CCCCXXXVI. VARUS, *Ionthos.*

Tuberculum in facie durum, exiguum, rubrum, fere callosum, dispersum, multiplex.

CCCCXXXVII. GUTTA, *Rosacea.*

Varus quasi confluens, cum rubidine aspera maculosa.

## CCCCXXXVIII. EPHELIS.

Asperitas quaedam et durities mali coloris in facie.

## CCCCXXXIX. SOSCHE.

Tuberculum intus in ano latens.

## CCCCXL. EXOCHE.

Idem foris eminens.

## IV. PUSTULÆ et PAPULÆ.

## CCCCXLI. EPINYCTIS.

Pustula ardens alba, subruba aut sublivida, sanguine subcruenta repleta, ciceris aut fabae

magnitudine, circa quam vehemens inflammatio et dolor.

#### CCCCXLII. P H L Y C T A E N A.

Pustula subflavo humore distenta, lucida, illi similis, quae ab ambustione erumpit, non manifesto dolens. In capite *Psydracium* vocatur.

#### CCCCXLIII. H E R P E S, *Serpigo*.

Papula ardens, cutem sepentibus minimis pustulis erodens. *Purpura scorbutica*, quam vocant, verissima *serpigo* est.

#### CCCCXLIV. S C A B I E S.

Durities cutis rubicundior, ex qua pustulae oriuntur, quaedam humidiiores, quaedam sicciores, faniem rodentem, exulcerantem, crustas formantem, et contagiosam complexae.

#### CCCCXLV. A Q U U L A.

Pustula palpebrarum, vel pinguis quaedam materia, cuti earundem substrata.

#### CCCCXLVI. HYDROA, *Boa, Sudamina*.

Pustulæ milii magnitudine, aquosæ sine ru-

bore et sine ullo dolore, ex sudoribus re-  
pente sparsim toto corpore emergentes.

## CCCCXLVII. VARIOLA.

Pustula purulenta ex macula rubra in syno-  
cho emergens, contagiosa.

## CCCCXLVIII. VARICELLA.

Pustula similis acuta, ex macula rubra in e-  
phemera crumpens, non contagiosa.

## CCCCXLIX. PURPURA.

Pustula pruriens, semenis milii magnitudine,  
rubra vel alba, lucida, acuta.

CCCCL. ENCAUMA, *Phlyzacion.*

Pustula ab ustione contracta.

## V. MACULÆ.

## CCCCLI. ECCHYOMOMA.

Macula a sanguine per cutem quasi effuso  
livida vel nigra. Illa *Pelioma*, haec *Me-  
lasma* speciatim dicitur.

## CCCCLII. PETECHIAE.

Maculae pulicorum morsui similes, magnitu-

dine et colore, interdum tamen etiam lividae in febre acuta.

CCCCLI.    M O R B I L L I .

Maculae acutae, rubellae, latescentes, et plerumque confluentes, in quo sequimur defluentes, in febre acuta.

CCCCLIV.    S C A R L A T Æ .

Maculae latiores ac rubicundiores quam morbilli, subflavis nodulis ornatae, in febre acuta.

CCCCLV.    L E N T I G O .

Macula lentis magnitudine fusca, multiplex, in facie potissimum et in manibus emergens.

CCCCLVI.    U R T I C A R I A .

Maculae subtumidae, rubentes, pruriētes, fugaces.

CCCCLVII.    S T I G M A .

Macula coloris coccinei.

CCCCLVIII.    V I B E X .

Linca coccinea, qualis relinquitur e flagellis.  
E e

## CCCCLIX. VITILIGO.

Macula foeda, fere subaspera, dispersa, serpens, alba (*Alphos*) aut nigra (*Melas*).

## CCCCLX. LEUCE.

*Alphos* in qua albi et lanugini similes pili.

## CCCCLXI. CYASMA.

Macula fusca in fronte, labiis, aut manibus gravidarum.

CCCCLXII. LICHEN, *Impetigo*.

Maccula subrubra aspera, dura, sicca, cum ingenti prurigine.

## CCCCLXIII. SELINE.

Macula alba in ungue.

## CCCCLXIV. NEBULA.

Macula alba in cornea.

## VI. DISSOLUTIONES.

I. *Apospasmata*.

## CCCCLXV. VULNUS.

Solutio partis solidae, mollis a causa mechanica, cum effluxu sanguinis.

## CCCCLXVI. R U P T U R A.

Solutio partis solidae, mollis, internae, ab  
interna causa, cum haemorrhagia.

## CCCCLXVII. R H A G A S:

Solutio cutis linearis arida.

## CCCCLXVIII. F R A C T U R A:

Dissolutio ossis transversa aut obliqua:

## CCCCLXIX. F I S S U R A.

Eadem recta, et ut ligni in longitudinem.

## CCCCLXX. P L I C A T I O.

Ossium longorum concussio et contorsio  
citra fracturam.

## CCCCLXXI. T H L A S I S.

Calvaria depressa citra fracturam;

## CCCCLXXII. L U X A T I O:

Dimotio ossis ex articulo suo perfecta:

## CCCCLXXIII. S U B L U X A T I O.

Cum os ab osse paulum recedit, eaque inter  
se dehiscunt:

## CCCCLXXIV. D I A C H A L A S I S:

Suturae dimotio.

220 GENERA MORBORUM

CCCCLXXV. ATTRITIO, *Ecthlimma.*

Dissolutio cuticulae et cutis a compressione.

CCCCLXXVI. PARRICO, *Ptirysis.*

Resolutio cutis in tenues squamulas, deciduas.

CCCCLXXVII. APOSYRMA.

Cutis abrasio, dilaceratio.

CCCCLXXVIII. ANAPLEUSIS.

Ossis corrupti squamula.

CCCCLXXIX. SPASMA.

Species solutionis continui tendinum, ligamentorum, citra rupturam, membra inobilitatem dolorificam inducens.

CCCCLXXX. CONTUSIO.

Cutis muscularumque conquassatio dolorifica, plerumque cum ecchymomate, at citra vulnus aut substantiac manifestam deperditionem.

CCCCLXXXI. DIABROSI.

Erolio cutis a re acri et mordaci interna vel externa.

CCCCLXXXII. AGOMPHIASIS.

Dentium vacillatio.

CCCCLXXXIII. ESCHARA.

Cutis pars dehiscens a viva carne, et in cruentam emortuam mutata.

CCCCLXXXIV. PIPTONYCHIA.

Unguis destruacio et casus.

2. *Exulcerationes.*

CCCCLXXXV. CACOETHES.

Ulcus fere magnum oris tumentibus atque callofis.

CCCCLXXXVI. THERIOMA.

Ulcus in quo caro computreficit, atque molles et cadaverosa redditum teturum odorem exhalat.

CCCCLXXXVII. CARCINOMA.

Canceri conversio in ulcus, quod nigrum est, putridum, deterriai odoris, et vehementer dolet.

## CCCCCLXXXVIII. PHAGEDÆNA.

Ulcus serpens, sed solam cutem rodens ac depascens.

## CCCCCLXXXIX. N O M A.

Ulcus quod non afflictam tantum partem, sed et vicinas exedit et absunit.

## CCCCXC. S Y C O S I S.

Ulcus, in quo multa caro excrescit.

## CCCCXCI. F I S T U L A.

Ulcus altum, angustum, callosum.

## CCCCXCII. S I N U S.

Ulcus altum, quod ab angusto ore orsum intus curvatum ampliatur, sine callo.

## CCCCXCIII. C A R I E S.

Ulcus in osse cum substantiae et periosteï corruptione, qua os spongiosum et friabile redditur.

## CCCCXCIV. A C H O R E S.

Ulcusula capitis manantia, pluriñis ac minimis foraminulis, unde tenuis et glutinosa fantes exit, cutem perforantia.

CCCCXCV. CRUSTA, *lactea.*

Achores in facie.

CCCCXCVI. F A V U S, *Cerion.*

Ulcus multis foraminibus, sed majoribus ac in achore, pervium, ex quibus melli similis humor exit. Frequentius in capite, rarius in partibus musculosis, articulis, et plantis pedum, oritur.

## CCCCXCVII. T I N E A.

Ulcus capitis, quod densissimam, durissimam aridissimamque crustam facit, serpens, pilis abbreviatis.

## CCCCXCVIII. A R G E M O N.

Exulceratio in cornea.

## CCCCXCIX. ÆGILOPS.

Anchilops in ulcus conversum.

## D. O Z Æ N A.

Ulcus narium putridum, e quo graveolens mucus exstillat.

## DI. APHTHÆ.

Ulcera oris aut pudendorum, superficiaria,  
mucosa.

## DII. INTERTRIGO.

Excoriatio cutis madens ac rubens, a fudo-  
ris vel urinae acrimonia.

## DIII. RHACOSIS.

Excoriatio scroti laxati.

## VII. CONCRETIONES.

## DIV. ANCYLOBLEPHARON.

Palpebrarum inter se conglutinatio.

## DV. ZYNIZESIS.

Pupillæ concretio.

## DVI. DACYROMA.

Punctorum lacrymalium coalitus.

## DVII. ANCYLOGLOSSUM.

Linguae concretio cum partibus subjectis,  
loquela, suctum, deglutitionemque im-  
pediens.

DVIII. A N C Y L O S I S.

Articulorum rigor, quo flexus eorundem aut extensio prohibetur.

DIX. C I C A T R I X.

Callus a conglutinato vulnere ulcereve relictus. *Leucoma* in cornea dicitur.

DX. D A C T Y L I O N.

Digitorum concretio.

## XI. DEFORMITATES.

DXI. PHOXOS.

Cui caput acuminatum et fastigiatum.

DXII. GIBBER.

Protuberantia spinae dorsalis, omoplatae,  
ossumve thoracis. Ejus species *Cyphosis*,  
*Lordosis*, *Scoliosis*, et *Seisis*.

DXIII. CAPUT obstopum.

Incurvatio colli.

DXIV. STRABISMUS.

Oculorum distortio et inaequalis motus.

DXV. MYOPIASIS.

Qua propinqua cernimus, remota vel pa-  
rum vel nihil omnino.

DXVI. LAGOPHTHALMUS.

Vitium superioris palpebrae, si illa parum  
descendit, oculumque non claudit.

DXVII. TRICHIASIS.

Obvercio ciliorum ad oculum.

DXVIII. ECTROPIUM.

Vitium palpebrae inferioris, quo parum sursum attollitur, sed hiat, aut extrorsum eversa est.

DXIX. ENTR OPIUM.

Palpebrae inferioris inversio introrsum.

DXX. RHOEAS.

Defectus carunculae lacrymalis, epiphora faciens.

DXXI. RHYSEMATA.

Rugae et foldes, quae in senili facie cernuntur.

DXXII. LAGOCHIELOS, *Labium leporinum.*

Divisum semel vel bis labium.

DXXIII. MALACOSTEON.

Offium mollities.

DXXIV. HIRSUTIES.

Praeternaturalis pilorum in parte generatio.

DXXV. CANITIES.

Capillorum color albus ante legitimam actatem.

## DXXVI. DISTRIX.

Exilitas pilorum, modum excedens.

## DXXVII. XIRASIA.

Lanuginosa pilorum superficies, quasi pulvere sint conspersi.

## DXXVIII. PHALACROTIS.

Pilorum casus, qui tabescentibus et ex morbo graviore convalescentibus evenit.

## DXXIX. ALOPECIA.

Pilorum defluvium, aream relinquens. *Ophiasis* ejus species, item *Calvitiae* et *Pelada*.

## DXXX. MADAROSIS.

Ciliorum defluvium.

## DXXXI. PTILOSIS.

Eadem cum duricie callosa palpebrarum.

## DXXXII. RODATIO.

Ciliorum decurtatio.

## DXXXIII. PHALANGOSIS.

Ciliorum duplex vel triplex acies.

## DXXXIV. COLOBOMA.

Defectus particulae in parte aliqua corporis.

## DXXXV.    CERCOSIS.

Clitoris praelonga.

## DXXXVI.    CHOLOSIS.

Claudicatio, quando crus vel longius vel brevius fit.

## DXXXVII.    GRYPOSIS.

Unguium aduncatio.

## DXXXVIII.    NÆVUS.

Tuberculum, maculave congenita.

## DXXXIX.    MONSTROSITAS.

Deformitas multiplex congenita.

## DXL.    POLYSARCIA.

Corpulentia excedens.

## DXLI.    ISCHNOTIS.

Excessiva corporis gracilitas.

## DXLII.    RHICNOSIS.

Cutis corrugatio cum extenuatione corporis.

## DXLIII.    VARUS.

Cui crura introrsum versa.

DXLIV. . . . V A L G U S.

Cui crura extrosum distorta.

DXLV. . . . L E I O P O D E S , *Plancus,*  
*Plautus.*

Cui pedum medium ab interiori parte non  
est cavum, sed planum.

DXLVI. . . . A P E L L A.

Cui praeputium citra inflammationem ita  
contractum est, ut glandem non tegat.

DXLVII. . . . H Y P O S P A D I Æ O S .

Cui glans non antice, sed inferne sub fre-  
nulo perforata.

DXLVIII. . . . U R O R H O E A S .

Cui urina ex urethra in perinaeo exesa ef-  
fluit.

DXLIX. . . . A T R E T A.

Cujus anus aut naturalia occlusa.

DL. . . . S A N I O D E S .

Cui thorax tabulae ritu est angustus.

DLI. . . . C R I P S O R C H I S .

Cujus unus testis aut ambo absconditi.

## DLII. HERMAPHRODITUS.

Cui vitiosa naturalium conformatio, ita ut  
utriusque sexus adesse videantur.

## DLIII. DIONYSISCUS.

Cui prope tempora duae eminentiae osseae,  
quasi cornua, nascuntur.

## DLIV. ARTETISCUS.

Qui membra alicujus defecum patitur.

## DLV. NEFRENDIS.

Qui dentibus caret.

## DLVI. SPANOPOGON.

Qui raram habet barbam, et cui e mento pi-  
li excidunt.

## DLVII. HYPERARTETISCUS.

Cui membrum aliquod superfluum.

## DLVIII. GALIANCON.

Cui brachium altero brevis.

## DLIX. GALBULUS.

Cui flavedo corporis congenita.

## DLX. MOLA.

Massa carneæ, fibrosa, vasculosa, ex utero  
excreta. Ovum deforme.

Nec silentio prorsus transeunda sunt vitia  
quaedam occulta, quae non nisi in cadave-  
rum sectione se offerunt; velut hydrops pe-  
ricardii, concretiones viscerum, offescentiae  
cartilaginum, membranarum, muscularum-  
que, varices venarum majorum, hydatides,  
polypi cordis et vasorum, positura viscerum  
perversa, bullae aëreæ in venis et pulmo-  
num superficie, aneurismata aortae, angustiae  
praeternaturales vasorum et ductuum, ipso-  
rumque concretiones.

P A R S   Q U A R T A.

S Y S T E M A

M O R B O R U M

S Y M P T O M A T I C U M,

A U T O R E

CLAR. JO. BAPT. MICH. SAGAR,

MED. Doct, &c. &c.

Viennae 1776.

G s



# CLAVIS CLASSIUM ET ORDINUM.

## CLASSIS I. VITIA.

Symptomata externa levidensia, palpabilia,  
absque notabili cachexia, pyrexia.

### ORDO I. MACULÆ.

II. EFFLORESCENTIÆ.

III. PHYMATA.

IV. EXCRESCENTIÆ.

V. CYSTIDES.

VI. ECTOPIÆ.

VII. DEFORMITATES.

### CL. II. PLAGÆ.

Continui solutiones, morbi proprie chirur-  
gici persaepe sat graves.

O. I. SOLUTIONES recentes ple-  
rūque cruentæ.

II. SOLUTIONES artificiales re-  
centes cruentæ.

III. SOLUTIONES incruentæ.

IV. SOLUTIONES anomaliæ.

## CL. III. CACHEXIÆ.

Coloris, figuræ, molis, in corporis habitu  
sine notabili febre, depravatio.

## O. I. MACIES.

II. INTUMESCENTIÆ.

III. HYDROPS PARTIALES.

IV. TUBERA.

V. IMPETIGINES.

VI. ICTERITIÆ.

VII. CACHEXIÆ ANOMALÆ.

## CL. IV. DOLORES.

Sensationes molestæ ad febres non referendæ.

## O. I. DOLORES VAGI.

II. DOLORES CAPITIS.

III. DOLORES FECTORIS.

IV. DOLORES ABDOMINIS.

V. DOLORES EXTER-  
NARUM.

## CL. V. FLUXUS.

Exitus insolitus cujusvis solidi, vel fluidi,  
e corpore est character hujus classis.

## O. I. SANGUIFLUXUS.

II. ALVIFLUXUS sanguinolenti.

III. ALVIFLUXUS non sanguinolenti.

IV. SERIFLUXUS.

V. AERIFLUXUS.

## CL. VI. SUPPRESSIONES.

Meatum impeditio, hinc excretionum con-  
fuetarum in sanitate retentio.

## O. I. SUPPRESSIONES egerendorum.

II. SUPPRESSIONES ingerendorum.

III. SUPPRESSIONES imi ventris.

## CL. VII. SPASMI.

Contractio invita constans, vel interpolata  
muscularum motum localem efficientium.

O. I. SPASMI TONICI PAR-  
TIALES.

II. SPASMI TONICI GE-  
NERALES.

III. SPASMI CLONICI  
PARTIALES.

IV. SPASMI CLONICI  
GENERALES.

## CL. VIII. ANHELATIONES.

Motus spasmodici iterati, defatigantes, pec-  
toris cum respiratione sonora, molesta,  
absque pyrexia notabili.

O. I. ANHELATIONES SPAS-  
MODICÆ.

II. ANHELATIONES OP-  
PRESSIVÆ.

## CL. IX. DEBILITATES.

Impotentia sentiendi, appetendi, imaginandi, organa artusque movendi more ad sanitatem necessario.

## O. I. DYSÆSTHESIÆ.

II. ANEPITHYMIÆ.

III. DYSCINESIÆ.

IV. LEIPOPSYCHIÆ.

V. COMATA.

## CL. X. EXANTHEMATA.

Febris cum efflorescentia cutis varia maculosa, pustulosa, phlyctenoidea, et asthenia.

## O. I. EXANTHEMATA contagiosa.

II. EXANTHEMATA non contagiosa.

## CL. XI. PHLEGMASIÆ.

Febris cum pulsu duro, dolore topico, inflammatione partis externae vel internae, sanguine misso crusta inflammatoria tecto, urina plus tincta.

- O. I. PHLEGMASIÆ musculosae.
- II. PHLEGMASIÆ membranaceae.
- III. PHLEGMASIÆ parenchymatosae.

## CL. XII. F E B R E S.

Frigus, calor, pulsus frequens, respiratio aucta, viribus artuum imminutis, depravatis, vel viribus vitalibus pulsu et respiratione vix mutatis, virium artuum summa prostratio.

- O. I. FEBRES CONTINUÆ.
- II. FEBRES REMITTENTES.
- III. FEBRES INTERMITTENTES.

## CL. XIII. VESANIAE.

Error mentis in imaginatione, appetitu, iudicio, aut memoria.

- O. I. HALLUCINATIONES.
- II. MOROSITATES.
- III. DELIRIA.
- IV. VESANIAE ANOMALÆ.

H h



# C L A S S I S . I.

## O R D O I. M A C U L A E.

Mutationes coloris nativi.

### G E N U S I. L E U C O M A. 1

Macula corneae pelluciditatem vitians, opacans.

### G. II. V I T I L I G O. 2

Macula corymbosa cum cutis depressione, locum fixum non servans in quo nascatur.

### G. III. E P H E L I S. 3

Maculae umbrinae glabrae, corymbosae, raro partes tectas affidentes, acquisitae.

### G. IV. N Æ V U S. 4

Macula congenita eminens, vel non, supra libellam cutis.

### G. V. E C C H Y M O M A. 5

Est macula nigricans, vel atro-rubra, caerulea, livescens, in gilvum successive desinens colorem, nata a sanguine in adiposam sub cute effuso.

## O. II. EFFLORESCENTIÆ.

Aspredines, cum cuticulae elevatione ultra libellam cutis humorales, exiguae, gregales, absque pyrexia.

## 6 G. VI. P U S T U L A.

Phyma aut vesicula colorata suppurans, diametri linearis, fastigiata, pure dehiscens, quandoque in crustam abiens; est seu *furunculus* linearis diametri.

## 7 G. VII. P A P U L A.

Phyma parvulum seu efflorescentia desquamanda, nec suppurans.

## 8 G. VIII. P H LY C T H Æ N A.

Vesicula parva fluido seroso plena, quae deinde sponte rumpitur et fundit serum.

## 9 G. IX. B A C C H I A.

Maculae rubrae, vel efflorescentiae nasi et partium adjacentium eidem, guttatae plus, minus prominentes, asperae, furfurascentes, diuturnæ; hoc genus ambigit inter maculas et efflorescentias.

## G. X. V A R U S.

10

Tumor pisiformis magnitudine plerumque sat durus, non suppurandus, aut desquamandus, pertinax in glandulis sebaceis. L.

## G. XI. H E R P E S.

11

Papularum prurientium corymbus in squamas furfuraceas fatiscentium.

## G. XII. E P I N Y C T I S.

12

Phlycthaenarum atro-rubrarum congeries, maxime in tibiis, noctu potissimum acriter prurientium.

## G. XIII. H E M E R O P A T H O S.

13

Papulae rutilae crura obsidentes, extra lectum illico apparentes, importune pruri- entes, in lecto evanescentes, diurnae.

## G. XIV. P S Y D R A C I A.

14

Efflorescentia erysipelatosa absque febre notabili.

## G. XV. H Y D R O A.

15

Exanthemata granis milii magnitudine et forma similia subito exorta, phlycthaenoides, fugacia, absque asthenia, pyrexia, et

praegressa oppressione praecordiorum, miliaria multis habita.

### O. III. PHYMATA.

Tumores humorales solitarii.

#### 16 G. XVI. ERYTHEMA.

Phyma rubrum calens, diffusum, sine febre.

#### 17 G. XVII. OEDEMA.

Phyma album, frigidum, indolens, molle  
foveam ex pressione servans plerumque.

#### 18 G. XVIII. EMPHYSEMA.

Phyma cuti concolor elasticum, ex pressione  
aut percussione crepitans.

#### 19 G. XIX. SCIRRHUS.

Phyma durum, indolens, gravans, frigidum,  
in partibus glandulosis enatum, dum ex-  
ternum cuti quoque concolor observatur.

#### 20 G. XX. INFLAMMATIO.

Est tumor sphaeroideus rubore, calore, ten-  
sione, dolore pulsatili insignis, solitarius,

plerumque sat extensus, in suppurationem sponte vergens; erysipelas non suppurat, et phlegmone habet semper pyrexiam coniunctam manifestam; inflammatio saepius in phlegmone transit, vel phlegmone est gradus major inflammationis.

G. XXI. B U B O. 21

Phyma scirrhofo-phlegmonoideum in glandulis inguinalibus.

G. XXII. P A R O T I S. 22

Tumor scirrhofo-phlegmonoideus parotidis glandulae, in suppurationem lentissime vergens.

G. XXIII. F U R U N C U L U S. 23

Tumor inflammatorius cutaneus, seu subcutaneus, prominens, profunde ruber, spheroideus, cuius centrum occupat vortex fibrosus digere nescius; ordinario juglandis habet magnitudinem.

G. XXIV. A N T H R A X. 24

Phyma apice gangraenosum, et in radio inflammatum.

248 SYSTEMA MORBORUM

25 G. XXV. CANCER.

Phyma scirrhosum lacinans, vel phyma lacinans venis varicosis profunde rubris, nigris, lividis obsitum, cinctum, facile sanguinibus.

26 G. XXVI. PARONYCHIA.

Inflammatorius tumor extremi digiti, cum dolore saepius perterebrante, calore, tensione, et subinde cum rubore.

27 G. XXVII. PHIMOSIS.

Tumor fere semper inflammatorius praeputii glandem incacerans, aut excludens ad coronam hancce vinciendo.

O. IV. EXCRESCENTIÆ.

Tumores a solidis adauctis per succum nutritium copiosiorem advectum, &c. in hos conversum.

28 G. XXVIII. SARCOMA.

Excrecentia carnis consistentiam fere habens, plerunque rubra.

## G. XXIX. CONDYLOMA.

29

Est excrementia eminens, vel non eminens, firmior carnibus et cute, mollior contra ossibus, non elastica.

## G. XXX. VERRUCA.

30

Excrementia cutanea prominens, vix sensibilis, indolens, praerupta seu aspera superficie.

## G. XXXI. PTERYGium.

31

Est excrementia carne, vel membranaceo-vasculoſa ad oculi canthum in globo oculi exorta, alam expansam utcunque referens, versusve corneam sese extendens, crescens.

## G. XXXII. HORDEOLUM.

32

Tumor durus, aut excrementia plus, minus mollis, plerumque cuti concolor, ferme sensu carens, in limbo palpebrarum enata, magnitudine saepius granum hordei vel pisii aequans.

## G. XXXIII. TRACHELOPHYMA.

33

Est tumor varius, non purulentus, neve inflammatorius, anticae partis colli.

## 34 G. XXXIV. EXOSTOSIS.

Tumor ossis partialis, vel aliquando totius ossis, ut subinde in minoribus fit, ad ossa accedens.

## O. V. CYSTIDES.

Tumores capsulati fluido referti.

## 35 G. XXXV. ANEURYSMA.

Cystis arteriosa crux referta, ex pulsu et situ noscenda.

## 36 G. XXXVI. VARIX.

Dilatatio venae rubra, nigrescens, ad pressionem recedens, iterumque subito rediens hac cessante, plerumque pruriens, mordicans.

## 37 G. XXXVII. MARISCA.

Tumor in margine ani, ex sanguine in texture vasorum minimorum varicosorum effuso efformatus, ruber, dolens, variae formae et magnitudinis. Vide Haemorrhoidem. L.

## G. XXXVIII. HYDATIS. 38

Cystis lymphaeductuum dilatatorum, lympham vel serum continens.

## G. XXXIX. STAPHYLOMA. 39

Cystis corneae, ex dilatatione ejusdem ectopia uvae in cameram oculi anteriorem prolapsae; hoc genus magis ad Ectopias spectat. Vide Caliginem. L.

## G. XL. LUPIA. 40.

Est cystis materiem pultis, vel mellis consistentiam referentem continens, haud purulentam, indolens, cuti concolor, loco mobilis.

## G. XLI. HYDARTHROUS. 41

Hydrops vel in capsula articulari, vel in cellulosis vicinis, haud in tunica propria; tumor est fluctuans sine coloris mutatione, pulsatione.

## G. XLII. APOSTEMA. 42

Cystis purulenta, vel ichorofo-purulenta; noscitur ex fluctuatione, praegressa inflammatione, albedine, remissione doloris et pulsationis.

## 43 G. XLIII. EXOMPHALUS.

Cystis umbilicalis, fluido quopiam repleta,  
absque ectopia.

## 44 G. XLIV. GSCHÉOPHYMA.

Cystis scroti variis fluidis turgens.

## O. VI. ECTOPIÆ.

Partium solidarvm e sua sede dimotio, sensi-  
bus obvia, continentibus has relaxatis.

## 45 G. XLV. EXOPHTHALMIA.

Ectopia oculi.

## 46 G. XLVI. BLEPHAROPTOSIS.

Est palpebrae utriusque, vel alterutrius, mor-  
bosa elongatio, retractio, intro vel extra  
versio, cum symptomatis cuique ectopiae  
propriis.

## 47 G. XLVII. HYPOSTAPHYLE.

Est procidentia seu elongatio uvulae relaxa-  
tae, inflammatæ, ulceratae, incrassatae,  
attenuatae, vel bicornis.

## 48 G. XLVIII. PARAGLOSSA.

Est linguae magnitudo minuta, vel aucta;  
vel plane soluto, aut elongato frenulo,  
in fauces ejusdem revolutio.

## G. XLIX. PROPTOMA. 49

Est procidentia appendiculum externarum insolita et morboſa, diversa a praedictis.

## G. L. EXANIA. 50

Sphincteris ani, vel et intestini recti inversi procidentia extuberans, rubra, reducibilis semper extra strangulationem.

## G. LI. EXOCYSTIS. 51

Vesicae inversa membrana interior, soluta a reliquis per urethram foras pendet, et ex exocystis!

## G. LII. HYSTEROPTOSIS. 52

Est uteri procidentia tumorem fistens in vagina, vel quandoque extra genitalia pendentem, undique liberum, menses stilantem, saltem initio reponibilem, cum doloribus hypogastrii, inguinum, urinae difficultate, animi deliquiis; haec omnia tactus obstetricius definit.

## G. LIII. COLPOPTOSIS. 53

Tumor in sinu muliebri, vel extra pendens, annularis, mollis, perforatus (prolabitur subinde una tantum ruga vaginac) per quod foramen digitus immisſus altius o-

rificium uteri, uterumque in sua quasi sede absque colpocele deprehendit, reponibilis; torquet insuper aegram dysuria, tenesmus.

**54 G. LIV. GASTROCELE.**

Est tumor in scrobiculo cordis vulgo dicto, vel ad minus supra umbilicum insolitus, herniosus, ventriculum, aut alia viscera illapsa, continens, cuti concolor, reponibilis, in decubitu dorsali sponte recedens, indolens, ex relaxatione integumentorum undecunque orta natus, vomitum caussans.

**55 G. LV. OMPHALOCELE.**

Tumor herniosus ad umbilicum, reponibilis, cuti concolor, indolens plerumque, ex relaxatione integumentorum et peritonaei natus, varia viscera continens.

**56 G. LVI. LAPAROCELE.**

Tumor herniosus, ventralis seu abdominalis, in quocunque loco abdominis aliis herniis non dicato.

**57 G. LVII. MEROCELE.**

Tumor herniosus, in suprema et anteriore parte femoris, ad exitum vasorum crura-

lium in foeminis praecipue observabilis, proprietates herniarum habens; vidi merocelen etiam in viro.

G. LVIII. BUBONOCELE.      58

Tumor herniosus emergens per annulum vasorum spermaticorum, sensim enatus, cuti concolor et indolens, absente strangulatione.

G. LIX. OPODEOCELE.      59

Est tumor herniosus in summo femine adlatus, genitalium egrediens per sinuositatem ossis ischii superiorem, vasis transmittendis dicatam; in foeminis prope alterum vulvae labium visitur haec ectopia; reponibilis, cuti concolor, mollis; dum parvus est tumor, vix observatur, subin est elasticus. T. I. Auctorum Chirurgorum Parif. p. 709. consule L.

G. LX. ISCHIOCELE.      60

Est hernia emergens per incisuram ossis sacri, seu hiatum inter os sacrum et tuber ossis ischii, decubitu prono reponibilis; rarum genus, et sat adhuc obscurum.

## 61 G. LXI. COLPOCELE.

Est tumor herniosus in vagina emergens, reponibilis, in decubitu supino natibus elevatis sponte recedens plerumque, indolens, absque signis aliorum tumorum qui hic enasci solent.

## 62 G. LXII. PERINÆOCELE.

Tumor herniosus in perinaeo ad unam vel alteram, aut plane utramque, ut vidi in parvula puella, partem, raphes, mollis, reponibilis, cuti concolor; subin est effec-  
tus dystociae; species hujus generis vesicalis, intestinalis, omentalnis, patent una cum therapeia ex prioribus.

## 63 G. LXIII. PERITONÆORIXIS.

Sunt herniae omnes jam descriptae ob rupturam peritonaei natae; rixis vero peritonaei signa sunt, crepitus in violentia aliqua majore peritonaeum lacerante, herniae alicujus subita et magna protuberantia, eruptio; dolor in loco rixis major aut minor; species sunt hujus generis tot, quot genera jam numeravi herniarum. Hernia est extensio praeternaturalis peritonacis et integumentorum cavum formans,

recipiens viscera adjacentia; praeter predictas hernias dantur herniarum varietates: Sic dantur herniae partiales intestinales, ubi media pars fistulae intestinalis cavum herniosum ingreditur, altera parte libera in abdomine manente; dantur herniae accretae, in quo casu pars illapsa cavi herniosi peritonaeo accrescit; cavum herniosum quandoque praeter viscera illapsa liquorem in abdomine collectum continet; saepius quoque partes cavum herniosum ingressae incarcerantur a spastice contracto annulo, unde ileus nascitur, quem vidi suo loco. Peritonaeorexis pertinet quidem ad rupturam; sed, propter affinitatem ejusdem cum herniis, hic eandem subjunxi.

#### G. LXIV. ENCEPHALOCELE. 64

Est cerebri, aut cerebelli, vel utriusque simul, per hiatus ossium cranii necdum sat cohaerentium, ectopia herniosa, relaxata pariter lamina utraque durae matris et piae externa tenuissima pellucida; symptomata subin non magna, subin contra gravissima caussans.

## 65 G. LXV. HYSTEROLOXIA.

Est uteri gravi, vel non gravi, in abdo-  
mine situs seu directio aberrans a direc-  
tione naturali axeos suae, noscenda ex  
orificii uterini directione mutata, palpo  
externo abdominis, tum aliis symptomatis  
inconsuetis; ut ischuria, dysuria, enuresi,  
obstipatione, &c.

## 66 G. LXVI. PARORCHIDIUM.

Est testiculi unius, vel utriusque, a situ na-  
turali aberratio.

## 67 G. LXVII. EXARTHREMA.

Est separatio contigui in ossium articulis per  
diarthrofin combinatorum, noscenda ex  
impotentia ad motum, mutatione nativae  
conformationis, dolore, protuberantia in-  
solita, cavitate, musculorum tensione, con-  
versione artus, accuratione membra, vel  
prolongatione.

## 68 G. LXVIII. DIASTASIS.

Ossium recessus junctorum per raphen, har-  
moniam, synchondrofin, aut syndesmosin,  
cognoscibilis cavitate insolita nro in loco,  
in altero vero tumore, mutatione positu-

rac, et reliquis symptomatis oculo et tac-  
tui patentibus.

**G. LXIX. LOXARTHROUS.** 69

Est ossum articulatorum situs relativus in  
alienum constanter mutatus, seu obliqui-  
tas respectiva persistens citra exarthrema  
et spasmodum. Vide Subluxationem et  
Distorsionem.

**G. LXX. GIBBOSITAS.** 70

Est ossum pectus, vel pelvum componenti-  
um indecora prominentia a tumore, luxa-  
tione, diaftasi, torsione, pressione, aut alio  
principio nata.

**G. LXXI. LORDOSIS.** 71

Ossium longiorum fistulosorum circa medi-  
um inflexio, incurvatio, ectopia a linea  
recta.

## O. VII. DEFORMITATES.

Sunt vitia quae vix sanitatem laedunt.

**G. LXXII. LAGOSTOMA.** 72

Labium oris fissum.

## 73 G. LXXIII. A P E L L A.

Est praeputii, vel alterius appendicis mollis,  
brevitas, parvitas.

## 74 G. LXXIV. P O L Y M E R I S M A.

Partium numerum ordinarium excessus.

## 75 G. LXXV. E P I D O S I S.

Appendicum mollium incrementum inconsuetum sanum: Species sunt penes prae-longi, auriculae pendentes, praeputia longissima, clitorismus, caro pubis foeminarum Africanarum, nasones, labia tumida oris, &c.

## 76 G. LXXVI. A N C H Y L O M E R I S M A.

Est partium concretio.

## 77 G. LXXVII. H I R S U T I E S.

Pili copiosiores, longiores, vel in locis ubi non solent crescere obvii, dant ideam hujus generis.

## C L A S S I S II.

## P L A G Æ.

**CHAR. CLASSIS.** Continui solutiones, morbi proprie chirurgici persaepe sat graves.

## ORDO I. SOLUTIONES.

Recentes, quasi semper cruentae.

**G. I. V U L N U S.** 78

Est continui solutio molli in parte hians, labiata, cruenta, ab instrumento mechanico scindente facta; corneae vulnus cruem non fundit.

**G. II. P U N C T U R A.** 79

Continui solutio intus extensa tantum, eaque instrumento pungente facta casualiter.

**G. III. S C L O P E T O P L A G A.** 80

Est vulnus a glandibus e bombardis, aut sclopetis explosis illatum, vaginatum, decursum glandis designans, oblongum, vexatum.

**G. IV. M O R S U S.** 81

Est plaga recens, quam animalia dentibus inferunt mordendo.

## 82 G. V. EXCORIATIO.

Est epidermidis a cute, vel cutis a carnibus separatio, detractio.

## 83 G. VI. CONTUSIO.

Est partis cujuscunque mollis, vel solidae, in minimis vasculis, fibris attritio, fractio solutio.

## 84 G. VII. RUPTURA.

Membranarum, tendinum, aut ligamentorum dialysis per tensionem facta, vires horum excedentem: Consule chirurgos, et de utero rupto Cl. Henricum Crantz, ingenii excitatissimi virum; huc pertinet peritonaeorixis.

## O. II. SOLUTIONES.

Recentes, cruentae, et artificiales.

## 85 G. VIII. OPERATIO.

Est studiosa solutio continui ad aliquid exigendum, ut lithotomia; operatio reipsa est vulnus studiosa et dextra manu factum chirurgi, morbum relinquens hujus classis.

G. IX. AMPUTATIO. 86

Vulnus detruncatione partis totalis factum.

G. X. SUTURA. 87

Est studiosis puncturis mediante acu factis,  
filisque per puncturas trajectis, solutorum  
mollium contractio, adductio; futura fice-  
ca fit emplastris, quae huc non spectat,  
quum non sit plaga.

G. XI. PARACENTESIS. 88

Est artificialis punctura in aliquod cavum  
corporis, plerumque acu triquetra can-  
nulata facta.

### O. III. SOLUTIONES.

Incruentae, nec ad priores referendae, pus,  
faniem, cariem, &c. sistentes.

G. XII. ULCUS. 89

Est vulnus suppuratum partis mollis, vel so-  
lutio continui mollis antiqua, pus, icho-  
rem, aut faniem quamcumque alens, fun-  
dens.

## 90 G. XIII. EXULCERATIO.

Est excoriatio suppurans, seu ulcus superficiale, reliqua, quae ad hoc genus spectare videntur, ex ulcere patent.

## 91 G. XIV. FISTULA.

Est ulcus cortice calloso vaginatum, ore angustatum, oblongum.

## 92 G. XV. SINUS.

Est cavitas ulcerosa ampla, saepe multiplex, ore angusto non calloso, vel plane nullo donata.

## 93 G. XVI. ESCHARA.

Crusta mortua sicca partis mollis saepius causticis facta est eschara, sensus et vitae expers.

## 94 G. XVII. CARIES.

Ossis erosio cava, aspera, periostio denudata, plerumque nigra; unde os evadit fragile, friabile, vel exfoliabile: Species numerat hoc genus sequentes; est nimirum caries sicca, humida, exfoliabilis, syphilitica, scorbutica, scrophulosa, variolosa.

## G. XVIII. ARTHROOCACE. 95

Ulcus medullae ab interioribus sponte natum, cum ossis carie, exostosi, et persæpe dolore; species numerat hoc genus fere totidem quot caries; vulgo vocatur spina ventosa: Consule super hac Petit de morbis ossium.

## O. IV. SOLUTIONES.

Anomalæ, quæ prioribus includi renuunt.

## G. XIX. RHAGAS. 96

Est solutio continui sicca in partium mollium marginibus, ut labiis oris; species includit Rhagas venereum, malignam, pestiferam, frambaeiacam, ulcerosam, benignam, lixiviale, glaciale, &c.

## G. XX. AMBUSTIO. 97

Est plaga a flamma ignis, corporibusque ex igne carentibus, liquidis ferventibus aut radiis solis in focum coactis, nostro corpori illata, succendentibus phænigmophlycthaenis, vel eschiera.

98 G. XXI. FRACTURA.

Est divisio ossium in fragmenta separabilia,

99 G. XXII. FISSURA.

Divisio ossium rimam referens, haecceve  
non penitus separans,

# C L A S S I S III.

## O. I. MACIES.

Diminutio voluminis corporis ex consumptione pinguedinis, vel sanguinis defectu.

G. I. T A B E S. 100

Est macilentia universalis, cum pyrexia lenta et habituali, citra tussim purisve anacatharsin.

G. II. P H T H I S I S. 101

Corporis emaciatio, cum amphimerina lenta, tussi, dyspnoea, et ut plurimum puris sputo: Ab initio rarius in phthisi adest puris sputum, in Statu contra et sine semper. Quid est proprie pus?

G. III. A T R O P H I A. 102

Est macies sine tussi, anacatharsi, et febre notabili; raro equidem est atrophia sine omni febricula. Consule definitionem febris.

G. IV. HÆM ATAPORIA. 103

Macies seu cachexia ex inopia sanguinis. Descriptio: Virium debilitas, pertinax

aurium sibilus, anorexia, facies lurida  
epidelio tecta, pallidissima, alvi fluxus,  
diabetes, sudores profusi, lipothymiae, ti-  
biae tumidae, subin hydrothorax his suc-  
cedens, vigiliac, suspiria, animi abjectio,  
moeror, mortis timor, urina pallida, ve-  
nae abditae, pulsus vacuus, sanguinis pro-  
fluvia praegressa, sunt signa haematopo-  
riac; aliquando aër evolutus locum san-  
guinis in vasis occupat.

## 104 G. V. A R I D U R A.

Macies, exsiccatio unius tantum artus, vel  
partis corporis, sine febre.

## O. II. INTUMESCENTIÆ.

Deformitas ex volumine, mole, auctis.

## 105 G. VI. P L E T H O R A.

Intumescentia universalis, proportionata et  
aequabilis, ex abundantia sanguinis. De-  
scriptio: Amystidis et ventris cultus, pul-  
sus plenus aut suppressus, venarum am-  
plitudo conspicua: Æstus et gravitas to-  
tius corporis, respirandi difficultas, lassitu-

do spontanea, stupor artuum, somni turbati, partes epidelio tectae ruberrimae, temperamentum sublaxum, sanguineum.

G. VII. POLYSAR CIA. 106

Intumescentia universalis, mollis, pallidula, ab adipe nimium aucto.

G. VIII. PNEUMATOSIS. 107

Intumescentia universalis ab aëre, ad attac-  
tum crepitans, elastica, levis.

G. IX. ANASARCA. 108

Intumescentia universalis oedematoso, non  
elastica; vestigium digitii impressi servans,  
pallida, frigida, haud crepitans.

G. X. PHLEGMATIA. 109

Intumescentia oedematoso artuum inferio-  
rum mollis, cuti concolor, indolens, fo-  
veam digitii impressi servans, non elastica.

G. XI. PHYSCONIA. 110

Est intumescentia abdominis a partibus foli-  
dis praeternaturalis, sine graviditate, fluc-  
tuatione, et clasi, ad tactum dura, resistens,  
parenchymatica.

## 111 G. XII. GRAVIDITAS.

Intumescentia abdominis ex imo hypogastrio incipiens, in axique ejusdem ascendens, opus generationis subsequens, partu terminanda; pathemata gravidarum, menostasia, mutationes oris tincac, motus infantis sensibilis, sunt totidem characteres hujus generis.

## O. III. HYDROPS PARTIALES.

Tumores a fluidis in cavitatibus congestis, ut abdomine, &c.

## 112 G. XIII. HYDROCEPHALUS.

Hydrops capitis a fero.

## 113 G. XIV. PHYSOCEPHALUS.

Est tumor totius capitis emphysematosus elasticus, sub digito premente crepitans.

## 114 G. XV. HYDRORACHITIS.

Tumor cysticus ex hiatu vertebrarum lumbarium, vulgo spina bifida, in recens natis protuberans cum anaesthesia; est versus hydrops thecae spinalis. A.

## G. XVI. ASCITES. 115

Gravis, sphaeroidea, et fluctuosa abdominis intumescentia, non elastica, cum polydipsia, urina pauca, lixiviali, lateritia.

## G. XVII. HYDROMETRA. 116

Tumor hypogastrii sine graviditate, ab ute-  
ro fluidis distento, rotundus, fluctuans,  
leges gravitatis sequens; dolor inguinum,  
spirandi difficultas, menostasia, rigores,  
mammarum mollities, phlegmatia, et tac-  
tus orificii uterini, diagnosin firmant.

## G. XVIII. PHYSOMETRA. 117

Est constans tumor hypogastrii a flatu ute-  
rum distendente, rotundus, elasticus, le-  
vis, in sede uteri.

## G. XIX. TYMPANITES. 118

Est intumescentia totius abdominis, levis et  
elastica, a pulsatione sonum edens, cum  
ructibus, borborygmis, constipatione, et  
doloribus abdominis; chronicus est hic  
morbus.

## 119 G. XX. METEORISMUS.

Est intumescens flatulenta epigastrii, hypochondriorum, vel totius abdominis, fugax et plerumque indolens.

## O. IV. T U B E R A.

Tumores partium solidarum externi, non hydropici, cachexia.

## 120 G. XXI. RACHITIS.

Est deformitas nata ex articulorum tumore duro, carnium marcore et flacciditate, capitis mole, sterni protuberantia; ingenium praecox in infantibus, ossiumve flexilitas et lordosis.

## 121 G. XXII. SCROPHULA.

Tumores subscirrhosi glandularum colli, mesenteriive, cum labiis nasoque crassioribus; scrophula ordinario mollior est schirro.

## 122 G. XXIII. CARCINOMA.

Ulcera cancrosa, fordida, labiis duris eversis, scirrhosis, ex quibus ichor manat acris et rodens; adfunt insuper dolores lancinantes.

tes, excrescentiae fungosae, venae adjacentes varicosae non inepte pedes cancri referentes, et febris hectica.

## G. XXIV. LEONTIASIS.

123

Cognoscitur ex mutatione formae humanae in ferinam aliquatenus; unde aspectus hominis ferinus.

## G. XXV. M A L I S.

124

Morbus est, qui cognoscitur tumoribus, ulceribus, quae infecta vermiforinia vel horum larvae excitant, in quibus nidulantur, et ex apertis prodeunt.

## G. XXVI. F R A M B Æ S I A.

125

Morbus contagiosus, aliquando et congenitus apud Americanos, cuius praccipuum symptoma sunt excrescentiae fungosae mori fructus referentes, quibus sese adjungunt ulcera dyssepulota, exostoses, caries, anchyloses, et macies.

## O. V. I M P E T I G I N E S.

Morbi contagiosi, chronici, qui cutis excrescentias, tumores gregales, exulcerationes,

M m

274 SYSTEMA MORBORUM

crustas, inducunt, plures foventur a viru  
inoculabili.

126 G. XXVII. SYPHILIS.

Ulcuscula, porri, sicus, bubones, topi, nodi,  
post vel cum gonorrhoea plerumque; de-  
in pustulae crustosae, dolores nocturni,  
ostocopi, exostoses, caries, macies, et co-  
lor luridus, morbum adeisse loquuntur.

127 G. XXVIII. SCORBUTUS.

Cognoscitur ex maculis lividis, flavis, coeru-  
leis tibiarum, stomachace, facie lurida, urina  
pellicula tecta,

128 G. XXIX. ELEPHANTIASIS.

Facies deformis, tubera callosa, ozaena, rau-  
cedo, cutis elephantina crassa et unctuosa,  
richtus satyrorum, anaesthesia in artibus,  
constituent characterem hujus generis.

129 G. XXX. LEPROA.

Cognoscitur ex pustulis verrucosis, duris,  
eratis, herpetosis, vel squamis siccis in co-  
rymbos dispositis, prurientibus, escharo-  
ticiis, ringadibus; dum plures sunt sic-  
cae pustulac, siccæ; ubi vero, e contra,

plures humidae et exulceratae, *humida* dicitur lepra.

## G. XXXI. SCABIES:

130

Cognoscitur ex pustulis, vel phlycthaenis, lentis vel fecalis grani magnitudine, lympham aut saniem continentibus, quae scalpendo ruptae crustas prurientes formant; contagiosus hic morbus et inoculabilis flexuras artuum maxime occupat.

## G. XXXII. TINEA:

131

Incipit a pustulis vel phlycthaenis capitis aut faciei diversi-coloribus, quae ruptae in crustas humidas vel siccas abeunt corymbosae; videtur nimirum esse scabies capitatis, et nihil aliud:

## O. VI. ICTERITIAE.

Cognoscuntur ex totius cutis colore inaffecto, pallido, flavo, nigro, rubro, lurido sine pyrexia notabili.

## G. XXXIII. AURIGO.

132

Flavedo cutis ad aurcum, vel aurantium ten-

276 SYSTEMA MORBORUM

dens colorem, praecipue vero scleroticae membranae.

133 G. XXXIV. MELASICTERUS.

Color cutis et scleroticae niger, atro-lividus, fuliginosus, constituunt characterem hujus generis, cum modestia et perturbatione mentis.

134 G. XXXV. PHOENIGMUS.

Morbus hicce apyretus rubedine cutis diffusa maculata, vel punctata, notatur.

135 G. XXXVI. CHLOROSIS.

Pallor faciei totiusve corporis, cum asthenia, et saepius pica, sine aurigine scleroticae; color est albus, cinereus, fuscus, cereus, luridus, aut virescens, cum sclerotica semper albissima perseverante.

O.VII. CACHEXIÆ ANOMALÆ.

Noscuntur ex signis classicos et affinitate cum prioribus generibus.

## G. XXXVII. PHTHIRIASIS. 136

Exortus infectorum, pediculorum, aut his  
affinium, cum porrigine, exulceratione,  
pruritu, cachexia.

## G. XXXVIII. TRICHOAMA. 137

Morbus contagiosus Hebraeorum, cuius  
praecipuum symptoma est capillorum  
conspuratio, complicatio, conglutinatio,  
et in cirros ac funiculos concretio inex-  
tricabilis, saepius cum phthiriasi ; haere-  
ditarius est morbus hicce.

## G. XXXIX. ALOPECIA. 138

Defluvium pilorum et desquamatio cuticu-  
lae constituunt characterem hujus morbi,  
cunctis animantibus communis.

## G. XL. ELCOSIS. 139

Copiosa ampla ulcera, foetida, cariosa, chro-  
nica, cum pyrexia lenta, produnt hoc  
genus.

## G. XLI. GANGRÆNA. 140

Anæsthesia, immobilitas, frigus, phlycthae-  
nae lympham continentes, flacciditas, li-  
viditas, et partis mors in cute et mem-

brana cellulosa, vel in omnibus ad ossa usque, textus facilis laceratio et dissolutio putrida, cum foetore cadaveroso, definunt hoc genus.

141 G. XLII. NECROSIS.

Est partis mors lenta sine praevio timore, mollitie, et dissolutione foetida, cum dolore ardente ordinario et stupore, quae sequitur exsiccatio partis, induratio, nigredo, et mumia; differt a gangraena in eo, quod lentius procedat, cum dolore rodente et stupore, et in mumiam abeat; gangraena contra mollescat, phlycthaenas elevet, putrefescat, foeteat, atque cito decurrat.

## C L A S S I S .   IV.

Ingrata et molesta sensatio, aut imaginatio, qualis ex nervearum partium laceratione, rosione, ustione, pressione, distractione, oritur, reliqua symptomata superans hanc definit classem.

## O. I.   D O L O R E S   V A G I .

Saepius universales, aut cutanei ad phlegmasias non referendi.

## G. I.      A R T H R I T I S .

142

Articulorum dolor spontaneus, periodicus a synovia corrupta.

## G. II.      O S T O C O P U S .

143

Est dolor constans et notabilis ossium, a periostio interno potissimum affecto, ex pressione non exacerbans, fixus.

## G. III.    RHEUMATISMUS.

144

Dolor diutinus in parte carnosa, tendinosa artuum, vagabundus, saepius sine coryza, rheumate, catarrho, erysipelate, et sine febre notabili ; acutus rheumatismus facit genus inter phlegmasias *Myositin* a me dictum ; sanguis missus rheumatismo la-

borantium est gelatinosa crusta tactus, et urina saepe ad sulphureum colorem accedit.

**145 G. IV. CATARRHUS.**

Colli colloque vicinarum partium dolor a frigore suscepto, cum tussi, coryza, levi partium intumescentia, et pyrexia vespertina exigua, seu amphimerina catarrhalis.

**146 G. V. ANXIETAS.**

Molestia ad loci mutationem assiduam cogens aegrum, quem habet.

**147 G. VI. LASSITUDO.**

Est ingrata sensatio, juncta cum debilitate, quae ad quietem cogit virium reparandorum gratia.

**148 G. VII. STUPOR.**

Est molesta sensatio cum obscuritate tactus.

**149 G. VIII. PRURITUS.**

Molesta sensatio ad scalpendum cogens.

**150 G. IX. ALGOR.**

Molestia qualis a summo aëris frigore excitatur, jam cum phricasimo, rigore, vel concussione corporis, jam sine his symptomatibus.

## G. X. ARDOR.

151

Molestia qualis a summo aëris calore producitur.

## O. II. DOLORES CAPITIS,

Faciei, vel Capillitii.

## G. XI. CEPHALALGIA.

152

Est capitidis gravitas vel sensatio molesta, quae refert caput interius distensum, turgidum, et quasi gravatum, malum haud chronicum.

## G. XII. CEPHALÆA.

153

Est dolor capitidis chronicus, et, juxta Stahlianos, tensivus; videtur sola diurnitate a cephalalgia differre receptissimum hoc genus.

## G. XIII. HEMICRANIA.

154

Est morbus, cuius praecipuum symptomam est dolor in alterutro capitidis latere, potissimum ad tempora, frontem, ac oculos, isque vehemens saepe et periodicus quandoque.

## 155 G. XIV. OPHTHALMIA.

Cognoscitur ex oculi dolore, rubore, intollerantia lucis, et lacrymatione, vel siccitate.

## 156 G. XV. OTALGIA.

Dolor in aüre.

## 157 G. XVI. ODONTALGIA.

Dolor dentium maxillarumque, cum vigiliis et saepius ptyalismo, maxillac aut genarum tumore.

## O. III. DOLORES PECTORIS

Anhelationis expertes.

## 158 G. XVII. PYROSIS.

Ardor oesophagi ad ventriculum usque extensus, sine febre, vulgo Soda dicitur.

## 159 G. XVIII. CARDIOGMUS.

Est gravis pertinaxque molestia in praecordiis, cum sensu ponderis auctaeve molis et pulsatione, quae ad minimum motum augentur: Aneurysmati cordis, auricularum, sinuum, et arteriarum tribuitur cardiogmus, seu dolor cordis.

## O. IV. DOLORES ABDOMINIS

Interni.

## G. XIX. CARDIALGIA.

160

Molestia ad epigastrium et ventriculum re-lata, syncopen minitans.

## G. XX. GASTRODYNTIA.

161

Notabilis et durans in regione ventriculi dolor, sine syncope et pyrexia.

## G. XXI. COLICA.

162

Est dolor potissimum intestini crassi regio-nes occupans in abdome, hujusque of-ficia turbans, sine febre notabili, cum pulsu plerumque suppresso, rariore, et obstopitione.

## G. XXII. HEPATALGIA.

163

Molesta sensatio gravativa, tensiva, aut quaevis alia in regione hepatis, sine py-rexia acuta.

## G. XXIII. SPLENALGIA.

164

Est dolor pertinax gravativus, tensivus, in regione lienis, cum aliquali dyspnoea,

284 SYSTEMA MORBORUM

pulsu in inspiratione intermittente, tumore  
et duritie, sine pyrexia.

165 G. XXIV. NEPHRALGIA.

Dolor fixus in regione renum et ureterum,  
sine pyrexia acuta.

166 G. XXV. HYSTERALGIA.

Dolor in regione uteri, sine parturitionis  
nisu et phlegmasia notabili.

O. V. DOLORES EXTERNARUM

Partium locales.

167 G. XXVI. MASTODYNIA.

Dolor mammarum.

168 G. XXVII. RACHIALGIA.

Atroces dolores abdominis, ad lumbos et  
dorsum serpentes, pressione non crescen-  
tes, cum umbilici subin retractione, alvi  
constipatione, convulsione, manuum tor-  
pore, paresi, paralysi, ac contracturis ar-  
tuum, definunt hunc morbum.

## G. XXVIII. LUMBAGO.

169

Est dolor lumborum corporis erectionem impediens, sine nausea, ureterum dolore, femoris stupore, urinaeve vitiis; dolor est in musculis spinae dorfi aut ligamentis.

## G. XXIX. ISCHIAS.

170

Dolor constans coxendicis, pelvis, et capitis femoris, nec non muscularum ejusdem; hinc difficultas gradiendi, standi, claudicatio, frigus partis; conatus ad deponendum alvum dolorem augent ischiadicum.

## G. XXX. PROCTALGIA.

171

Est dolor podicis.

## G. XXX. PUDENDAGRA.

172

Dolor partium genitalium tum in viris tum in foeminis.

## G. XXXII. DIGITIUM.

173

Est dolor periodicus articuli cuiusdem digitii, cum emaciatione et ossis friabilitate, sine omni phlegmasia. Vide III. De Sauvages. T. I. p. 150.

C L A S S I S V.  
F L U X U S.

CHAR. CLASSIS. Exitus insolitus cujusvis fluidi vel solidi e corpore.

O. I. SANGUIFLUXUS.

Sanguinis, vel saltem sanguinolentae materiae ejus in effluxu seu exsanguis, quacunque via, praeter alvinam.

174 G. I. HÆMORRHAGIA.

Est fluxus sanguinis e naribus.

175 G. II. HÆMOPTYSIS.

Est sanguinis expectoratio seu anacatharsis, cum tussi sine notabili pyrexia.

176 G. III. STOMACACE.

Stomacace laborantibus sanguis dissolutus promanat e gingivis laxis, folidis, et foetidis, sponte, vel ad levem harum attackum.

177 G. IV. HÆMATEMESIS.

Est sanguinis rejectio ex oesophago, cum vomitorio conatu, anxietate magna, et animi deliquiis; observantur et facies alvi sanguine tintæ, nigricantes.

## G. V. HÆMATURIA.

178

Est effluxus seu minatio cruentis, urinae cruentae ex vesica, vel semen sanguinolenti ex urethra, in viris et mulieribus.

## G. VI. METRORRHAGIA.

179

Sanguinis ex utero aut vagina fluxus morbosus, nimius.

## G. VII. ABORTUS.

180

Est foetus immaturi, id est, ante nonum mensem graviditatis saltem aliquot septimanis exclusio, subin cum metrorrhagia: Symptoma sunt, laffitudo, anorexia, frigus, mammarum flacciditas, lumbago, hysteralgia, lipothymia, &c.

## O. II. ALVIFLUXUS

Sanguinolenti.

## G. VIII. HEPATIRRHOEA.

181

Est alvi fluxus per inferiora sanguinolentus, nec ater, nec torminosus.

## G. IX. HÆMORRHOIS.

182

Est sanguifluxus ex tuberculis, mariscis rubris, duris, dolorificis, finem intestini recti

obsidentibus, vel in recto latentibus; sentiunt posteriora tubercula aegri in recto saepius obstipati, et digitus immisus intestino haec offendit; sanguis in depositione alvi praecedit, vel ad minus comitantur, excrementa.

## 183 G. X. DYSENTERIA.

Est frequens torminosa mucoso-cruenta alvi dejectio.

## 184 G. XI. MELÆNA.

Est fluxus materiei nigricantis, atro-rubrae, ano vel cato: frequens.

O. III. ALVIFLUXUS  
Non sanguinolenti.

## 185 G. XII. NAUSEA.

Est inanis vomendi conatus, et tamen maximis licet nisibus nihil nisi flatus aut mucus exiguum exantlatur; adeo anorexia, gastrodynbia, motus ossis hyoidis ad superiora, ptyalismus; capitis ad anteriora inclinatio, tremor labii inferioris, &c.

## G. XIII. VOMITUS.

186

Est palpabilium materierum non cruentarum per os oesophagumque rejectio frequens ex ventriculo; causa est antiperistaltica ventriculi contractio, concurrente diaphragmatis et muscularum abdominallium pressione, cum simultanea expiratione; pulsus est contractus, rigidus, et frequens.

## G. XIV. ILEUS.

187

Gastrodynia, obstipatio, anxietas, et vomitus demum faeculentae materiae, determinant hunc morbum; atrocia circa umbilicum tormenta, ructus, nausea, singultus, intestinorum volutatio, virium prostratio, pertinax alvi obstipatio, et vomitus demum faeculentus, sunt symptomata principalia hujus morbi.

## G. XV. CHOLERA.

188

Est syndrome ex vomitu, diarrhoea, gastrodynia, prostratione virium, et subinfararum crampo.

## G. XVI. DIARRHOEA.

189

Est recrementorum et excrementorum ut

290 SYSTEMA MORBORUM

plurimum fluxilium frequens per anum  
dejectio notabilis et constans, adeoque  
morbosa.

190 G. XVII. COELIACA.

Est albescentium, aut chyliacearum mate-  
rierum per alvum frequens dejectio, ple-  
rumque profusa, cum torminibus et pro-  
stratione virium.

191 G. XVIII. LIENTERIA.

Alimenta parum aut nihil mutata per al-  
vum dejiciunt, et quidem plerumque  
paulo post ingestionem, lienterici.

192 G. XIX. TENESMUS.

Muci frequens et pauca dejectio per anum,  
cum intensa dejiciendi cupiditate, cona-  
tuque eidem proportionali; stimulum et  
dolorem fentiunt aegri in intestino recto.

193 G. XX. PROCTORRHOEA.

Est fluxus mucosus subalbi, flavescentis, quan-  
doque striis sanguincis tincti, humoris  
ex vasis haemorrhoidalibus externis, vel  
in recto latitantes, qui humor ordinario  
spissior est, dum ex internis vasibus stillat,  
et ybalaque praeceedit: Vide Lieutaud, T.

i. p. 396. No. 4. Pruritum praeterea et ardorem hoc fluore madentes et foeten-tes in podice sentiunt, queruntur. Species non adeo magni momenti in praxi pos- sunt esse proctorrhœa externa, interna, periodica, sanguinolenta, hujus generis, quod etiam proctoleucorrhœa vocari po-test, ob similitudinem cum leucorrhœa.

## O. IV. SERIFLUXUS.

Fluidi nec sanguinolenti, nec per alvum, ef-fluxus morbosus.

### G. XXI. EPHIDROSIS.

194

Est sudoris quantitate, qualitate, aut inter-mpestivitate peccantis, excedentis effluxus.

### G. XXII. EPIPHORA.

195

Est oculis constans effluxus humoris ferosi, lacrymalis, sebacei, aut purulenti, mor-bosus.

### G. XXIII. CORYZA.

196

Est humoris ferosi mucosive e naribus flux-us morbosus, sine, vel cum ozaena, con-coitantem plerumque gravedine capitis.

## 197 G. XXIV. PTYALISMUS.

Est salivae mucive, sine anacatharsi ac vomitione, ex ore effluxus, emissio, aut sputatio uber et constans.

## 198 G. XXV. ANACATHARSIS.

Est muci, lymphae, aut puris facta cum tussi e pectore per os rejectio frequens, notabilis, et morbosa.

## 199 G. XXVI. DIABETES.

Subita potus omnis per urinae vias emissio, vel urinarum utcunque coctarum nimia profusio, cum siti, anorexia, et polydipsia.

## 200 G. XXVII. ENURESIS.

Involuntaria et inopportuna doloris et ardoris expers minctio, quaeque saepius insciis accidit.

## 201 G. XXVIII. PYURIA.

Est purulentae, albae, flavae, mucosae, aut lutulentae materiae cum urinis minctio.

## 202 G. XXIX. LEUCORRHOEA.

Est serofae, flavae, puriformis, mucosae, foetidae, atrae, &c. materiae ex utero aut vagina delapsus, effluxusve morbosus.

## G. XXX. LOCHIORRHOEA. 203

Est lochiorum alborum nimius fluxus puerperam debilitans.

## G. XXXI. GONORRHOEA. 204

Est stillicidium fluidi seminalis, vel purifloris, ex urethra, sine minctione.

## G. XXXII. GALACTIRRHOEA. 205

Est stillicidium lactis e mammis, vel locis insolitis.

## G. XXXIII. OTORRHOEA. 206

Est fluxus serosus, purulentus, foetidus, ex cavo auris, meatu auditorio, vel ambitu auriculae.

## O. V. AERIFLUXUS.

Sunt flatus halitusve insolitae et vitiosae emissiones per os vel anum, &c.

## G. XXXIV. FLATULENTIA. 207

Est morbus flatuum per os, vel anum, frequenti emissione et borborygmis designatus.

294 SYSTEMA MORBORUM

208 G. XXXV. ÆDOPSOPHIA.

Est flatuum ex vesica per urethram, vel ex  
utero per vaginam, emissio.

209 G. XXXVI. DYSODIA.

Est foetidorum vaporum e corpore exhala-  
tio odoratum offendens, exhalant tales  
vapores e naribus, ore, vulva, inguinibus,  
axillis, et pedibus.

## C L A S S I S VI.

CHAR. CLASSIS. Meatum impeditio; hinc solitarum in sanitate excretionum impedimentum et emansio; *Suppressorios* morbos vocavit Ill. Linnaeus.

## ORDO I. SUPPRESSIONES

Humorum seroforum.

G. I.      A D I A P N E U S T I A.      210

Transpirationis naturalis, et liquoris cutis organa humectantis, suppressio.

G. II.      S T E R I L I T A S.      211

Est geniturae suppressio, conceptus impedatio.

G. III.      I S C H U R I A.      212

Urinæ secretæ a renibus retentio seu suppressio, cum tumore hypogastrii, vel secretionis in renibus suppressio, cum stupore renum, singultu, anorexia, vomitu, ptyalismo urinoso, ephridroſi.

G. IV.      D Y S U R I A.      213

Difficilis et dolorifica, guttata saepius et ardens miccio; est ergo fluxus urinae pro

parte suppressus, et non in integrum, ut  
in ischuria.

**214 G. V. AGLACTATIO.**

Lactis defectus.

**215 G. VI. DYSLOCHIA.**

Est lochiorum suppressio.

**O. II. SUPPRESSIONES  
INGERENDORUM,**

Constrictio meatuum ingerenda admitten-  
tium, sine phlegmasia.

**216 G. VII. DYSPHAGIA.**

Est deglutitionis suppressio, impeditio, absque  
notabili respirationis laesione et phlegma-  
sia.

**217 G. VIII. ANGINA.**

Est respiratio impedita, cum sensu obicis in  
guttura, absque phlegmasia, sive dein ad-  
sit dysphagia, sive non.

## O. III. SUPPRESSIONES

Imi ventris.

## G. IX. DYSMENORRHOEA. 218

Menstrua suppressa, dolorifica, cum lumbagine, cephalalgia, dyspnoea, palpitatione cordis, &c. constituunt characterem hujus generis; fluxus menstruus periodicus a tribus ad 8 dies protelari solet; quantitas sanguinis a quinque ad 10 uncias limitatur; circa 13 annum aetatis incipit, et ad 45 plerumque producitur; sanguis refert sanguinem violimae.

## G. X. DYSTOCIA. 219

Dolorifica, laboriosa ultra modum foetus exclusio aut secundinarium, vel penitus impossibilis.

## G. XI. DYSHÆMORRHOIS. 220

Est suppressio suetarum haemorrhoidum; dum fluxus haemorrhoidum suctarum periodicus sapientius supprimatur, ex quacun-

que occasione, ante annum circiter 60, 65, quo hic fons sponte siccari solet; oriuntur lumbago, ischias, vertigo, cephalalgia, tensio cervicis, anxietas, dyspnoea, colica, &c. Haemorrhoidum fluxus, qui ultra 65 annum aetatis protelatur, jam morbosus haberi debet et supprimi minuive; senectus enim hunc fluxum non fert. Haemorrhoidis rariissime cum constantia sanitatis observatur; hinc vix pro beneficio haberi potest, licet morbos graviores praevertere dicatur.

## 221 G. XII. OBSTIPATIO.

Faecum alvi exoneratio impedita. *Carolus Linnaeus*; est nimirum segnis, difficilis, rara faecum alvi excretio, vel plane nulla etiam medicamentis prolici possunt excrementa: Medici affiduo curant obstipationem, et tamen hanc nec in numero morborum tolerant; ecquidem raro est morbus per se, saepissime vero symptoma hoc alias morbos comitatur et auget.

# C L A S S I S VII.

## S P A S M I.

**CHAR. CLASSIS.** Contractio constans, vel interpolata, muscularum motum localem efficientium, eaque invita.

### O. I. SPASMI TONICI PARTIALES.

Rigiditas organi, vel artus determinati.

**G. I. STRABISMUS.** 222

Oculi alterutrius spasmus, tonicus axium opticorum divergentiam, vel convergenciam nimiam inferens; seu est spasmus tonicus oculi, unde hujus axis cum alterius axi ad unum objectum non convergit.

**G. II. TRISMUS.** 223

Est spastica contractio tonica, aliquando visa fuit solum clonica maxillae inferioris, vulgo *trotura oris* dicitur; rusticus venerat ad me pedes trismo tonico laborans pro consilio, contra hunc morbum; da-

## 300 SYSTEMA MORBORUM

tur igitur solitarius hicce morbus; vide *tetanum*.

### 224 G. III. OBSTIPITAS.

Est colli spasmus, vulgo dicitur *torticollis*, tonicus, vel clonicus capitis mobilitatem et directionem mutans.

### 225 G. IV. CONTRACTURA.

Est artus unius vel plurium constans, diuturna rigiditas, inflexilitas.

### 226 G. V. CRAMPUS.

Est subitanea, fugax, et dolorifica musculi rigiditas, cum dolore subin atroci.

### 227 G. VI. PRIAPISMUS.

Est penis ingrata et sine appetitu libidinis rigiditas, seu *erectio*.

## O. II. SPASMI TONICI GENERALES.

### 228 G. VII. TETANUS.

Spasmus generalis tonicus subito ortus, cum dyspnoea; rigent musculi omnes, et corpus inflexible servant, cum dyspnoea &c

rubore faciei; vel rigent musculi soli posteriores corporis, aut anteriores, et corpus flectunt horribiliter, et plerumque flexum servant diutius.

## G. VIII. CATOCHUS.

229

Spasmus generalis tonicus sensim factus, sine dyspnoea, agitatione pectoris, faciei rubore, chronicus.

## O. III. SPASMI CLONICI PARTIALES.

Agitatio invita et coacta cujusdem organi aut artus, cuius motivum ab aegro non percipitur.

## G. IX. NYSTAGMUS.

230

Spasmus clonicus oculi, vel palpebrae.

## G. X. CARPHOLOGIA.

231

Est spasmus clonicus manuum, quo aegri floccos e tegumentis evellunt, paleas colligunt, muscas venantur; symptoma hoc a suffusione natum plerumque est lethale.

## 232 G. XI. SUBSULTUS.

Est motus palpitans aut tremulus tendinum,  
pone carpos potissimum observabilis.

## 233 G. XII. PANDICULATIO.

Est spasmus artus successive extendens plures, vel omnes in oscitatione.

## 234 G. XIII. A P O M Y T T O S I S.

Est succussio cutis et capitis, cum trunci totius agitatione tremula et violenta ; adeo simul exspiratio sonora, quasi stertorosa.

## 235 G. XIV. C O N V U L S I O.

Est agitatio invita artus, vel musculi brevis cum superstite exercitio animi.

## 236 G. XV. T R E M O R.

Artuum aut capitis alterna, per itus et reditus frequentes, motitatio per brevissima spatiola, cum movendi voluntate concurrens, qua cessante, cessat quoque tremor.

## 237 G. XVI. P A L P I T A T I O.

Est pulsatio in regione cordis insolita, cum pulsu intermittente, crapizante, tremulo, subduro, inaequali, inordinato, debili, quandoque et dyspnœa ad quemlibet mo-

tum notabili; habeo aegram, cuius pulsus sub actuali palpitatione remittit, vel intermittit, in 5 annum jam hoc ex morbo languentem; subin tremorem in praecordiis patitur, cum pulsu caprizante tremulo; notum est, quod regularis pulsatio cordis non dicatur palpatione.

**G. XVII. CLAUDICATIO.**

238

Est vitiosus gradiendi modus, quo truncus singulis passibus huc vel illuc nimium inclinat, unde crus indecorum movetur, trahitur.

**O. IV. SPASMI CLONICI  
GENERALES.****G. XVIII. PHRICASMUS.**

239

Est succussio invita totius cutis, imo saepius totius corporis, frigorifera.

**G. XIX. ECLAMPSIA.**

240

Est morbus convulsivus clonicus acutus, quandoque remittens, cum sensuum feriatione in paroxysmo; pollices intro non

· premunt, spuma ex ore non cructat, spasmi sunt tremuli artuum omnium; vulgo vocatur hic morbus *apoplexia puerilis*.

## 241 G. XX. EPILEPSIA.

Est morbus spasmodicus clonicus, intermitens, seu periodicus, chronicus, cum variorum membrorum invita agitatione, dyspnoea, spumae oris eruptione, pugnorum constrictione, et sensuum feriatione externorum et internorum, sine asphyxia: *Symptomata*: Subitaneus casus, oblivio omnium, clamor, mugitus, stridor dentium, truculentia oculorum, spuma oris, pugnorūm constrictio, totius corporis agitatio.

## 242 G. XXI. HYSTERIA.

Est artuum organorumque externorum internorumque spasmus clonicus tonicusve, paroxysmis fugacibus, leviter variantibus, cum pusillanimitate, sensibilitate animae summa, mortis formidine intensa, teneritudine partium convulsarum remanente, attactum fugiente, et urine hyalina. Signa pathognomica hujus morbi statuit Ill. Astruc agitationem matricis, pnycem, corr-

strictionem pectoris et glomuim fluctuantem in abdomine.

## G. XXII. SCELOTYRBE.

243.

Est motus semivoluntarius unius lateris, vel totius corporis in gressu, situ erecto, aut comedione, gesticulationem, aut ridiculam histrionis festinationem, referens; hunc morbum vocavit *Sydenhamus Chorea Sancti Viti.*

## G. XXIII. BERIBERIA.

244.

Est motus gradientium genua spastice retrahens, cum tremore artuum, formicationis sensu, vocis raucedine, stupore dolorifico artuum, qui morbis Indis est familiaris. In ovibus olim lupum videntibus beriberiam spasmodum vidi, stantes hae vel gradiientes tristes momentanae retrahunt genua, ad situm naturalem illico redditura.

Q. q

## C L A S S I S VIII.

### ANHELATIONES.

**CHAR. CLASSIS.** Est agitatio invita, defatigans muscularum pectoris, cum respiratione difficiili, laboriosa, sonora, frequenti, sine febre notabili, et sine phlegmacia.

### O. I. ANHELATIONES SPASMODICÆ.

Sunt symptomata fugacia spasmodica, saepius repetentia, quae consistunt in ex vel inspirationibus sonoris.

#### 245 G. I. EPHIALTES.

Morbus hic recurrens afficit dormientes cum anhelatione et insomnio corporis cujusdam pectus opprimentis; unde respiratio horum querula, gemebunda, et anxia.

#### 246 G. II. STERNUTATIO.

Est violentia, sonora, et subitanea exspiratio, in nares posticas immisso aëre, ad nares everrendas sub convulsiva capit is et trun-

ci corporis concussione, ad anteriora flexione. Species sunt sternutationis, catarhalis, rubeolosa, verminosa, spontanea, febricosa, epidemica, critica, medicamentosa, &c.

G. III. OSCEDO. 247

Est aëris copiosi profunde inspirati diutina, lenta, et invita naturalis exspiratio, cum magno oris hiatu; saepe concurrit et pandiculatio.

G. IV. SINGULTUS. 248

Est concussio diaphragmatis invita, cum inspiratione subito interrupta, sonora.

G. V. TUSSIS. 249

Est concussio sonora, violenta, invita pectoris, cum exspiratione ad pulmonem quodam obice liberandum.

O. II. ANHELATIONES  
SUPPRESSIVÆ.

Hae fiunt cum metu suffocationis, suntque pleraeque constantes.

## 250 G. VI. STERTOR.

Est respiratio sonum gravem et tremulum  
in gutture edens, saepius sibilo stipata.

## 251 G. VII. DYSPNOEA.

Est difficultas respirandi assidua et chronica,  
sine signis empyematis, hydrothoracis.

## 252 G. VIII. ASTHMA.

Est chronica, periodica respirandi difficultas.

## 253 G. IX. ORTHOPNOEA.

Est morbus continuus acutus, subitanea anhe-  
latione sublimi, et fere suffocatoria, stipatus.

## 254 G. X. PLEURODYNE.

Anhelatio, cum pectoris dolore, sine phleg-  
masia, cum exigua vel nulla febre.

## 255 G. XI. RHEUMA.

Cognoscitur ex difficultate respirandi, cum  
sensu gravitatis in pectore, quam comita-  
tur coryza, sternutatio, raucedo, cephalal-  
gia, tussis, sine pyrexia notabili, et sine san-  
guine inflammato; *endemius hic morbus.*

## 256 G. XII. HYDROTHORAX.

Est genus anhelationis chronicum continu-  
um, stipatum phlegmasia pedum, pallore

faciei, oedemate manuum, subita in somno suffocatione, alterutrius manus stupore, sine signis empyematis; haec symptomata jam adsunt omnia, jam tantum aliqua; anhelatio crescit pro inclinatione corporis.

## G. XIII. EMPYEMA.

257

Est difficultas respirandi a pectoris reclinacione crescens, quam praecessit phlegmnia pectoralis non resoluta, sed suppurata; comitatur amphimerina tabida notabilis, macies, decubitus horizontalis et in latus sanuin difficilis, gravitas supra diaphragma, sudores profusi, rubor genarum, et multa symptomata hydrothoracis: Species sunt, *peripneumonicum, vomicale, pleurale, mediastinale, diaphragmaticum, intercostale*; quas species sufficiat hic nominasse, quum earundem historia necdum satis provecta sit.

C L A S S I S IX.  
D E B I L I T A T E S.

CHAR. CLASSIS. Est impotentia clare et distincte sentiendi, appetendi, consueta vi artus organave movendi, nec non imaginandi, vigilandi, sensibus internis et externis utendi.

O. I. D Y S Æ S T H E S I Æ.

Impotentia clare et distincte sentiendi.

258 G. I. A M B L Y O P I A.

Est visus debilitas respectiva ad situm, gradum lucis, distantiam objecti, oculis pellucidis; vel est debilitas visus absoluta, vel respectiva, sine opacitate corneae, aut vitio internarum partium oculi.

259 G. II. C A L I G O.

Est imminutio partialis, vel totalis deletio visus, propter repagulum opacum citra seu ante pupillam oculo inhaerens, aut palpebris.

## G. III. C A T A R A C T A. 260

Est visus debilitas, vel abolitio, ob maculam opacam, post pupillam positam, seu opacitatem lentis crystallinae.

## G. IV. A M A U R O S I S. 261

Est visus suppressio, abolitio, vel defectus, cum pupillae ferme plenaria immobilitate, sine sensibili oculorum vitio aut opacitate externis.

## G. V. A N O S M I A. 262

Est imminuta, vel suppressa facultas percipiendi odores.

## G. VI. A G H E U S T I A. 263

Est suppressio facultatis, qua diversos sapores percipimus, cum vel sine anorexia.

## G. VII. D Y S E C O E A. 264

Est audiendi difficultas, seu gravis auditus et obscura perceptio sonorum.

## G. VIII. P A R A C U S I S. 265

Est debilitas seu confusio auditus, qua affecti clare percipiunt voces, sed non distincte diversos sonos et articulatas voces audiunt, vel alios sonos clare et distincte audiunt, alios tantum clare sine distinctione.

## 266 G. IX. C O P H O S I S.

Est obscura, vel nulla sonorum perceptio,  
seu impotentia percipiendi sonos totalis,  
vel partialis.

## 267 G. X. A N Ä S T H E S I A.

Est sensus omnis privatio, superstribus motu  
musculari et rerum necessiarum appeti-  
tu aliquantum minutis, sine omni sopore.

## O. II. A N E P I T H Y M I Ä.

Appetituum sensitivorum debilitas, seu im-  
minutio notabilis.

## 268 G. XI. A N O R E X I A.

Est notabilis debilitas, imminutio, seu cessa-  
tio famis in jejunis animantibus.

## 269 G. XII. A D I P S I A.

Est sitis debilitas, seu imminutio, aut abolitio.

## 270 G. XIII. A N A P H R O D I S I A.

Est debilitas, vel abolitio appetitus venerei,  
seu impotentia: Vide *sterilitatem*.

## O. III. D Y S C I N E S I Ä.

Impotentia exercendi motus solitos volun-  
tati subjectos.

## G. XIV. MUTITAS. 271

Est impotentia proferendi voces articulatas.

## G. XV. APHONIA. 272

Est plenaria vocis suppressio, citra stuporem, syncopen, et comata; muti inarticulatam vocem habent, aphoni contra nullam.

## G. XVI. PSELLISMUS. 273

Est difficultas seu impotentia quasdam syllabas literasve recte pronunciandi, faciunt hoc puellae quaedam naviter, ut magis placeant procis.

## G. XVII. CACOPHONIA. 274

Est vocis vitium et insuavitas atque asperitas.

## G. XVIII. PARALYSIS. 275

Est unius tantum artus, vel articuli frigida plerumque laxa immobilitas, absque dolore, cum vel sine anaesthesia; *paresis* est sensim invadens debilitas movendi artus, seu est imperfecta paralysis; movent enim hi artus, sed difficulter; colicam pictonum aliasque rachialgiae species comitatur, vel sequitur paresis, lente accedit paretica debilitas, et non est tanta,

quanta observatur paralyticorum; aetu  
observo paresin in brachiis egregii chi-  
rurgi Christophori Nohrer, ex colica pic-  
tonum laborantis.

## 276 G. XIX. HEMIPLEGIA.

Cognoscitur ex summa debilitate, vel integra  
motus muscularis suppressione unius late-  
ris corporis, cum laxitate, frigiditate, in-  
dolentia artuum et mentis integritate, sine  
vel cum anaesthesia.

## 277 G. XX. PARAPLEXIA.

Est paralysis artuum inferiorum, vel omni-  
um artuum, cum enuresi, anaphrodisia,  
quandoque et anaesthesia ac marasmo.

## O. IV. LEIOPSYCHIAE.

Virium vitalium, pulsus, et respirationis de-  
bilitas seu imminutio; *pulsus est perpen-*  
*diculum vitae.*

## 278 G. XXI. ASTHENIA.

Est debilitas omnium artuum, superfite ac-  
tionum vitalium minutarum tenore, su-  
perstitibusque sensibus, sine dolore.

## G. XXII. LIPOTHYMI A.

279

Est subitanea et brevis virium musculariam  
et sensuum dejectio, seu eclipsatio, super-  
stite pulsu et cognoscendi aliqua facultate  
adstantes, cum aurium tinnitu, calore,  
vertiginosaque capitis turba.

## G. XXIII. SYNC O P E.

280

Est subitanea virium omnium animalium,  
et vitalium sensuumve, imminutio tanta,  
ut aeger per tempus sui conscius non sit,  
cum lenta lenive respiratione, pulsu ob-  
scuro, sudore frigido, et aliquali interio-  
rum calore.

## G. XXIV. ASPHYXIA.

281

Est subitanea eclipsis omnium actionum na-  
turalium, animalium, et vitalium, cum  
mortis imagine : Vide Cl. *Lancifum* cir-  
ca mortes subitaneas.

O. V. COMATA SEU MORBI  
SOPOROSI.

Omnium sensuum seriationes, maximae de-  
bilitates.

## 282 G. XXV. CATALEPSIS.

Est sensuum omnium motuumque muscularium suppressio, pulsu et respiratione pacatis, placidis, lentis, minutis, vel obscuris, cum mira ad quosvis situs suscipiendos et retinendos artuum flexilitate, aptitudine; retinent figuram, in qua ipsos prehendit morbus, et omnem recipiunt servantque, quam illis dederis; morbus est recurrens, et fors tantum mulierum.

## 283 G. XXVI. ECSTASIS.

Est status soporofus a gravi pathemate, vel mentis attentione profunda ortus, aegrum in eodem situ, quo prehensus est, retinens, sine aptitudine cataleptica.

## 284 G. XXVII. TYPHOMANIA.

Est sopor apprens, cum pervigilio delirioso reali, musitatione; vel est sopor levis ex quo ac gri facile excitantur, cum delirio comitante.

## 285 G. XXVIII. LETHARGUS.

Est status soporofus facile excitabilis, cum summo imaginationis et memoriae torpore, obliuione, et febre.

G. XXIX. CATAPHORA. 286

Est somnolentia facile excitabilis, sine febre,  
oblivione, stertore, delirio.

G. XXX. CARUS. 287

Est somnus altissimus, vix aut ne vix exci-  
tabilis, sine stertore, cum respiratione ta-  
cita pacatissima; morbus saepius est acu-  
tus; semi-apertis oculis plerumque dor-  
miunt omnino immobiles.

G. XXXI. APOPLEXIA. 288

Est somnus profundissimus, vix aut ne vix  
excitabilis, cum stertorosa respiratione,  
faciei tumore, omnium artuum laxitate,  
et pulsu plerumque duro, forti.

# C L A S S I S X.

## EXANTHEMATA.

**CHAR. CLASSIS.** Febris cum asthenia, efflorescentia cutis maculata varia, pustulosa, papulosa, phlyctenoidea, &c. vel cavi oris, saepius maligna.

## ORDO I. EXANTHEMATA CONTAGIOSA.

### 289 G. I. PESTIS.

Eruptio purpurae, bubonum, anthracum, pemphigi, cum pyrexia typhode, maligna, dat characterem pestis : Vide celebrem Loimographum *Diemerbroeckium*.

### 290 G. II. VARIOLA.

Praeludium variolae patefit cephalalgia, lumbagine, nausea, vomituritione, ecclampsia, et febre continua inflammatoria; crumpunt dein pustulae phlegmonoideae suppurantes, escharoticae, deciduae, cicatrilantes; variola saepissime epidemicus

morbus habet IV stadia, nempe contagium, eruptionem, seu inflammationem pustularum, suppurationem, tandem exsiccationem.

### G. III. PEMPHIGUS.

291

Est phlegmasia saepius acuta, exanthematica, stipata bullis seu vesiculis avellanam circiter magnitudine aequantibus, sero flavo turgidis, per cutim sparsis: An *Hippocratis* T. 1. p. 684. ichores constituerint pemphigum? Tomo citato, p. 798. *Hippocrates* scripsit: ‘πυρετος οι δι πεμφιγωδης?’ Et *Claudius Galenus*, sexto epidemiiorum T. 1. Classe 3. p. 311. Basilca 1561, inter reliquas interpretationes hujus febris, etiam hanc admisit, quae est character hujus generis; nihil ergo novi pemphigus.

### G. IV. PURPURA.

292

Sunt maculae pulicum morsibus similes, faciei parcentes, pressione non evanescentes, carentes stigmate aculei a pulice infixi, coloris purpurei, lateritii, nigri, lividi, sine tumore, aspredine, cum febre amphimera, vel tritacophya, putrida, asthenia, lingua plerumque rubra, lateritia, molli.

## 293 G. V. RUBEOLA.

Post praeclodium catarrhosum, coryzam, epiphoram, tussim, cephalalgiam, somnolentiam, et palpebrarum tumorem, erumpunt papulae corymbosae rubrae, puliculm morsus aemulantes, asperae, uniformes, evanescenti-furfuraceae die IV, cum exiguo levamine symptomatum contagii in facie, collo, thorace, truncō reliquo, et artubus; quandoque sexto die in facie jam asperantur, siccantur, et in tenuissimum furfurem fatiscit epidermis; et hoc est initium tertii stadii, quod ordinario 8. vel 9. die, una cum morbo, finitur; febris comittatur rubeolam continua; rubeolam porro inoculat atmosphaera morbillosa bronchiis, sacco lacrymali, et sinibus sex in nares patentibus; medici contra seminatores rubeolae gossypium furfure morbilloso repletum sublimi vulnusculo, cuiusque brachii imponunt, emplastro omnia tegunt, et 6. die post appositum hunc apparatus incipiunt aegrotare.

## G. VI. SCARLATINA.

294

Est efflorescentia maculosa, ruberrima, pruriens, papulosa, irregularis, diffusa, desquamabilis, sine praeludio catarrhali efflorescens, cum febre plerumque judicatoria. Stadia tria scarlatinae observamus, praeludium noscimus inde, quod febris plerumque judicatoria, cum horrore et frigore, prehendat infantes, sub finem acutatis, fine praeludio catarrhali et sine vomitu; quarto vel citius die, facies intumescit modice, pectus, &c. erumpunt exanthemata paulo ante descripta, et hoc est stadium secundum; post 3 vel 4 dies incipit stadium tertium, in quo evanescunt exanthemata, et epidermis sub forma subtilis pollinis desquamatur.

O. II. EXANTHEMATA  
NON CONTAGIOSA.

## G. VII. MILIARIS.

295

Eruptio phlycthaenarum milii femine raro majorum, cum sudore vido; febris

continua, vel remittens, putrida; praeludit oppressio praecordiorum, gastrodynbia gravans, pulsus suppressus, urina minus tincta, lingua plerumque alba, mollis, asthenia; perstant in cute 4, 5, 6, 7, 9, 11, &c. diebus, et cum pruritu, sudore, solvuntur, in farinam subtilem disparent. *Hippocrates*, T. I. p. 697. describit miliarem et quidem criticam, seu servantem mulieres omnes, quarum cutim obsederat haec efflorescentia. *Silenus* insuper indubie 8. die morbi miliarie rubra maculatus fuit, T. I. p. 674.

## 296 G. VIII. ERYSIPELAS.

Est eruptio erythematis cum febre continua, vel amphimerina potius dicenda, tumiduli, superficialis, dilatabilis, desquamabilis; fistit nimirum maculas latas, amplas, subtumidulas, non suppurabiles; sanguis missus crusta inflammatoria non est tectus, sed pelle alba, tenui, et sat tenaci; dolor erythematis est calens, rodens. Tria stadia observantur erysipelatis: *Primum* absolvit gravedo, horror, inappetentia, laffit-

tudo, cum febricula amphimerina; die 2 3. vel 4. incipit secundum stadium, eruptio, nempe, erythematis, quod ordinario in 4. usque diem augetur; in tertio stadio collabitur successive tumor, calor, et dolor erythematis, et epidermis desquamatur, quod opus pleruinque 4 diebus Natura absolvit.

## G. IX. E S S E R A.

297

Constituunt hoc genus maculae rubellae impruriginosae, non fastigiatae ultra libellam cutis, magnitudinis grani tritici, zae, subito erumpentes ferme sine febre, et post 4, 5, 7, 9, 11, 14, dies sponte et sine desquamatione epidermidis disparentes; quandoque sunt paucae, subin contra numerosae; aegri sunt pleruinque orthostadii; praecedit eruptionem nox inquieta, leves anxietates; cutis, exstante effera, non est aspera ad attactum, nec rubedo est diffusa; maculae aliae sunt majores, aliae minores, sub epidermide latentes; hujus morbi meminit *D. Allen*, p. 407. ubi tamen non hunc, sed aliud descripsit; *Cl. D. Lieutaud*, T. I. p. 614. unam speciem descripsit hujus generis.

## 298 G. X. APHTH A.

Cognoscitur aphtha papulis seu phlycthaen-  
nis linguae, faucium, oris superficiem oc-  
cupantibus, subrotundis, plerumque se-  
milinearibus, colore albis in disco, cum  
radio facpius rubro, vel rubris, brunneis,  
flavis, lividis, nigris, et febre tritaeophya,  
vel obscura hebetica, aut penitus nulla;  
adest simul somnolentia, dolor urens oris,  
et difficultas in masticatione, suctione, ac  
deglutitione. Aphtha 4 stadia habet di-  
stincte, si non omnibus speciebus, in fe-  
brili observabilia: Stadium *primum* sese  
prodit laßitudine spontanea, levi dys-  
pnœa, gastrodynæ, anxietate exigua, som-  
nis turbatis, et calore oris: Stadium *se-  
cundum* propullulatio papularum nobis  
adesse loquitur: In stadio *tertio* elevan-  
tur papulae seu maculae in phlycthaenas  
miliares, quæ probabiliter sunt idem cum  
miliaribus cutis: Stadium *quartum* absolu-  
vit desquamatio epidelii, cum dolore sen-  
sibilissimo linguae et faucium superficiali.

## C L A S S I S XI. P H L E G M A S I Æ.

CHAR. CLASSIS. Febris quasi semper continua, cum pulsu duro, dolore topico, aliquius partis inflammatione, sanguine crusta inflamatoria tecto, urina plus colorata, lingua subsicca, sicca, calente, &c. *Hippocrates*, T. i. p. 810. 811. reliquit: Lingua concolor attingentibus ipsam humoribus: Quapropter per hanc humores cognoscimus.

## O. I. P H L E G M A S I Æ M U S C U L O S Æ.

G. I. P H L E G M O N E.

299

Cognoscimus phlegmonem ex febre acuta continua inflamatoria, pulsu duro, sanguine crusta inflamatoria tecto, et partis externae inflammatione; pars externa phlegmone affecta calet, rubet, dolet, tumet, est simul tensa resplendens sphacroidea; cutis ipsa et partes sub ipsa con-

tentae inflammatae sunt; phlegmone in suppurationem tendit, neutiquam vero erysipelas.

**300 G. II. CYNANCHE.**

Est phlegmasia acuta pharyngis, laryngis, dyspnoeam et dysphagiam inducens, cum pyrexia acuta, faucium rubore, calore, dolore, tumore, quae adesse docet inspectio in fauces, depressa lingua.

**301 G. III. MYOSITIS.**

Febris acuta inflammatoria, dolores in diversis musculis artuum, eorundemque involucris, diu noctuque discruciantes, motum vetantes ferme omnem, ad noctem exacerbantes; sanguis missus est tectus crusta inflammatoria subgelatinosa, vel pelletenuitenaci; hic morbus vulgo audit rheumatismus acutus.

**302 G. IV. CARDITIS.**

Adest dolor constans sub sterno in regione cordis urens,flammam vitae extinguens, cum palpitatione, frequentibus animi deliquiis, pulsu jam magno, duro, per momenta, jam parvo, frequente, inaequali, inordinato, intermittente; febre acuta ty-

phode et anxietatibus; cor manu tenentes aegri fugitivis oculis et mille jactationibus agitati, sibi comburi, illudque mori quaeruntur, clamant.

## O. II. PHLEGMASIÆ MEMBRANACEÆ.

### G. V. PHRENITIS.

303

Est phlegmasia acuta, cum pyrexia et delirio perpetuo, a cephalalgia atroci plerumque incipiens; delirium quandoque est audax, urina plerumque citrina, cum nebula sublimi.

### G. VI. DIAPHRAGMITIS.

304

Est phlegmasia cum dolore obscuro ad costas spurias, oppressione pectoris, sputis saepe cruentis, orthopnoea, anxietate; singulum praecordia stringens quaeruntur aegri; angulos oris semivoluntarie saepe retrahentes delirant; quandoque lethargo, vel cataphora laborant; pulsus est inaequalis, inordinatus, intermittens, durus; hypochondria intro tracta, respiratio sine motu dia-

phragmatis; facies jam pallet, jam rubet; calor est urens ad praecordia internus; scripsi sicut observavi in meis aegris: Vide *Hippocratem*, T. 2. p. 101. IX.

## 305 G. VII. PLEURITIS.

Est phlegmasia cum pyrexia acuta, dyspnoea, dolore pectoris plerumque pectorio, et tussi molesta dolorem augente, sine gravitate in medio pectore; sedes morbi in 300 pleuriticis denatis a *P. Servio Romano* in pleura pulmonali inventa est; invenerit, nimimum, pleuram pulmonis superficiem investientem, cum superficialibus et extremis vasibus pulmonis, inflammatam.

## 306 G. VIII. GASTRITIS.

Est phlegmasia fisiata dolore epigastrii, ardore, tensione, siti, nausea, vomitione, singultu, et pyrexia acutissima.

## 307 G. IX. ENTERITIS.

Est phlegmasia acuta, cuius symptomata sunt tensio tuinida et valde dolorifica, tactum non tolerans, partium abdominis intestinis respondentium, cum pyrexia meteorismo, quandoque et ileo, vel dysenteria.

## G. X. EPIPLOITIS.

308

Bis observavi hanc phlegmasiam, semel in viro rustico 30 annorum, et semel in quadragenaria muliere, cum sequente charactere: Febris erat mitis amphimerina, virium non adeo magna prostratio (rusticus venerat ipsum 4ta die morbi pro consilio ad me) lingua alba tumidula, sanguis misfus coriaceus, obstipatio non pertinax, dolor obtusus infra peritonaeum ad tactum paululum acutus, tumor omenti, respiratio suspiriosa, pulsus durus naturali celeritate et frequentia non multum major, sitis mediocris, urinae slavae, appetitus aliquis, aliquis et somnus.

## G. XI. CYSTITIS.

309

Est phlegmasia, cuius praecipua symptomata sunt intumescientia ovalis in pelvi, cum tensione, dolore tactum non tolerante, dysuria, vel ischuria et pyrexia amphimerina; adsunt insuper vigiliae, sitis, subindolentia, extremitatum frigus, tenesimus, vel obstipatio; pulsus observavi tensum, subdurum, naturali frequentia et celeritate non multum majorem; in sanguine

missa crustam tenuem albam, subgelatinosam, clysmatum difficultem injectionem : Scribo sicut observavi.

### O. III. PHLEGMASIÆ PARENCHYMATOSÆ.

#### 310 G. XII. CEPHALITIS.

Est phlegmasia, in qua mentis stupor, somnolentia, sopor cataphoricus, carphologia adsunt, cum pyrexia acuta typhode; pulsus successive mollescit, cum frequentia sine celeritate; aegri sunt admodum debiles; lingua plerumque mollis, sudor quasi perpetuus; caput saepe manibus impetunt, fricant etiam deliri. Ter observavi jam hunc morbum, et post mortem in cuiuslibet aegri cadavere suppurationem cerebri inveni; respirabant hi aegroti cum sonitu sine stertore.

#### 311 G. XIII. PERIPNEUMONIA.

Pyrexia acuta, dyspnoea gravis, sensus oppressionis gravitiae sub sterno, calor et anxietas in pectore, tussis cruenta, facies rubra, lingua rubra tuvidula; pulsus in-

incremento magnus, sub inspiratione remittens, vel penitus intermittens, ad finem morbi mollis.

## G. XIV. HEPATITIS.

312

Et phlegmasia acuta, cuius symptomata sunt tensio dolorifica hypochondrii dextri sub costis spuriis, cum sensu ardoris ac gravitatis, dyspnoea, tussi sicca, faciei colore flavescente, siti, anorexia, saepius et singultu, vomitione et tumore hepatis; pulsus est subdurus, tensus; urinae icteritiae, biliosae; serum sanguinis missi et crusta subflava; febris quasi semper remittens.

## G. XV. SPLENITIS.

313

Cognoscitur haec phlegmasia febre remittente, saepius tetartophya, tumore, duritie in regione lienis, dolore tactum fugiente pulsatili, calore, dyspnoea, pulsus in inspiratione intermittente in carpo sinistro magis, et absentia symptomatum nephriticorum; frigent hi aegri artibus; calor internus non est adeo magnus; sanguis missus est crusta inflammatoria tecitus; cibi adest fastidium, decubitus in la-

tus sinistrum difficilis, fitis et anxietas :  
Semel observavi hunc morbum sicut illum  
hic descripsi.

## 314 G. XVI. NEPHRITIS.

Est phlegmasia pyrexia acuta, dolore renum  
inflammatorio, urinae ardore, mictione  
frequenti stipata ; dolor sequitur ureteres,  
testis retrahitur, rotatur, crus stupet, ple-  
rumque adest vomitio, sine augmento dol-  
oris aeger potest corpus ad anteriora flex-  
um erigere.

## 315 G. XVII. METRITIS.

Hanc phlegmasiam adesse noscimus tumore,  
ardore, dolore, gravitate in regione utei,  
et pyrexia acuta ; digitus in vaginam im-  
missus uteri tactum non fert, idem valde  
calet ; adest dolor ad inguina, femora,  
diaphragma, qui ad claviculas extenditur,  
cum dyspnoea, nausea, vomitione, singul-  
tu, obstipatione, ischuria, vel dysuria, hor-  
rore perpetuo, frigore extremorum, deli-  
rio, jaestatione, spasmis, dolore oculorum ;  
pulsus varius, animi deliquia, sopor, te-  
tum, catalepsis observantur, cum febre  
plerumque remittente.

# C L A S S I S    XII.

## F E B R E S.

**CHAR. CLASSIS.** Pulsus frequens; celer, fortis; respiratio celeritate, magnitudine, frequentia aucta, viribus artuum minutis; vel virium vitalium augmentum, aut saltem in statu sanitatis perseveratio, viribus artuum notabiliter minutis.

### O. I. FEBRES CONTINUÆ.

Pyrexia semel crescit, et semel decrescit, in decursu aegritudinis.

### G. I. JUDICATORIA.

316

Ingruit tota febris subito cum trigore, calore, capitis dolore, &c. pulsus aliquo critico, aut evacuationibus criticis, vires artuum parum sunt minutae, vires contra vitales multum auctae, criticae; absolvitur 4 diebus.

### G. II. HUMORARIA.

317

Cognoscitur haec febris pulsus irritationis, incremento successivo usque IV. V. VII. vel

IX. diem, duratione morbi usque VII. IX.  
 XI. vel XIV. diem, notabili debilitate artuum, vehementibus symptomatibus, et humorum augmento, aut vitio, unde noscitur.

## 318 G. III. FRIGERARIA.

Est febris continuae genus, quae decurrit ad XVII. XXI. vel XXX. diem, incrementum habet longius praecedente; ingruit cum pulsu irritationis; pulsu et respiracione auctis, viribus artuum multum minutis; notabili frigore saepe et rigore, unde *Frigeraria*; lingua est sordida, excreta omnia foetida, a statu naturali multum distantia; haec est febris proprie *putrida*.

## 319 G. IV. TYPHUS.

Est febris continuae genus, quae plerumque ultra tres septimanas durat, cum calore jam magno, jam nullo, urina et pulsu sanorum similibus, artuum summa debilitate; pulsus quandoque rarer est quam pulsus sanus, color cutis pallidus, squalidus, exanthemata varia huic morbo superveniunt epigenomena.

## G. V.      H E C T I C A.

320

Est febris continua, quae chronicorum morborum more sensim extendi suevit per plures septimanas, imo menses, sine notabili virium prostratione, cum exigua pulsus frequentia; urina saepius est turbida, pelliculam innatantem pingue gerit; pulsus est subdurus, post pastum frequenter, calor ad attackum est mordens; sudores nocturni; febris haec, nullam habens exacerbationem notabilem, differt ab omni amphimerina, phthisi, et tabe, quia suppurationem pro causa non habet; aegri sunt plerumque orthostadii.

## O. II. FEBRES REMITTENTES.

Sunt febres continuae cum exacerbationibus quotidianis, tertianis, quartanis, &c.

## G. VI.      AMPHIMERINA.

321

Est febris continua, cum exacerbationibus quotidianis sibi similibus.

## G. VII.      TRITÆOPHYA.

322

Est febris continua, cum exacerbationibus tertianis.

## 323 G. VIII. TETARTOPHYA.

Est febris continua, cum exacerbationibus quartanis, seu quartanae typum fervantibus.

## O. III. FEBRES INTERMITTENTES

Pyrexia in decursu aegritudinis pluries penitus deserit aegrum, et reddit cum intervallis mediis lucidis servata periodo.

## 324 G. IX. QUOTIDIANA.

Febris intermittens, cuius paroxysmi similes redeunt nycthemeris singulis.

## 325 G. X. TERTIANA.

Est febris intermittens, cuius paroxysmi alternis diebus sibi similes repetunt, seu circuitum servant; urinae lateritiae sunt optimum signum febrium intermittentium.

## 326 G. XI. QUARTANA.

Est febris intermittens, cuius paroxysmi sibi similes quarta quavis die abeunt, et revertuntur; inter quoslibet duos paroxysmos intercedunt duae dies apyretac.

## G. XII. ERRATICA.

327

Haec febris distinguitur ab aliis generibus per accessus similes pluribus diebus ab invicem distantes quam duobus, nec proinde ad priora genera referri potest.

U u

C L A S S I S   X I I I .  
V E S A N I Æ.

CHAR. CLASSIS. Morbus mentis, seu error in imaginatione, appetitu, judicio, vel memoria.

ORDO I. HALLUCINATIONES.

Imaginationes deceptivae ex errore organi,  
vel mentis natae.

328 G. I.                  V E R T I G O .

Est hallucinatio, qua objecta, licet quiescentia, e loco moveri, nutare, vel in gyrum versari, nobis videntur, ipseque æger quandoque sibi nutare videtur; dicta phænomena etiam clausis oculis plerique patiuntur.

329 G. II.                  S U F F U S I O .

Est genus morbi imaginarii, cuius praecipuum symptoma est hallucinatio visus

circa objecta videntis corpora, quorum prototypus extra oculos non existit; suffusio repreäsentat corpora quae non sunt, et vertigo motum corporum, quo actu non aguntur.

## G. III. D I P L O P I A

33<sup>0</sup>

Est hallucinatio, qua affecti idem objectum geminatum, aut multiplicatum, videntur sibi videre.

## G. IV. S Y R I G M U S.

33<sup>1</sup>

Est error imaginationis sonos, qui extra au-rem non sunt, sibi repreäsentantis, a com-motione vibratoria organorum acoustico-rum per principia in aure latentia natos.

## G. V. H Y P O C H O N D R I A S I S.

33<sup>2</sup>

Est delirium circa propriam valetudinem, natum ex philautia, salvo ratiocinio de reliquis, delirant et desperant de sua vale-tudine recuperanda ob ructus, borboryg-mos, palpitationes, tremorem praecordio-rum, fugaces vertigines, flatulentiam, &c. Hinc hi persuasi fatum lethale sibi immi-nere, omnia symptomata et minimas mu-

## 340 SYSTEMA MORBORUM

tationes in corpore suo scrupulose obser-  
vant, narrant, et describunt medicis, suif-  
que querulis, alios mox et alios defatigant,  
ingenio caeterum et appetitu pollentes.

### 333 G. VI. SOMNAMBULISMUS.

Est dormientium hallucinatio, somniantes,  
nempe, ob imaginationem vividissimam,  
sopitis somno sensibus, motus musculares  
exercent, surgunt e lecto, variis periculis  
se exponunt, tecta scandunt, iter susci-  
piunt.

## O. II. MOROSITATES.

Cupiditates, vel aversationes depravatae.

### 334 G. VII. PICA.

Est alimentorum inassuitorum, vel rerum  
indigestibilium, appetitus, cum assueto-  
rum aversatione.

### 335 G. VIII. BULIMIA.

Est appetitus majoris alimentorum digesti-  
bilium et solitorum copiae, quam quae a  
viribus ventriculi digeri potest.

- G. IX. POLYDIPSIA. 336  
Est potulentorum appetitus immodicus.
- G. X. ANTIPATHIA. 337  
Est aversatio quorundam objectorum tanta,  
quod homo ex eorum visu, odoratu, au-  
ditu, &c. gravia symptomata patiatur.
- G. XI. NOSTALGIA. 338  
Est desiderium videndi parentes, cognatos,  
solumque natale adeundi adeo ardens, ut  
hac sola anhelatione occupati penitus lan-  
gueant; horumque animae commercium  
cum corpore ferme sublatum sit; unde  
languent omnes sensus, et appetitus alii;  
hectica febris hos miseris consumit, et ad  
lethum dicit, si adeundi patriam cognos-  
tos copia denegetur; olim in Croatia Cri-  
fii laboravi hoc malo cum apositia, et ob-  
stipatione, intumueram ex anasarca per-  
vigil et debilis; redux ad patriam sine  
omni pharmaco convalui; desideramus  
varia ardenter.
- G. XII. PANOPHOBIA. 339  
Est summus pavor inter dormicendum sine  
causa evidenti ortus; clamant hi, gemunt,

## 342 SYSTEMA MORBORUM

tremunt, sudant; hoc genus non multum differt ab ephialte.

### 34<sup>o</sup> G. XIII. SATYRIASIS.

Est morbus proprius viris, cuius praecipuum symptoma est effraenis impudensque veneras cupiditas, cum libidinosa penis tentigine; priapismus caret cupiditate libidinosa.

### 34<sup>1</sup> G. XIV. NYMPHOMANIA.

Hujus generis character est effraene, audax, et impudens in foeminis veneras desiderium.

### 342 G. XV. TARANTISMUS.

Hic morbus scribitur in Apulia esse endemius, cuius praecipuum symptoma est inexplicabilis saltandi, choreas agendi cupiditas; a tarantulae morsu excitari hunc morbum judicat Baglivius, quod Ill. Serao et experimenta Romana infiantur.

### 343 G. XVI. HYDROPHOBIA.

Est morbus, cuius praecipuum symptoma est incredibilis potulentorum omnium aver-

fatio, impossibilis deglutitio; vitant infusum per lucem et aëris motum.

## G. XVII. R A B I E S.

Est morbus in lupis et canibus observatus, cuius praecipuum symptoma est effraenis cupiditas mordendi obvios omnes, licet innocuos, sine hydrophobia; constat enim repetita apud Gallo-Provinciales experientia canes luposque rabidos bibisse, manducasse, et flumen tranasse; hic nihilominus morbus saepius est symptoma hydrophobiae: Vide dissertationem Ill. de Sauvages de Rabie. Rabies porro datur canina maniaca, et daemonomaniaca: Vide Hydrophobiam.

## O. III. D F L I R I A.

Delirium est ortus idearum non respondens objectis in sensus incidentibus, sed internae cerebri dispositioni a qua nascuntur ideae delirantium.

## G. XVIII. P A R A P H R O S Y N E.

Est delirium fugax a veneno, vel alio morbo dependens, cuius comes et symptoma est.

## 344 SYSTEMA MORBORUM

### 346 G. XIX. A M E N T I A.

Est insania chronica, universalis, mitis, seu ineptitudo ad recte ratiocinandum et judicandum, cum sensu et perceptione objectorum, ast sine attentione.

### 347 G. XX. MELANCHOLIA.

Est insania chronica partialis, moesta, meditabunda; delirant melancholici sine furore, et sine febre, de uno potissimum objecto constanter, delirant circa semetipsos, aut suum statum, de reliquis objectis adhuc sat bene ratiocinantes; mihi videtur causa hujus morbi latere in abdome, ganglia semilunaria afficere, et plexus nervorum abdominales.

### 348 G. XXI. DÆMONOMANIA.

Est delirium sine febre re ipsa tale, vel tantum simulatum, quo magi, sagaæ, praestigiatores se tanquam a daemone obsessos ostentant, varia phaenomena leges naturales excedentia praestare, exhibere volunt.

### 349 G. XXII. M A N I A.

Est delirium apyretum circa quaevis objecta, cum furore, audacia, ac robore; ma-

niaci habent plerique lucida intervalla ;  
subin est mania periodica ; unde Lunati-  
cici ; sanguis maniacorum viscidus, fero-  
que carens, fibrae musculares rigidae.

## O. IV. VESANIAE ANOMALÆ.

Morbi prioribus affines.

### G. XXIII. A M N E S I A.      349

Est memoriae imminutio aut plenaria abo-  
litio.

### G. XXIV. A G R Y P N I A.      350

Pervigilium immodicum vel continuum, ex  
quo vires imminuuntur ; anxietas, in-  
quietudo, anorexia, cephalalgia, aliaque  
molesta symptomata, oriuntur.



P A R S Q U I N T A:

T A B U L Æ N O S O L O G I C Æ

A B E X I M I O M E D I C O

D A V I D E M A C B R I D E

C O M P O S I T E,

E X E J U S O P E R E C U I T I T U L U S,

A Methodical Introduction to the  
Theory and Practice of Physic.

London 1772.



# TABULÆ NOSOLOGICÆ.

**E**RUDITUS auctor morbos in quatuor classes, in universales, scilicet, locales, sexuales, et infantiles, distribuere voluit ; distributionem tamen non nisi per primam classem prosecutus est.

Morbos in hac classe comprehendendos in novem tabulas five ordines dispositi, quos hic recensere volumus.

## ORDO I. F E B R E S.

### GENUS I. FEBRIS CONTINUA.

#### Species I. Continua simplex.

- Varietates sunt A Continua simplex plethorica.
- B Continua simplex a frigore.
- C Continua simplex a calore.
- D Continua simplex a dolore.
- E Continua simplex catarrhalis,

350 TABULÆ NOSOLOGICÆ

Sp. 2. Continua inflammatoria.

- Var. A Continua inflammatoria cephalalgica.  
B Continua inflammatoria soporosa.  
C Continua inflammatoria pleuritica.  
D Continua inflammatoria rheumatica.  
E Continua inflammatoria dysenterica.

Sp. 3. Continua nervosa.

- Var. A Continua nervosa communis seu febricula.  
B Continua hydrocephalica.

Sp. 4. Continua putrida.

- Var. A Continua putrida carceraria.  
B Continua putrida maligna Hungarica.  
C Continua putrida maligna Aegyptiorum.  
D Continua putrida icteroides Carolinensis.  
E Continua putrida icteroides Canadensis.

Sp. 5. Continua mixta.

- Var. A Continua mixta depuratoria.  
B Continua mixta sudatoria.  
C Continua mixta comatosa.  
D Continua mixta variolosa.  
E Continua mixta hyemalis.  
F Continua mixta verminosa.

G. II. FEBRIS INTERMITTENS.

Sp. 1. Quotidiana.

- Var. A Quotidiana simplex.  
B Quotidiana duplicata.  
C Quotidiana hysterica.  
D Quotidiana cephalalgica.

## Sp. 2. Tertiana.

- Var. A Tertiana legitima.
- B Tertiana spuria.
- C Tertiana pleuritica.
- D Tertiana asthmatica.
- E Tertiana carotica.
- F Tertiana cardialgica.
- G Tertiana duplex.
- H Tertiana duplicata.
- I Tertiana urticata.
- K Tertiana hemiplegica.
- L Tertiana rheumatica.

## Sp. 3. Quartana.

- Var. A Quartana legitima.
- B Quartana splenetica.
- C Quartana hepatica.
- D Quartana metastatica.

## Sp. 4. Erratica.

- Var. Quintana, sextana, &c.

## G. III. FEBRIS REMITTENS.

## Sp. 1. Remittens inflammatoria.

- Var. A Remittens inflammatoria catarrhalis.
- B Remittens inflammatoria peripneumonica.
- C Remittens inflammatoria ardens.

## Sp. 2. Remittens putrida.

- Var. A Remittens putrida biliosa.
- B Remittens putrida anginosa maligna.
- C Remittens putrida paludosa.

## G. IV. FEBRIS EXANTHEMATICÆ.

## Sp. 1. Variola.

## Var. A Variola simplex.

a Variola simplex discreta.

b Variola simplex confluens.

c Variola simplex chrystallina.

d Variola simplex verrucosa.

## B Variola complicata.

a Variola complicata inflammatoria.

b Variola complicata chrystallina.

c Variola complicata nigra seu sanguinea.

d Variola complicata dysenterica.

## Sp. 2. Morbilli.

## Var. A Morbilli regulares.

B Morbilli anomali.

C Morbilli variolosi.

## Sp. 3. Scarlatina.

## Var. A Scarlatina benigna.

B Scarlatina maligna.

## Sp. 4. Erysipelas.

## Sp. 5. Miliaria.

## Var. A Miliaria simplex.

B Miliaria catarrhalis.

C Miliaria inflammatoria.

D Miliaria serosa.

E Miliaria putrida seu petechialis.

Sp. 6. Aphtha.

Sp. 7. Pemphigus.

Sp. 8. Pestis.

G. V. H E C T I C A.

Sp. 1. Phthisis.

Var. A Phthisis sicca.

B Phthisis mucosa.

C Phthisis haemoptoica.

D Phthisis scrofulosa.

E Phthisis scorbutica.

F Phthisis asthmatica.

G Phthisis syphilitica.

H Phthisis arthritica.

I Phthisis hypochondriaca.

K Phthisis chlorotica.

Sp. 2. Tabes.

Var. A Tabes hepatica.

B Tabes mesenterica.

C Tabes dorsalis.

D Tabes scrofulosa.

E Tabes scorbutica.

F Tabes asthmatica.

G Tabes syphilitica.

H Tabes arthritica.

I Tabes hypochondriaca.

K Tabes chlorotica.

## ORDO II. INFLAMMATIONES.

## G. I. INFLAMMATIO EXTERNA.

Sp. 1. Phlegmone.

Sp. 2. Erysipelas.

Sp. 3. Furunculus.

Sp. 4. Anthrax.

Sp. 5. Ophthalmia.

Sp. 6. Cynanche.

Var. A Cynanche tonsillaris.

B Cynanche trachealis.

C Cynanche suffocatio stridula, Croup.

D Cynanche maxillaris.

## G. II. INFLAMMATIO INTERNA.

Sp. 1. Phrenitis.

Sp. 2. Otitis.

Sp. 3. Carditis.

Sp. 4. Pleuritis.

Var. A Pleuritis simplex.

B Pleuritis complicata.

Sp. 5. Peripneumonia.

Var. A Peripneumonia simplex.

B Peripneumonia complicata.

Sp. 6. Paraphrenitis.

Sp. 7. Hepatitis.

Sp. 8. Splenitis.

Sp. 9. Epiploitis.

Sp. 10. Gastritis.

Var. A Gastritis exanthematica.

B Gastritis a veneno.

C Gastritis traumatica.

Sp. 11. Enteritis.

Var. A Enteritis dysenterica.

B Enteritis herniosa.

C Enteritis a veneno.

Sp. 12. Mesenteritis.

Sp. 13. Nephritis.

Sp. 14. Cystitis.

## ORDO III. FLUXUS.

## G. I. ALVI FLUXUS.

## Sp. 1. Cholera.

Var. A Cholera spontanea.

B Cholera verminosa.

C Cholera arthritica.

## Sp. 2. Dysenteria.

Var. A Dysenteria putrida.

B Dysenteria inflammatoria.

## Sp. 3. Diarrhoea.

Var. A Diarrhoea stercorosa.

B Diarrhoea biliosa.

C Diarrhoea serosa.

D Diarrhoea verminosa.

## Sp. 4. Lienteria.

## Sp. 5. Caeliaca.

## Sp. 6. Hepatirrhoea.

## Sp. 7. Melaena.

## G. II. HÆMORRHAGIA.

## Sp. 1. Epistaxis.

Var. A Epistaxis critica.

B Epistaxis activa.

C Epistaxis passiva.

## Sp. 2. Haemoptysis.

Var. A Haemoptysis accidentalis.

B Haemoptysis habitualis.

C Haemoptysis periodica.

D Haemoptysis traumatica.

Sp. 3. Haematemesis.

Sp. 4. Haematuria.

Sp. 5. Haemorrhoids.

G. III. FLUXUS HUMORALIS.

Sp. 1. Ephidrosis.

Sp. 2. Diabetes.

Var. A Diabetes verus.

B Diabetes hystericus.

C Diabetes arthriticus.

D Diabetes febricosus.

## O. IV. D O L O R E S.

## G. I. A R T H R I T I S.

- Sp. 1. Arthritis regularis.
- Sp. 2. Arthritis irregularis.
- Sp. 3. Arthritis complicata.
- Var. A Arthritis rheumatica.
- B Arthritis chlorotica.
- C Arthritis melancholica.
- D Arthritis scorbutica.
- E Arthritis syphilitica.
- F Arthritis asthmatica.
- G Arthritis cardialgica.
- H Arthritis exanthematica.
- I Arthritis rachitica.

## G. II. R H E U M A T I S M U S.

- Sp. 1. Rheumatismus acutus.
- Sp. 2. Rheumatismus chronicus.
- Var. A Rheumatismus dysentericus.
- B Rheumatismus arthriticus.
- C Rheumatismus scorbuticus.
- D Rheumatismus syphiliticus.
- E Rheumatismus hystericus.
- Sp. 3. Lumbago.
- Sp. 4. Sciatica.

## G. III. OSTOCOPUS.

- Sp. 1. Ostocopus spina ventosa.
- Sp. 2. Ostocopus cancerosus.
- Sp. 3. Ostocopus syphiliticus.
- Sp. 4. Ostocopus ab osteofarcosi.
- Sp. 5. Ostocopus scorbuticus.

## G. IV. DOLOR CAPITIS.

- Sp. 1. Cephalalgia.
- Sp. 2. Cephalaea.
- Sp. 3. Hemicrania.

## G. V. ODONTALGIA.

- Sp. 1. Odontalgia catarrhalis.
- Sp. 2. Odontalgia cariosa.
- Sp. 3. Odontalgia scorbutica.
- Sp. 4. Odontalgia arthritica.
- Sp. 5. Odontalgia hysterica.

## G. VI. OTALGIA.

- Sp. 1. Otalgia inflammatoria.
- Sp. 2. Otalgia purulenta.
- Sp. 3. Otalgia verminosa.
- Sp. 4. Otalgia ab intrusis.
- Sp. 5. Otalgia catarrhalis.

## G. VII. PLEURODYNE.

- Sp. 1. Pleurodyne plethorica.
- Sp. 2. Pleurodyne flatulenta.
- Sp. 3. Pleurodyne a spasmate.
- Sp. 4. Pleurodyne parapleuritica.
- Sp. 5. Pleurodyne verminosa.

## G. VIII. DOLOR VENTRICULI.

## Sp. 1. Pyrofis.

- Var. A Pyrofis a saburra.
- B Pyrofis biliosa.
- C Pyrofis ulcerosa.

## Sp. 2. Cardialgia.

- Var. A Cardialgia faburrallis.
- B Cardialgia a veneno.
- C Cardialgia sputatoria.
- D Cardialgia bradypepta.
- E Cardialgia arthritica.
- F Cardialgia verminosa.

## Sp. 3. Gastrodynia.

- Var. A Gastrodynia ab ingluvie.
- B Gastrodynia flatulerentia.
- C Gastrodynia biliosa.
- D Gastrodynia a veneno.
- E Gastrodynia a xyphoide.
- F Gastrodynia ab extraneis.

## G. IX. COLICA.

- Sp. 1. Colica flatulenta.
- Sp. 2. Colica inflammatoria.
- Sp. 3. Colica biliosa.
- Sp. 4. Colica iliaca.
- Sp. 5. Colica nervosa.

## G. X. LITHIASIS.

- Sp. 1. Lithiasis nephritica.
- Sp. 2. Lithiasis cystica.

## G. XI. ISCHURIA.

- Sp. 1. Ischuria renalis.
  - Var. A Ischuria renalis ab inflammatione.
  - B Ischuria renalis spasmodica.
  - C Ischuria renalis mucosa.
  - D Ischuria renalis calculosa seu arenosa.

## Sp. 2. Ischuria vesicalis.

- Var. A Ischuria vesicalis calculosa.
- B Ischuria vesicalis inflammatoria.
- C Ischuria vesicalis spasmodica.
- D Ischuria vesicalis paralytica.
- E Ischuria vesicalis polyurica.
- F Ischuria vesicalis purulenta.

## Sp. 3. Ischuria urethralis.

- Var. A Ischuria urethralis carunculosa.
- B Ischuria urethralis urethro lithica.
- C Ischuria urethralis hydrocelodes.

G. XII. PROCTALGIA.

- Sp. 1. Proctalgia inflammatoria.
- Sp. 2. Proctalgia fistulosa seu purulenta.
- Sp. 3. Proctalgia haemorrhoidalis.
- Sp. 4. Proctalgia cancrosa.
- Sp. 5. Proctalgia intertriginosa.

## O. V. S P A S M I.

## G. I. TETANUS.

Sp. 1. *Tetanus episthotonus.*

Sp. 2. *Tetanus opisthotonus.*

## G. II. CATOCHUS.

## G. III. TRISMUS.

Sp. 1. *Trismus spontaneus vel primarius,*

Sp. 2. *Trismus secundarius.*

## G. IV. HYDROPHOBIA.

Sp. 1. *Hydrophobia spontanea.*

Sp. 2. *Hydrophobia secundaria.*

## G. V. CONVULSIO.

Sp. 1. *Convulsio ab inanitione.*

Sp. 2. *Convulsio traumatica.*

Sp. 3. *Convulsio verminosa.*

Sp. 4. *Convulsio plethorica.*

## G. VI. EPILEPSIA.

## G. VII. ECLAMPSIA.

## G. VIII. HIERANOSUS.

O. VI. ADYNA MIA.

G. I. COMA.

Sp. 1. Apoplexia.

Var. A. Apoplexia sanguinea.

B. Apoplexia serosa.

C. Apoplexia traumatica.

D. Apoplexia temulenta.

Sp. 2. Carus.

Sp. 3. Lethargus.

Sp. 4. Catalepsis.

G. II. PARALYSIS.

Sp. 1. Hemiplegia.

Sp. 2. Paraplegia.

G. III. DELIQUIUM.

Sp. 1. Leipothymia.

Sp. 2. Syncope.

Sp. 3. Asphyxia.

O. VII. ANHELATIONES.

G. I. DYSPNŒA.

- Sp. 1. Dyspnoea pituitosa.  
Sp. 2. Dyspnoea a tuberculis.  
Sp. 3. Dyspnoea calculosa.  
Sp. 4. Dyspnoea physconialis.  
Sp. 5. Dyspnoea scorbutica.

G. II. ORTHOPNŒA.

- Sp. 1. Orthopnoea idiopathica.  
Var. A Catarrhus suffocatus.  
B Peripneumonia notha.  
Sp. 2. Orthopnoea sympathica.  
Var. A Orthopnoea hysterica.  
B Orthopnoea stomachica.

G. III. ASTHMA.

- Sp. 1. Asthma humidum.  
Sp. 2. Asthma siccum.

G. IV. HYDROTHORAX.

G. V. EMPYEMA.

## O. VIII. MENTALES.

Morborum qui sub hoc titulo recenserri possint nullam tabulam hic opposuit clariss. Auctor; et, ob hanc causam, ut videtur, quod dubitat an genera maniae et melancholiae, sub hoc titulo vulgo recensita, revera aliter differant quam idem natura morbus qui sub diversa facie diversis temporibus compareat.

## O. IX. CACHEXIÆ.

G. I. POLYSARCIA.

G. II. HYDROPS.

Sp. 1. Anasarca.

Sp. 2. Hydrocephalus.

Sp. 3. Hydrops pectoris.

Sp. 4. Ascites.

G. III. ICTERUS.

Sp. 1. Icterus spasmodicus.

Sp. 2. Icterus a pressura.

Sp. 3. Icterus calculosus.

G. IV. EMPHYSEMA.

Sp. 1. Emphysema primarium.

Sp. 2. Emphysema secundarium a vulneribus thoracis.

G. V. TYMPANITES.

G. VI. PHYSCONIA.

G. VII. ATROPHIA.

G. VIII. OSTEOSARCOSIS.

G. IX. SARCOSTOSIS.

G. X. MORTIFICATIO.

368 TABULÆ NOSOLOGICÆ

Sp. 1. Sphacelus.

Sp. 2. Nécrosis.

G. XI. SCORBUTUS.

G. XII. SCROFULA.

G. XIII. CANCER.

G. XIV. LUES VENEREA.

F I N I S.







